


جيمس تريفيل

# الجانب المظلم للكون (عالم يستكشف الغاز الكون)

ترجمة: رؤوف وصفى

2718



ينقسم كتاب (الجانب المظلم للكون) إلى أربعة عشر فصلاً، يتحدث فيها الكاتب عن الكون المتمدد ويشرح آراء "إدوبن هابل" في هذا الصدد، وكذلك يتطرق إلى اكتشاف المجرات وكيفية تكوئها، في التاريخ المبكر للكون، ثم يسهب في شرح الانفجار الأعظم الذي بدأ به خلق الكون، وكيفية حدوثه منذ نحو 13.7 بليون سنة، بالإضافة إلى الجسيمات والقوى التي سادت في ذلك الزمن الموجل في القدم، وكيفية اتحاد تلك الجسيمات دون الذرية، واقتران القوى وتفككها، ثم يناقش الظواهر الكونية المثيرة والمعقدة، ويقدم لها تفسيراً مبسطاً للغاية، مثل الأوتار الكونية والفقاقيع الكونية والعقائد المجرية والعقائد المجرية الفائقة وغيرها.

ويخلص من كل هذا، ليتطرق إلى موضوع "المادة المظلمة" التي تكون أكثر من تسعين بالمئة من حجم الكون، وهي غير مرئية لنا، ولكننا نتعرف عليها من آثارها على المجرات (جزر الكون الكبير)، ويتساءل الكاتبــ المتخصص في تبسيط العلومــ هل من الممكن أن تقدم لنا المادة المظلمة، حلــ لمشكلة بنية الكون المروعة، ومن ثم تتمكن من التعرف على أهم الظواهر الكونية الغامضة التي لا نجد لها تفسيراً حتى الوقت الحاضر، على الرغم من التقدم المذهل في علمي الفلك والكون. إن كتاب (الجانب المظلم للكون) إضافة متميزة وفريدة لمكتبة العاملية العربية.

**الجانب المظلم للكون**

(عالم يستكشف ألغاز الكون)

المركز القومى للترجمة

تأسس فى أكتوبر ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

مدير المركز: أنور مغيث

- العدد: 2718

- الجانب المظلم للكون: عالم يكتشف ألغاز الكون

- جيمس تريفيل

- روف وصفى

- اللغة: الإنجليزية

- الطبعة الأولى 2016

هذه ترجمة كتاب:

The Dark Side of the Universe

By: James Trefil

Arabic Language Translation copyright © 2014 by The National  
Center for Translation.

Copyright © 1988 by James Trefil

All Rights Reserved

“Published by arrangement with the original publisher Scribner, a  
Division of Simon & Schuster, Inc.”

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة

شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.


E-mail: nctegypt@nctegypt.org Tel: 27354524 Fax: 27354554

# الجانب المظلم للكون

(عالم يستكشف الغاز الكون)

تأليف: جيمس تريفل

ترجمة: رفوف وصفى



### **بطاقة الفهرسة**

**إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية  
إدارة الشئون الفنية**

تريبل: جيمس.

الجانب المظلم لكنن: (عالم يستكشف الغاز الكون) / تأليف: جيمس

تريبل؛ ترجمة: رفوف وصفى.

٢٠١٦ - القاهرة: المركز القومي للترجمة.

٢٦ ص: ٢٤ سم

١ - الكون .

٢ - الكونيات ، علم .

٣ - ما وراء الطبيعة .

(أ) وصفى ، رفوف (مترجم)

(ب) العنوان

٥٢٣، ١

رقم الإيداع ٢٠١٥/٨٢٥٤

الترقيم الدولي ٣-٩٢٢٧-٩٧٧-٩٧٨ I.S.B.N.

طبع بالهيئة العامة لشئون المطبع والمطبوعات

---

تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربي وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اتجهادات أصحابها في ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز.

## المحتويات

7	.....	- توطئة
13	.....	- الفصل الأول : آفاق ممتدة وأرض متقلصة
35	.....	- الفصل الثاني : اكتشاف المجرات
55	.....	- الفصل الثالث : الانفجار الأعظم
75	.....	- الفصل الرابع : خمسة أسباب تشرح لماذا لا يمكن للمجرات أن توجد ...
91	.....	- الفصل الخامس : فقاقع وعنقיד مجرية فائقة
111	.....	- الفصل السادس : المادة المظلمة أقل مما تراه العين
127	.....	- الفصل السابع : كيف يمكن للمادة المظلمة أن تجد حلاً لمشكلة بنية الكون
139	.....	- الفصل الثامن : المادة المظلمة والكتلة المفقودة: ماذا يجب أن يكون مقدارها ؟
159	.....	- الفصل التاسع : مكونات مرشحة للمادة المظلمة
171	.....	- الفصل العاشر : طفرة النيوترينيو الثقيل
189	.....	- الفصل الحادي عشر : هل تحكم الجسيمات الكت十里 ضعيفة التفاعل في الكون؟ تلك المرشحات الغريبة، كمكونات للمادة المظلمة
207	.....	- الفصل الثاني عشر : الأوتار الكونية حل أم مخادعة؟
225	.....	- الفصل الثالث عشر : أبحاث تجريبية للمادة المظلمة
237	.....	- الفصل الرابع عشر : مصير الكون
251	.....	قائمة المصطلحات العلمية



## توطئة

تأمل - إذا أردت - أفكار (أرخيتاس)<sup>(١)</sup>، المولود في (تارينتو)<sup>(٢)</sup>، إذ كان فيلسوفاً إغريقياً وجندياً وموسيقياً، وصديقاً لـأفلاطون<sup>(٣)</sup> وتلميذاً لفيثاغورث<sup>(٤)</sup>. سئل ذات يوم "هل الكون محدود أو لانهائي؟".

أجاب قائلاً: "افترض أنه محدود، معنى ذلك أن له نهاية، عندئذ يمكنك أن تسير إلى حافة الكون حاملاً رمحك، وإذا وقفت هناك وقدفت برمحك في الفضاء إلى أقصى حد ممكن، ماذا سيحدث آنذاك؟"

لا شيء في الفراغ يجعل الرمح يرتد من جديد، ومن ثم سوف يظل متدفعاً باستمرار إلى أن يهبط. بيد أن موقع هبوطه، سوف يكون خلف النقطة التي قلت إنها حافة الكون. وعندئذ يمكنك أن تسير إلى تلك النقطة البعيدة، وتقذف بالرمح مرة أخرى، وبعدها اذهب إلى مكان الهبوط الجديد. ناهيك عن المكان الذي قلت من قبل إنه حافة الكون، فهناك دائماً مكان خلفي، بوسعي أن تقذف الرمح إليه، ومع كل مرة، تقذف بالرمح، يصبح كونك أكثر رحابة، ونستخلص من ذلك أن الكون ليس له حافة، ومن ثم يجب أن يكون لانهائيّاً".

ويقدم (أرخيتاس) ورمحه صورة مقنعة، لإحدى أعظم المحاولات المضنية، التي أخذت بتلبية العقل البشري في أي وقت، السعي الدؤوب لمعرفة الحجم الفعلى وبنية

(١) (٤٢٨ - ٤٢٧ ق.م). (المترجم)

(٢) في إيطاليا الآن. (المترجم)

(٣) فيلسوف يوناني يعني اسمه "واسع الأفق" (٤٢٧ - ٣٤٨ قبل الميلاد). (المترجم)

(٤) فيلسوف ورياضي يوناني (٥٨٢ - ٥٠٧ قبل الميلاد). (المترجم)

الكون، وعلى اختلاف أبحاث علمية عديدة متشابهة، فإن ذلك السعي يحفزه - بشكل يكاد يكون كاملاً - فضول راسخ الجنور، هو التعطش للمعرفة الذي يميز العقل البشري. ومما لا شك فيه، أن استكشاف حدود الكون على بعد بلايين السنوات الضوئية من كوكب الأرض، لن يحقق للباحث أى كسب مادي. كما أنها لن تسد رمهه ولا تمد آلات الحرب بالوقود. ومع ذلك، عبر تاريخ العالم المدون، فإن كثيراً من أحسن مفكرينا الذين أنتجهم جنسنا البشري، كرسوا أنفسهم للإجابة عن هذا التساؤل عن الكون. ونحن الذين ورثنا ثمار جهودهم، ندين بالشكر والعرفان بالجميل لهم. حتى لو لم تكن معاصروهم - في بعض الأحيان - مقرّين بإنجازاتهم.

ولقد اكتسبنا - إلى حد ما - معرفتنا المعاصرة عن الكون، خطوة بخطوة، مثل تأمل (أرخيتاس) لحامل الرمح التخييلي. وفي معظم حقب التاريخ المدون، لم يتمتد الكون الذي يتصوره العقل البشري، أبعد بكثير من السماء الزرقاء ذاتها، وكان كل شخص يعرف أن السماء مرفوعة بواسطة عملاق (أو تنين، أو أى شيء آخر يمكن تخيله).

وتم تجاهل محاورات رجال مثل (أرخيتاس)، لأنه كان من المريح أن تتقبل، كحقيقة واقعة، أننا نعرف بالفعل معظم ما كان يجب أن نعرفه عن الكون، ولكن بعد ذلك ألقى حامل الرمح - متخفياً في رني رجل بين بولندي يدعى (نيكولاوس كوبيرنيكوس)<sup>(١)</sup> - رمحه، فأنصبح الكون أرحب بكثير، وأشد فraigأ، مما اعتقاده أسلافه. وفي القرن الغربيين، اتخذ حامل الرمح، شكل العالم الفلكي (أبريون هابل)<sup>(٢)</sup> الذي أوضح لنا أن النجوم التي نشاهدتها أبناء الليل تنتهي إلى مجرة واحدة<sup>(٣)</sup>، وأن هناك في الكون آلاف الملايين (بلايين) المجرات. تلك المجرات التي تسكن الكون الذي لم يتخيّله (كوبيرنيكوس) على الإطلاق.

(١) الفلكي البولندي (١٤٧٣ - ١٥٤٣) الذي صاغ النظرية الثالثة بين الأرض وكواكب المجموعة الشمسية تدور حول الشمس. (المترجم)

(٢) فلكي أمريكي (١٨٨٩ - ١٩٥٣) الذي قال بأن الكون يمتد. (المترجم)  
(٣) يقصد الكاتب مجرة "الطريق البني". (المترجم)

وفي الوقت الحاضر، لم يعد رمح (أرخيتاس) شيئاً من صنع الإنسان، ولكن شبه نجم (زانف)<sup>(١)</sup> يربض عند حافة الاكتشافات الكونية، ويتبعنا بسرعة تقارب سرعة الضوء. ولم نعد نعتقد في المفهوم الساذج، بأن "رحمنا" سوف يهبط في مكان ما. وحتى لو افترضنا هذا الاحتمال، فلن تكون الحقيقة مجده لنا، إذ إن بلايين السنين سوف تتقاضى قبل أن يصل الرمح إلى كوكب الأرض. وبידل من ذلك، فحرى بنا، أن ندرس كيفية تحرك الرمح، ونطلع إلى الطرق التي تترتب بها الرماح في السماء، ونحاول جاهدين أن نحل أحججية جمع وحدات الكون معاً. ويا له من كون مرؤع! وفي كل مكان تظهر فقاعات متباعدة وفجوات لا حصر لها. تخيب آمال هؤلاء الذين يحاولون أن يجدوا اتساقاً بسيطاً في الطبيعة، وحتى بنية الكون، ليست كما نعتقد، إذ إن على الأقل ٩٠ بالمائة من الكون يتكون من مادة شكلها وتركيبها مجهول لنا. وبالكاد لا يمر شهر إلا ونكتشف جانباً جديداً أو غير متوقع للكون. وكلما اقتربنا من الأسئلة الجوهرية، تزداد نسبة ما يفصح عنه الكون من أسراره.

وقد اتضح لنا، أن معظم مادة الكون غير مرئية لنا، ولا تتبع منها موجات ضوء أو موجات راديوية، تخبرنا عن وجودها، وربما أن تلك القبة الرحيبة للسماءات والمرصعة بالنجوم، ليس بمقدورها أن تفعل شيئاً للنشاط الحقيقي للأجرام الفضائية، تماماً مثل غصن صغير يطفو على طول قناة، لا يستطيع شيئاً إزاء الطريقة التي تتدفق بها المياه. ويمكن آخر، لعلنا نعيش في رحاب كون، تتحدد فيه بالكامل الأشكال المألوفة للمادة - مثل الشمس ومجرة الطريق اللبناني - بواسطة مادة لا نستطيع أن نراها، ولكننا نطلق عليها "المادة المظلمة".

(١) جرم فضائي يبعد عنا بآلاف الملايين من السنوات الضوئية، وعلى الرغم من صغر حجمه نسبياً، فإنه يبعث بطاقة وضياء مثل عشرات المجرات، وثمة اعتقاد بأن ثقوبها سوداء تمد هذه الأجرام الفضائية بالطاقة. (المترجم)

وكما يحدث مراراً وتكراراً، عندما تتبثق أفكار جديدة من ثنايا أحد العلوم، فإن العلاقات بين هذه الأفكار الجديدة والمشاكل القديمة، تبدأ في الظهور، لقد واجه الفلكيون صعوبات جمة لشرح الأسباب التي تجعل النجوم تتخلل في شكل مجرات، بدلاً من انتشارها في الفضاء بطريقة أكثر تجانساً. ويبدو أنه كلما زادت معرفتنا بالقوانين الأساسية للطبيعة، بدا أن هذه القوانين تبلغنا أن المادة الرئيسية - أي المادة التي يمكننا رؤيتها - يجب ألا ترتب بالطريقة التي هي عليها. ومن ثم، فيجب ألا تكون هناك مجرات في الكون على الإطلاق. وحتى إذا وجدت المجرات، فإنها لن تجتمع في شكل عناقيد مجرية، كما هي عليه الآن.

ويحدق الفلكيون في الكون، بواسطة آلات رصد تزداد قوتها يوماً بعد يوم، وشاهدوا من خلالها أشياء غريبة تتشكل أمام أعينهم. في البداية رصدوا مجرات أخرى، مثل مجرتنا "الطريق الالبني"، ثم رأوا أن هذه المجرات تجتمع في عناقيد. وحدثاً، وجدوا أن هذه العناقيد ذاتها، تجتمع في تركيبات عملاقة وتترتب على الشكل، يطلق عليها "العناقيد الفانقة".

ولعل أكثر الاكتشافات غرابة (وحداثة)، أنه بين هذه العناقيد المجزية الفانقة، مناطق شاسعة يطلق عليها "فجوات"، حيث لا تتأرجح نجوم ولا تكون مجرات.

وعلى طول هذه السلسلة المروعة من التركيبات الكونية من الأجرام التي توجد داخل مجرتنا "الطريق الالبني" إلى أكثر العناقيد الفانقة المعروفة لنا، نجد انطباع المادة المظلمة مثل آثار الأقدام فوق الرمال. وخلال السنوات القليلة الماضية، أدركنا أنه ثمة ارتباط بين المشكلتين، مشكلة التركيب المجرى ومشكلة المادة المظلمة.

كما أننا بدأنا نرى إشارات واقتراحات، بأن التركيب المجرى والمادة المظلمة، يرتبطان أيضاً بمشكلة ثلاثة مهمة، هي مشكلة نشأة الكون وتطوره.

ويبدو أننا أقحمنا أنفسنا في وضع حرج، وبمعنى آخر، إن فشلنا في التوصل إلى حل لسلسلة من المشاكل الكونية، قادنا إلى إدراك أن كل هذه المشاكل، يجب أن يتم حلها معًا، وأن الاتجاه لحلها على مراحل لن يؤدي إلى أي نتيجة.

وما أود أن أفعله في هذا الكتاب، هو تعريفك بركن غريب في العالم العلمي، حيث إن الحلول مثل هذه الأنواع من المشاكل، يتم بحثها. إنه مكان يقذف الباحثون فيه ب مجرات تحتوى على بلايين الشموس، كما يقذف صبي بالكرات الزجاجية! وحيث إن أي اكتشاف لا يكاد يتتوفر له الوقت - لكي يتتصدر نشرات الأخبار أو يصبح عنواناً رئيسياً في مقال أو جريدة - حتى يتم التوصل إلى اكتشاف آخر، أكثر من الأول غرابة. إنه عالم يوسع من حدود العقل البشري، عالم حيث تقطن - الكواركات البالغة الضائقة وأكونان الظل والأوتار الكونية - في المشهد الطبيعي النظري للكون. إنه مكان فقاعي<sup>(١)</sup> (١) ويوماً مسبباً للتوار، حيث تتبع فيه وتطور أفكار جديدة، بإثارة وحيوية، مما يبشر بإمكانية ظهور علم حديث له آفاق مستقبلية، إننا محظوظون، لأن ما نراه اليوم عبارة عن لقطة سريعة خاطفة وصورة إيقاف حركة لعلم جديد في لحظات ميلاده.

وحيث إن كل الإجابات ليست متاحة بعد، يمكننا إذن أن نركز على سلسلة العمليات التي يقوم بها العلماء للتوصول إلى اليقين، أكثر من الحقائق نفسها. سوف نحظى بالمعرفة والفهم من خلال الدراسة، عن كيفية استبعاد الأفكار الرئيسية التي ليست على المستوى وتسيء للعلم. ومن ثم، فإنني لنأشعر بالذنب عندما أخبرك بفكري الآثير حول موضوع مفضل في مجال المادة المظلمة: "الأوتار الكونية". وكما يتضح من هذا الاسم، فإن هذه الأوتار يفترض أنها عبارة عن حبال رفيعة من خيوط مجولة، ذات بعد واحدة من المادة المظلمة. وهذه الأوتار الكونية كثيفة لدرجة لا يمكن تخيلها، وقد تشكلت عندما كان عمر الكون جزءاً من الثانية. وفيما بعد، أصبحت تلك الأوتار بمثابة نوى حول المادة الرئيسية المتراكفة، وفي الوقت الحاضر، اقترح بعض العلماء النظريين، أن الأوتار الكونية توجد في العناقيد المجرية الفائقة التي تمتد بجلال عبر السماء. ولو كان الأمر كذلك، فإن الكون - بحق - يكون أغرب من أي شيء أمكننا تخيله إلى يومنا هذا.

---

(١) مليء بالفقاعات أو منتج لها. (المترجم)

ويكون من الممكن - من حيث المبدأ - أن نرتحل في سفينة فضاء إلى أحد أجزاء وتر كوني، ثم نغادره وننسير لبليون سنة ضوئية، أي حوالي عشر الطريقة عبر الكون.

وفي الوقت الحاضر، وبعد مرور نحو ألفي عام على م伽دة (أرختاس) عن طبيعة الكون، نوشك أن نقدم إجابة عن أسئلته التي أثارها عن حجم الكون وبنائه.

وفي المختبرات الهائلة لمسارعات الجسيمات دون الذرية، وفي المراصد الفلكية التي ترصد الأجرام الفضائية البعيدة، وبواسطة حواسيب جبارة التي تجري عمليات حسابية بسرعة مذهلة، بدأ العلماء يضيقون الخناق على حامل الرمح، لكن يحدوا من اختياراته ويقيموا من حركته. وفي الواقع، فربما يحظى جيلنا بأن يكون له الفضل في إمدادنا بالإجابة الحاسمة للأسئلة التي حيرت وأربكت العقل البشري منذ فجر التاريخ المدون.

إذاء هذا، أرجو منكم أن تخيلوا أنكم تقادرون مقاعدكم المريحة ذات المسائد، وأن ترتحلوا معى إلى الآفاق القصبة للمعرفة الإنسانية والخيال. على أن يكون هدفنا المطلوب تحقيقه: هو إدراك لأصل الكون وبنيته ومصيره.

## الفصل الأول

### آفاق ممتدة وأرض متقلصة

(عندما كنت جالساً في قاعة المحاضرات، أستمع إلى محاضرة الفلكي التي لاقت استحساناً كبيراً، سرعان ما شعرت - وبدون أي سبب مفهوم - بأنني متعب وسقيم، حتى قمت وغادرت المكان وتمشيت قليلاً بمفردي.  
وفي هواء الليل الندى المفعم بحقائق روحية غير بادية للحواس.  
ومن وقت لآخر، كنت أتأمل في صمت مطبق وخشوع، تلك النجوم المتائلة في محمل السماء الأسود).

والت ويتمان

### عندما سمعت الفلكي الواسع المعرفة

كل حضارة تناول الكون الذي تستحقة، ولا أعني بهذا أن الكون يتغير بالفعل، عندما تتبدل أفكارنا عنه، فقط الفيلسوف الذي يعيش في برج عاجي<sup>(١)</sup>، هو الذي يمكنه أن يدعى أمراً كهذا. إن ما أعنيه، أننا كلما عرفنا المزيد عن الكون، تتغير الأسئلة التي نطرحها والذور الذي تحده لبنية السماوات.

---

(١) الذي يعيش منعزلاً وبهتم بالمواضيع الفكرية الخيالية غير العملية. (المترجم)

يبدأ كل باحث بنفس الحقائق الأساسية، أن الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، وتبقي النجوم ثابتة بالنسبة لبعضها البعض، أما الكواكب فإنها تتحرك. ما الذي يمكننا أن نفعله بهذه الحقائق الدامغة، نبني نموذجاً يكون بمقدوره أن يشرح هذه الظواهر الطبيعية، وكلما تعاظمت الحقائق، كتفسيرات منطقية لما نراه. وعلى سبيل المثال، فبالنسبة لزملاء (أرخيتاس)، كان الاعتقاد بأن الأرض ليست مركز الكون، أمراً لا مجال للتفكير فيه على الإطلاق، أما فيما يتعلق بنا، فإن ذلك الاعتقاد أصبح بدبيهياً، وهذا بيوره ينتج تأثيراً معيناً، على أنواع النماذج التي نشيدها في أذهاننا للكون.

ولو أن هناك درساً وحيداً، أخذ ينبع من التقدم الذي أحرزه الجنس البشري، بفضل تصوراته وأفكاره المتلاحقة عن الكون، يمكن تلخيصه كما يلى: كلما زادت معرفتنا، ظهر لنا أن كوكبنا وجنسنا البشري ليس جوهرياً أو مركزاً في الكون.

وانتفع - دون شك - أنتا سكان صخرة صغيرة، تدور حول شمس عادية للغاية، في مجرة غير مميزة بصفات معينة على الإطلاق. وأدركنا كذلك أن الأمور في الكون لا تحدث عشوائياً، ولكن كل حدث ينظمه ويتحكم فيه، عدد قليل من القوانين الطبيعية، وهذه القوانين يمكننا أن نكتشفها في مختبراتنا. إن كل شيء نراه في السماء وكذلك على الأرض، يحدث بطريقة عقلانية ومنهجية منتظمة. هذا هو كوننا، الذي عرفناه وفهمناه أثناء الدراسة، بيد أنه - بائي حال من الأحوال - ليس الكون الوحيد الذي يمكن أن يتخيله العقل البشري.

ودعني أسوق إليك بعض الأمثلة التي توضح وتفسر لك، ما أعنيه بهذا. إن أقدم التفاسير المكتوبة المتوفرة لدينا، عن الخليقة، في الجزء من الملحة<sup>(١)</sup> البابلية التي يطلق عليه "Enuma Elish". وقد اشتقت هذا الاسم من أول كلمتين من الملحة التي يمكن ترجمتها بعبارة "عندما نكون في الأعلى". ومثل جميع قصص الخليقة، فإنها تقدم تفسيراً متراابطاً منطقياً ومتواافقاً ذاتياً، عن كيفية وجود الكون، وكيف أنه تطور ليصبح كما نشاهده حالياً.

---

(١) قمية قصصية طويلة تصور الأعمال البطولية أو الأسطورية. (المترجم)

والحدث الرئيسي في قصة الخليقة - كما جاءت في الملحمة البابلية - معركة دامية بين قائد الآلهة (ماريلوك) والوحش (تيامات)، الذي يمثل قوى الفوضى والاضطراب، وكذلك أم الأرباب، واستطاع (ماريلوك) أن يحقق النصر، في هذه المعركة. وقام بقطع جسم (تيامات) إلى نصفين، استخدم أحدهما لخلق الأرض والنصف الآخر لخلق السماء، وفيما بعد، قامت الآلهة بوضع النجوم في السماء، لتنذير الجنس البشري، بواجباته الدينية.

ومن جديد، نعود إلى مصر. لقد كان مرور الشمس عبر السماء، حدثاً جللاً وجوهرياً لكل السكان، وفي معظم الأفكار الأولية عن الكون، كان يفسر مرور الشمس هذا، بحركة ذات طبيعة خاصة لإله الشمس بمركبته الحربية ذات العجلتين التي تجرها الخيل.

وفي إحدى صيغ القصة، التي كانت منتشرة في المملكة الوسطى بمصر القديمة، كان إله الشمس يقود مركبته عبر السماء كل يوم. وفي المساء كان يهبط إلى العالم السفلي، حيث يخوض حرباً ضروسًا مع ملك الظلام، لكي يجاهد من أجل شق طريقه من جديد إلى ناحية الشرق، حتى يشرق مرة أخرى. أما الألوان الحمراء التي تظهر عند غروب الشمس وبينوغر الفجر، فقد نجمت عن إراقة الدماء في هذه المعرك الطاحنة. وإذا كنت تعتقد وتؤمن أن هذا هو التفسير الحقيقي لشروق الشمس، فمن الطبيعي أن تتقبل احتمالية، أنه ذات ليلة ربما ينتصر ملك الظلام على ملك الشمس. واعتاد المصري القديم على طرح السؤال "هل سوف تشرق الشمس غداً؟".

وهذا تساؤل يحب طلاب السنة الأولى للفلسفة أن يجادلوا حوله، وهو ليس تدريباً أكاديمياً، متعلقاً بالدراسات العقلية أو الكلاسيكية.

والمفكر المصري القديم، لا يستطيع أن يتقبل ظاهرة شروق الشمس، كحدث تلقائي، وأمر مسلم به جللاً.

وكل شروق للشمس حدث منفصل، ومعجزة موجودة ولها كينونة مستقلة، تعتمد على مدى ما حققه إله الشمس من انتصارات على ملك الظلام في العالم السفلي، في الليلة السابقة.

وبالنسبة للبابليين، فإنه حتى وجود الكون، كان حقيقة تصادفية<sup>(١)</sup>. إننا موجودون في هذا الكون، لأن (مارديوك) حقق النصر على الوحش في المعركة. وإذا لم يكن قد فعل ذلك، لسادت الفوضى التي عمت العصور القديمة، حتى الوقت الحاضر. وما كانت هناك أرض ولا سماءات، وبالتالي - بطبيعة الحال - لا يوجد جنس بشري، يتتسائل عن كيفية حدوث الخليقة.

وفي كل من المثالين، فإن السماوات البارزة الرئيسية لهذا العالم، تعتمد على أحداث لا تخضع لقوانين ثابتة، غير قابلة للتغير أو التطور. ويمكن للألهة فقط أن يتحكموا في الكون، وبالإمكان استعطافهم لتلبية الاحتياجات البشرية عن طريق إقامة الطقوس الدينية.

وتتسارعني الشكوك، في أن الأكونان التي تتعجب بالأرواح والآلهة، يمكن أن توفر إشباعاً عاطفياً، لهؤلاء الذين يؤمنون بها، أكثر من الذي يقدمه كوننا لنا.

وطلي أية حال، فإن الكون كانت تقع فيه الأحداث، بطريقة بشرية للغاية. ولم تختلف تماماً، تلك الجاذبية التي تكمن في هذه المعتقدات القديمة، حتى في الوقت الحاضر.

وقد تضمن الجزء الأكبر من الحركة الثقافية المناهضة<sup>(٢)</sup> في الستينيات من القرن العشرين، رفضاً للثقافة العلمية العقلانية، لأمريكا المعاصرة، وعودة إلى الرؤية الأكثر أسطورية للكون.

وعلى الرغم من ذلك، فقد كان هناك تجانس عاطفي، كما في الطرق القديمة، مما أدى إلى ترك الكثير مما نرغب فيه ونصبو إليه، من الناحية العقلانية.

(١) حالة ممكنة ولكنها غير محتملة. (المترجم)

(٢) حركة ثقافية ذات قيم مخالفة لثقافة الجيل السابق. (المترجم)

سواء كانت ثمة معركة في العالم السفلي أم لا، فإن الشمس تشرق بالفعل في كل صباح. وربما تعتمد حركة النجوم والكواكب، على رغبات الآلهة، بيد أنها منتظمة ويمكن التنبؤ بمساراتها.

وإلى حد ما، فإن تقارب الحقائق الشخصية تماماً والتصادفية، للأكونات القديمة مع السلوك المنتظم للسماء، يبدو صعب التفسير، على الأقل بالنسبة لعقل من يعيش في القرن العشرين.

كان الإغريق هم أول من أدرك طبيعة الكون، وكانت أفكارهم تكاد تتطابق مع أفكارنا عن الكون في الوقت الحاضر. وتميزت أرؤهم بالشكوكية<sup>(١)</sup> متقدة الذكاء، وعلى سبيل المثال، فقبل جيل كامل من عصر (أرخيتاس)، قام المؤرخ اليوناني (هيرودوت)<sup>(٢)</sup> بزيارة مصر وطاف بأرجانها. وهناك أرسى شيوه إلى معبد يقدم فيه الكهنة، الطعام لأحد آلهتهم، في كل مساء، وفي الصباح لا يبقى من الطعام شيء، وكانت هذه حقيقة قدموها للمؤرخ اليوناني دليلاً على وجود الإله.

وعلى "هيرودوت" على هذا بقوله "لم أشاهد أى إله، ولكنني شاهدت فئراناً عديدة حول قاعدة تمثال الإله!". وكان من الصعب إلا يعجب الناس بشخص يفكر بهذه الطريقة؛ ومناقشة هذه الأفكار والمعتقدات، قادت اليونانيين إلى تصور كون كان يختلف اختلافاً بيئياً، عن التصورات التي سادت في الأزمان الغابرة. لقد كانت أفكارهم تلقى اهتماماً بالغاً من الباحثين، إلى الحد أن نظرياتهم عن السماء بقيت معترف بها حتى ما بعد عصر النهضة<sup>(٣)</sup>، أى بنحو ألف وخمسمائة عام. وأنتعجب إذا كانت نظرياتنا عن الكون، سوف تبقى لكل هذه السنين الطويلة!

وكان (كلوديوس بطليموس)، هو العالم الذي يقال دائماً إنه مفسّر الفلك اليوناني، وقد عاش بالإسكندرية في القرن الثاني الميلادي. وعلى الرغم من أنه يحمل نفس اسم حكام مصر في ذلك الوقت، فإنه لم يكن - في حدود معرفتنا - ينتمي إلى العائلة المالكة.

(١) المنصب القائل بأن المعرفة المطلقة مستحيلة وغير مذكورة. (المترجم)


(٢) ٤٨٤ - ٤٢٥ قبل الميلاد. (المترجم)

(٣) مرحلة ثقافية في كل المجالات، ظهرت في إيطاليا في القرن الرابع عشر ووصلت إلى ذروتها في القرن الخامس عشر، وانتشرت بعد ذلك في كل أنحاء أوروبا. (المترجم)

و عمل (كلوديوس بطليموس) في مؤسسة تُعرف باسم "متحف الإسكندرية" وكانت بمثابة مركز أبحاث و مختبر حكومي حديث.

و كان العلماء والباحثون يقومون بعملهم و يكتبون أبحاثهم، دون أن يُكفلوا بأية أعباء تدريسية مما قد يعيق تحقيق إنجازاتهم العلمية.

و استطاع بطليموس جمع القياسات التي قام بها أسلافه اليونانيون والبابليون، وأضاف إليها ما حققه بنفسه، ثم بنى على أعمالهم السابقة، ومن ثم توصل إلى ابتكار نموذج للكون، يتضمن كل الظواهر التي تمت ملاحظتها. ويوضح (شكل ١-١). مخططاً أولياً لكون بطليموس، كانت فيه الأرض في المركز. و تدور حولها كرات بلورية، تحمل الشمس والقمر والكواكب. وكل كرة تدور بمعدل مختلف، مما يفسر حركة الكواكب بالنسبة لبعضها، وكذلك بالنسبة للنجوم. أما الكرة الأكثـر بعـدـا عن المـركـزـ، فإنـها تحـمـلـ النـجـومـ. وـهـذـهـ الـكـرـةـ تـدـورـ بـمـعـدـلـ يـزـيدـ قـلـيلـاًـ عـنـ مـرـةـ كـلـ يـوـمـ. وـتـبـيـنـ الدـوـرـةـ الـوـاحـدةـ، لـمـاـ تـتـحـرـكـ النـجـومـ عـبـرـ السـمـاءـ فـيـ كـلـ لـيـلـةـ، وـتـقـسـرـ الـزـيـادـةـ الـبـسيـطـةـ فـيـ هـذـهـ الدـوـرـةـ، سـبـبـ وـجـودـ نـجـومـ مـخـلـفـةـ فـيـ السـمـاءـ، شـتـاءـ وـصـيفـاًـ.



ولتعميل التفصيلي لحركة الكواكب، كان يفترض أن هذه الأجرام الفضائية تتدحرج في دوائر صغيرة (يطلق عليها: فلك التدوير)<sup>(١)</sup>، والتي تدرج بدورها على الكرات الرئيسية.

وقد بني نموذج الكون بطليموسى، على افتراضين غير متحدث عنهم، ولكنهما سيطرا على الفكر اليونانى القديم. أولهما "مركزية الأرض": أى الاعتقاد بأن كوكب الأرض، في مركز الكون، وثانيهما الفكرة بأن الحركة في السماوات تتضمن دوائر أو كرات. وهذا الافتراضان جديران بأن ننذكرهما، لأنهما بمثابة مثالين باهرين للاعتقاد الباطل بالاعتماد على آراء واضحة للغاية، وتبين أنها لا تقبل الجدال ولا يمكن إنكارها. وللأسف، فإن مثل هذه الآراء تكون دائمًا خاطئة، والعالم لا يتنازع تمامًا - كما نظن أحياناً - مع الطريقة التي نفكر بها.

وعلى سبيل المثال، لا شيء يكون أكثر وضوحاً، من القول بأن كوكب الأرض ثابت، وأن الشمس والكواكب تدور حوله، وأن شخص لاحظ بانتباه غروب الشمس، يعرف أن الشمس تتحرك إلى أسفل تحت الأفق ولكن تومن بخلاف ذلك، يتطلب الأمر إجراء تجربة أخرى مفعمة بالحيوية والنشاط ومقدمة، بحيث تلقى ظللاً من الشك، على الدليل المباشر الذي أدركته حواسنا. ويمكن قول نفس الشيء على فرضية الحركة الدائرية للأجرام الفضائية في الكون.

وقد جادل الفلكيون اليونانيون، ببساطة شديدة، أن السماوات يجب أن تكون - بشكل جليٍ واضح - كاملة ودائمة لا تتغير. ومن ثم، فإن النجوم والكواكب يجب أن تتحرك في مدارات توصف بأنها أشكال هندسية كاملة للغاية. وما الشكل الهندسي الأكثر كمالاً من الدائرة؟

---

(١) في فلك بطليموس هو دائرة صغيرة يتحرك مركزها على محيط دائرة أكبر مركزها الأرض. (المترجم)

ويبدو أن الدائرة تمارس قوة غريبة على العقل البشري. إذ كلما تحدثت عن الفلك اليوناني في إحدى محاضراتي، كنت أقوم دائمًا بإجراء اختبار بسيط. كنت أسأل طلابي، عن الشكل الهندسي الأكثر كمالاً.

وكانت الإجابة دائمًا ثابتة لا تتغير: الدائرة أو الكرة. ولم أسمع قط أى طالب، يقول المربع أو الشكل السادس<sup>(١)</sup>.

ولو تابعت هذه النقطة، بالتساؤل: لماذا تكون الدائرة كاملة، عادة تكون هناك فترة ترث، ثم قد يتطلع شخص ما بالإجابة بالقول بأن كل النقاط على الدائرة متساوية بعد عن المركز. وإذا سألت كيف يؤدي ذلك، إلى جعل الدائرة كاملة، عندئذ يسود الصمت المطبق!

وقد كررت هذا الاختبار مرات عدّة، حتى أتأكد من أن النتيجة ليست خبط عشواء أو حادثًا بالمصادفة، وهي توضح - بما لا يدع مجالًا للشك - عن طريق استخدام الأمثلة، ذلك الدور الذي يقوم به الافتراضيون خفية دون الإعلان عنها.

وtheses شعور بصحة هذين الافتراضين، ما دام لا أحد يطرح أسئلة، فكل شيء يبدو منطقياً و حقيقياً. بيد أن الافتراض يشبه ملابس الإمبراطور، وما أن يتسلل الشك إلى عقول الناس فإنهم، على حين غرة، يكتشفون الشيء المفقود. وهذه التجربة، تجعل الناس عادة، مرتكبين وغاضبين. وأعتقد أن هذا هو السبب في أن الهرطقة<sup>(٢)</sup> عادة ما كانوا يحرقون أحياء وهم مربوطون في أعمدة.

وقد شكلت الافتراضات اليونانية غير المعلن عنها، لب الكون العلمي، لألف وخمسمئة سنة. وأولئك الذين عاشوا خلال هذه الفترة الزمنية، كانوا بالتأكيد أذكياء مثلنا، ومع هذا لم يخطر في بالهم، أن يوجهوا أسئلة، تبدو لنا الآن واضحة كل

---

(١) مضلع له ستة أوجه. (المترجم)

(٢) الخارجون على الدين. (المترجم)

الوضوح. ولكن ما الذي يمكن أن يخبرنا به ذلك عن قدرة الجنس البشري، في تتبع افتراضاته الخفية؟ أخشى أن تكون الإجابة غير مشجعة.

وسوف تكون غير أمناء، إذا لم نحاول أن نطرح أسئلة مشابهة، عن مفاهيمنا في القرن العشرين عن الكون. وحسبما يتراهى لى، فالافتراض الرئيسي غير المعلن عنه في علم كون القرن العشرين، أن هناك حلًا عقلانيًا ورياضيًّا واضحًا لكل مشكلة، حتى مشكلة خلق الكون. ويتناول معظم الناس مع هذا المفهوم بتشكك: كيف يمكن أن يكون غير ما هو مفترض؟ وإننى أتخيل أن اليونانى كان قد استجاب بنفس الطريقة، إذا ما تسائل شخص ما عن افتراض مركزية الأرض. ومع ذلك، فاليونانيون كانوا مخطئين وربما تكون مخطئين نحن أيضًا.

وفي الواقع، منذ زمن ليس ببعيد، قام بعض العلماء في جامعة "بيركلي" بتحدي هذا الافتراض غير المعلن عنه، للعلم الغربي، مدعين بأن التطور الذى حدث فى ميكانيكا الكم<sup>(١)</sup>، سوف يدفع الفيزيائيين المحدثين إلى تغيير آرائهم عن الكون، لتصبح متناغمة مع البوذية<sup>(٢)</sup> أكثر من الفكر العلمي التقليدى. ولكن صادفهم سوء حظ لا يُصدق، عندما حاولوا تدعيم تحديهم هذا، قبل التقدم الذى حدث في نظريات المجال الموحد، التي تعد أحد أعظم تطورات العلم قاطبة. وسوف نناقش هذه النظريات، فيما بعد، ويكتفى هنا أن نشير - ببساطة - إلى أنها تطورت في وقت، كانت أساسيات العلم تتعرض لهجوم شرس، وأدت النجاحات التي حققتها تلك النظريات، إلى وضع نهاية - ولو مؤقتاً - لأى محاولة جادة لتحدي افتراضنا غير المعلن عنه. وأسارع للقول بأننى أعتقد أن افتراضنا صحيح، أى أن هناك حلولاً عقلانية لمشاكل علم الكون. ويمكن التوصل إلى هذه الحلول بالتطبيق الدقيق للطريقة العلمية.

(١) النظرية المتعلقة ببنية وحركة الذرات والجزيئات. (المترجم)

(٢) تعاليم الفيلسوف بوذا (٤٨٠ - ٥٦٠) قبل الميلاد. (المترجم)


وما دام الآخرون كانوا قد اعتنقوا - بنفس قوة اعتقادنا - في صحة افتراضاتهم، ثم اتضح لهم فيما بعد أنهم كانوا مخطئين، يدعونا هذا إلى أن نكون مدركين للحقيقة، بأننا علينا - نحن أيضًا - أن نطور مفاهيمنا العلمية، على أساس الافتراضات التي سوف تثبت صحتها فقط، عندما تتم الإجابة عن كل الأسئلة التي تثار حولها.

وإذا كنت تعتقد أن الأرض هي مركز الكون، إذن، فإن كونك سوف يكون - نسبيًا - مكانًا صغيرًا محدودًا. أما إذا قبلت كحقيقة أن الأرض تدور حول الشمس، فإن الكون يجب أن يكون أكثر رحابة وأشد اتساعًا، ويرجع السبب في هذا إلى تأثير ما يطلق عليه "التزيّج"<sup>(١)</sup>. وللوضوح التزيّج، حاول أن تمد ذراعك، وإصبع يدك موجه إلى الأمام، ثمأغلق إحدى عينيك. ويعينك المفتوحة سوف ترى إصبعك يستقيم مع هدف ما بعيد، يستقيم مع نفس النقطة، ولكن مع هدف آخر، إن هذا التزحز (التبديل في الموقع)، هو ما يطلق عليه اختصاراً "التزيّج".

إن هذه التجربة التي أجريتها في التو، تم تمثيلها بمخطط بصفحة ٢٣ في (الشكل ١-٢). (إلى أعلى). إنك عندما تنظر بعين واحدة في اتجاه إصبعك، فإن خط الرؤية بالنسبة لك - كما هو موضح في المخطط - يمكنك من رؤية النقطة آ على استقامة إصبعك الموجه إلى الأمام. وعندما تنظر من خلال العين الأخرى، فإن خط

(١) تغير ظاهري في موقع الشيء المرصود وخاصة الجرم الفضائي، بسبب اختلاف مكان الرؤية. (المترجم)

رؤيتك يتزحزح، ومن ثم، فإنك ترى إصبعك يستقيم مع النقطة ب. وليس ثمة غموض هنا، ولكن مجرد مسألة هندسية بسيطة.



والأمثلة عديدة على هذه الظاهرة. فإذا كنت تقود سيارتك على طول طريق سريع، كما هو موضح في (الشكل ١-٢). (في المنتصف)، فربما يبدو لك منزل يتحرك عكس الخلفية البعيدة. وهذه الحركة الظاهرة، أحدثتها الحقيقة، التي مفادها أنه بينما تتحرك سيارتك، فإنك تنظر إلى هذا المنزل من زوايا مختلفة على طول الطريق.

ولنفترض الآن، أن الأرض تتخذ لها مداراً حول الشمس بالفعل، كما هو موضح في (الشكل ١-٢). (إلى الأسفل). فإذا نظرت إلى نجم قريب في فصل الصيف، فإنك سوف تراه يستقيم مع نجم أكثر بعداً، مثل الميَّز بحرف "أ" في الشكل. وبعد ستة أشهر، عندما تكون الأرض في منتصف المسافة من مدارها حول الشمس، سوف يكون أقرب نجم على استقامة مع شيء مختلف مثل ذلك النجم الميَّز بحرف "ب". تماماً كما بدا المنزل يتحرك، عندما كانت سيارتك تتحرك على طول الطريق السريع، فالنجوم والكواكب يجب أن تظاهر وكأنها تتحرك، مثل الأرض التي تتطلق في مدارها.

والتربيَّ النجمي، أي الحركة الظاهرة للنجوم التي تسببها حركة الأرض في مدارها، يمكن رصدها بواسطة التيلسكوبات الحديثة، بيد أن التأثير يكون ضئيلاً للغاية، إلى حد أنه لا يمكن أن يُكشف عنه، بأي من أجهزة الرصد الفلكية التي كانت متوفرة لليونانيين أو لعلماء العصور الوسطى. كل ما كان لديهم الملاحظة بالعين المجردة. وبالنسبة لهم لم يكن هناك أي تربيع، ومن ثم كانت هذه حقيقة مهمة استنعوا إليها، ضد أي محاولة تهدف إلى اعتبار الأرض ليست في مركز الكون، ووضعها في مكان آخر.

وعلى الرغم من اقتراح بعض "العلماء" اليونانيين مثل (فيثاغورث) و(هيباركوس)<sup>(١)</sup> أن الشمس ربما تربض في مكان مركزي في الكون، فإن مجادلاتهم لم تؤخذ على محمل الجد.

---

(١) فلكي يوناني شهير (١٢٠ - ١٩٠) قبل الميلاد. (المترجم)

والسبب في الغياب الواضح للتزيّن، أن الكون متراكمي الأطراف ورحب إلى حد أنه لا يمكن رؤية أى تزيّن بالعين المجردة. ولم يقترح وجود التزيّن إلا في القرن السابع عشر. وكان نموذج الكون البطليموسى، متوافقاً إلى حد كبير مع طريقة تفكير العلماء في العصور الوسطى.

وما إن قدمَ هذا النموذج لأوروبا في القرن الثاني عشر (عن طريق ترجمة من الكتب العربية المأخوذة من النصوص اليونانية القديمة) اجتاحت الجامعات كال العاصفة الهوجاء. وكان الاعتراض الوحيد لنموذج الكون البطليموسى - وفق ما توصلت إليه - من (إيتين تيمبى) أسقف<sup>(١)</sup> باريس، الذي قام في عام ١٢٧٧ بإصدار ٢١٩ شجباً وإدانة وتوبیخاً حاداً، للتعليم اليوناني الجديد، الذي كان يدرس في الجامعات الأكاديمية.

ويبدو أن اعتراضه الرئيسي، ينحصر في أن الحديث عن قوانين الطبيعة، يجعل الكليات العلمية تحد - إلى حد ما - من سلطة رب. وأعترف: (في قراره نفسي، أن هذا الجدل يصيّبني بالشعريرة؛)

وعلى أية حال، فإن الكون البطليموسى، سرعان ما اندمج مع الفكر المسيحي، كما هو واضح في (الشكل ١-٣)، الذي يمثل حفرأً خشبياً من "قصص الكتاب المقدس" تأليف (مارتن لوثر)<sup>(٢)</sup>، الذي نشر في عام ١٥٣٤، وتظهر فيه عملية الحق، كرات متحدة المركز وجنتها عدن في المركز.

---

(١) رجل دين مسيحي ثُو منزلة رفيعة. (المترجم)

(٢) (١٤٨٣ - ١٥٤٦) راهب ألماني وأستاذ للاهوت، قام بثورة ضد الكنيسة. (المترجم)



الشكل 1.3

ويطابق الكون البطليموسي الرأى الذى ساد من قبل عن الكون "الروحى" الذى احتل فيه الإنسان مكانة متوسطة، حيث يوجد الجحيم أسفل قدميه والجنة من فوقه. والأجرام السماوية كالنجوم والكواكب، كانت بين الإنسان والسماء. وتزودنا البراكين بلمحات ونظرات خاطفة عن العالم السفلى، واللون الأزرق للسماء وقت النهار، كان انعكاساً لبهاء الجنة ومجدها.

ويذرع الشياطين الأرض أثاء الليل، عندما تقوم الظلال بمحبب الوهج السماوى، وهذا دليل آخر على منطقية هذا الكون، وقد قام عالم كبير ولاهوتى عظيم

هو (توماس أكويناس) (١٢٢٤ - ١٢٧٤)، بتأسيس مبدأ حق العقل العلمي، ليعمل وفقاً لقواعد الذاتية، ضمن الإطار الأكبر للعقيدة المسيحية، وهذا ما زاد من قوة فكرة أن الأرض هي مركز الكون، وسارت هذه الفكرة جنباً إلى جنب مع العقيدة المسيحية.

وهكذا، جمع مفهوم الكون في العصور الوسطى، أفضل ما في كلا الكونين: فلك اليوناني العقلاني الذي يتضمن الظواهر الكونية والميثولوجيا<sup>(١)</sup> التي سادت في العصور القديمة، وكانت تشبع احتياجات ورغبات وتوقعات الحياة والطبيعة الروحية. ولا عجب أن الكنيسة والسلطات العلمانية في أواخر عصر النهضة، كانوا متربدين إلى حد كبير، في التخلص من هذا التركيب.

ومع هذا، فقد تخلصوا من ذلك التركيب بمرور السنين، إذ إن الافتراض اليوناني القديم، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام بطليموس في الفلك، لم يقو على الوقوف أمام الرصد بواسطة الأجهزة المتقدمة.

وعندما حاول بطليموس حساب حجوم ومعدلات دوران الكواكب التي داخل الكواكب، قام بتعديل النتائج حتى تنسجم مع الأرصاد التي كانت متاحة في عصره. وهذا مشابه لضبط ساعتك وفق المرصد الفلكي البحري في الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا قمت بالتعديل بدقة، سوف يسير كل شيء على ما يرام لفترة، سواء كان ذلك كوناً أو مجرد ساعة.

ولكن مع مرور الوقت، فإن أي خلل بسيط في ساعتك، سوف يخرجها من التزامن<sup>(٢)</sup> مع الوقت الصحيح، وكلما طال انتظارك، زاد التعارض الظاهري، وقد حدث نفس هذا الشيء لكن بطليموس الذي يشبه الساعة الفلكية.

---

(١) مجموعة من الأساطير الخاصة بشعب ما وعاداتهم ونظمهم الاجتماعية. (المترجم)

(٢) الوقع في زمن واحد. (المترجم)

وفي أواخر العصور الوسطى، أبدت الساعة الفلكية القديمة جلياً عدم دقتها، فإذا قام الفلكيون بحساب الموضع الذي يجب أن يكون فيه أحد الكواكب، يتضح لهم أنه ليس هناك.  
وقد أجرى البعض تجارب غير حاذقة ومحاولات تجريبية لتعديل فكرة الكرة الكونية. ولكن بسبب الاحتراض الفائق لتعاليم الأقدمين، لم يفكر أحد بجدية في التفحص الشامل، من أجل إجراء الإصلاحات الشاملة لنظام بطليموس الفلكي.

وكان هناك استثناء واحد، رجل دين بولندي منعزل عن الآخرين، يعمل في كاتدرائية<sup>(١)</sup> تقع على نهر فيستولا<sup>(٢)</sup>. إنه (نيكولاس كورنيكوس) الذي لم يزعج نفسه بالمشاكل التي أفرزها النظام البطليموسى، بسبب محاولات مواعنة النظرية والتفكير النظري من الملاحظات الفلكية الفعلية.

والواقع أن (كوبيرنيكوس) لم يظهر براءة كفلكي أو راصد للكون. وبدلًا من التحديق والنظر بتمعن إلى النجوم، قضى وقت فراغه في مكتبه، يدرس بعناية وتروي، ويتفحص بدقة ويتأمل، ويصمم النماذج الرياضية. وكان هدفه أن يتعرف على إمكانية ابتكار نموذج للكون، يعمل مثل كون بطليموس، ولكن تأخذ فيه الأرض مداراً حول الشمس، وليس العكس.

وكما حدث، فإن الإجابة عن هذا السؤال كانت بالإيجاب، فقط بسبب تلك الطريقة القليلة الكفاعة التي جمعت بها المعلومات في النظام البطليموسى.

والىوم، نحن نكرّم (كوبيرنيكوس) ليس لأنّه قدم لنا النموذج الحديث للمنظومة الشمسيّة أو لأنّ منظومته كانت أكثر بساطة من منظومة بطليموس، ولكن لأنّه كان الشخص الوحيد في العصر "الحديث"، الذي واتته الشجاعة أن يفكّر فيما لم يخطر على بال أحد من من قبل، والشجاعة والمثابرة في الدفع بآفكاره وأرائه، إلى ما بعد الكوت التأمل الفلسفـي. إن (كوبيرنيكوس) هو الشخص الذي أوضح أن ملائـس

(١) كنيسة مركبة ضخمة. (المترجم)


(٢) أطول نهر في بولندا طوله ٤٧٠ كيلو مترًا. (المترجم)

الإمبراطور قد تكون غير موجودة، ومن ثم، أصبح كل شخص يأتى بعده، ينظر إلى "مركزية الأرض" ك مجرد افتراض، يمكن مناقشته مثل أي افتراض آخر.

وبعد أن تمت الموافقة على هذا الرأى، كان لابد من نبذ الفكرة التى سادت فى العصور الوسطى عن الكون المحدود والمغلق. ولتفسير حركات الكواكب، كان من الضروري، أن توضع الشمس في المركز، وينظر إلى الأرض على أنها تتخذ مداراً حولها.

ولتوفيق هذه النظرية مع غياب "التزييج"، كان من الضروري افتراض أن النجوم والكواكب كانت أكثر بعداً في الكون، عما تخيل أي شخص من قبل.

لاحظ كيف تسير هذه المجادلة. لقد قدمنا التزييج من قبل، بالمثل الذى يتضمن استقامة شىء بعيد مع إصبع يدك، أولاً بفتح إحدى عينيك، ثم بالعين الأخرى، حاول أن تجعل نفس الشىء، مع شيئاً بعيدين، مثلًا تل مرتفع وسحابة تناسب فى السماء. سوف ترى في التو، أنه على الرغم من أن العينين المتباوتين ستتعalan التل والسحابة يتحركان بالنسبة للأشياء القريبة الأخرى، فإنهما لن يقفزا بحركة دائيرية في كل اتجاه، بالنسبة لبعضهما، وهذا موضع إلى "اليسار في (الشكل في ١٤) والسبب في اختفاء التزييج عن الأنظار هو أن الاختلاف في الزاوية بين خطى الرؤية، ضئيل للغاية بحيث لا تتمكن العين من مشاهدته.



الشكل 1.4

وبالنسبة للعين، فإن خطى الرؤية متوازيان تماماً. ولكن لن يكون هناك أى فرق إذا اخترت أى خط منهما، حيث ستكون النتيجة واحدة، وهى أن الأشیاء لا تتحرك بالنسبة لبعضها. وبنفس الطريقة، إذا كانت النجوم والكواكب بعيدة بعداً شاسعاً عن الأرض (انظر إلى الجانب الأيمن من الشكل ١-٤)، فلا يمكن رؤية التزierung، دون منظومات رصد وكشف متقدمة. ومن ثم، فإن قبولنا لكون كوبيرنيكوس، يتطلب أن تكون النجوم بعيدة للغاية عن الأرض. وللتوصيل إلى نموذج أفضل للمنظومة الشمسية عما تصوره بطليموس، فإن علينا أن نتخلى عن الفكرة المريحة التي سادت في العصور الوسطى عن محدودية الكون، ونواجه الحقيقة بأننا نعيش في كون، كل دلالاته وأهدافه، تدل على أنه غير محدود، كما اقترح (أرخيتاس) ورامي رمحه.

ولم يكن (أرخيتاس) هو الشخص الوحيد - عبر التاريخ - الذي فكر مليئاً في احتمالية أن يكون الكون غير محدود. ففي القرن الرابع عشر، كان له نظير هو الكاردينال<sup>(١)</sup> (نيكولاوس أوف كوسا)، الذي ناقش في كتابه "عن الجهة المكتسبة بالتعلم، أن الإنسان - أيّمنا يقف - يعتقد أنه في المركز، ومن ثم، فإن "الكون" مركزه في كل مكان، ومحيط دائرته ليس في أى مكان". وهذا التصور القبلي المذهب للشكل الحديث للكون، تجاهله معظم العلماء والباحثين.

ولهذا السبب، عندما تحددت آفاق الكون، بنظرية (كوبيرنيكوس)، كان من الصعب على أي شخص أن يكون مستعداً لمواجهة هذه الصدمة.

ومع هذا عندما استقرت الأمور وخفت حدة الاعتراضات، انبعث تصوّر يشبه إلى حد كبير فكرتنا عن الكون الحديث. ولم يعد الجنس البشري يرى في نفسه أنه يحتل مركز الكون، ولكن - بدلاً من ذلك - أصبح يعتقد أن موطنـه الكبير، كوكـب الأرض، عبارة عن كرة صخرية تتـخذ مداراً حول الشـمس، بصحبة الخـمسة كواكب التي كانت معروفة في ذلك الوقت.

---

(١) عضو كنسي بارز في المذهب الكاثوليكي المسيحي يسمى البابا. (المترجم)

وخارج مدار كوكب زحل، على بعد مسافات مروعة لا يمكن تخيلها، تنساب النجوم في الفراغ. ولم تعد السماء سقفاً يطوق كل المخلوقات، كما أنها لم تعد تعكس الإشعاع اللطيف والمرير للجنة.

بيد أننا اكتسبنا شيئاً ليغوضنا عن هذه الخسارة. وعلى الرغم من أن السماء لم تعد سقفاً، فقد كانت - على الأقل - مدخلاً ومنطقة حدودية. وإذا وجب علينا الاعتراف بأننا لسنا في مركز الكون، فلدينا القدرة على مواجهة الحقيقة الكاملة، بصدر رحب يريحنا ودون أن ننفل أو يغمض لنا جفن، ونستمر في بحثنا، لنجتاز من كوننا المتعدد، كل أسراره الكامنة في أعماقه. وربما بعد أن ننتهي من أداء هذه المهمة، سوف نقارن بين الإنجازات التي حققناها، والتكاليف التي تكبّدناها لتحقيق هذه الإنجازات.

### بعض الملاحظات الشخصية

إن إحلال التصور الوجوداني والروحي للكون، الذي أشبع الرغبات والتوقعات والاحتياجات، بالكون الذي تميز بالأليلة ومنهجية العلم، لم يحظ بقبول عالمي عبر العصور، وسطور (والتر وايتمان) التي تصدرت هذا الفصل، تصريحاً واضحأً للرأي المعارض، الذي - على الأرجح - يمكن أن يصدر عن شخص ما. وتعد حركة الثورة الثقافية المضادة في الستينيات من القرن العشرين، أحدث اندلاع مفاجئة لهذا الاتجاه.

إن كل من يقوم بالتدريس في إحدى الجامعات، لن يستطيع أن يبقى غير مدرك للحقيقة، بأن عدداً كبيراً من الناس - حتى الحاصلين على تعليم عالي - يوافقون تماماً على الرأي الذي عبر عنه (وايتمان).

وثمة اعتقاد سائد - على الرغم من أنه نادراً ما يكون قادراً على التعبير عن نفسه بسهولة بشكل واضح ومؤثر - إنه بدراسة أمر ما بطريقة تحليلية، فإننا ندمر

ما يمكن فيه من جمال مثير للإحساس العاطفى والفكري. وعبر عن هذا (ورذ وورث) بقوله "إننا نقتل لكي نتفحص ونحلل بطريقة ناقدة ودقيقة" وقبل المضى فى تفحص تفاصيل كون الثمانينيات من القرن العشرين، أود أن أقرر هنا بأن هذا الكون جدير بذلك النوع من الإعجاب المتسم بالحساسية المرهفة للجمال، الذى وهبها (وايتمان) لليلته المرصعة بالنجوم.

ومن ناحية أخرى، فإن الفكرة التى أثارها (وايتمان)، غير قابلة للمناقشة: أن التجربة الحسية المباشرة، تكون دائمًا هادفة أكثر من التحليل النوعي. وهذا هو أحد الأسباب، التى تضع فيها برامج الفضاء تاكيداً كبيراً على إخراج صور للأشياء التى يتم اكتشافها، حتى لو كانت هذه الصور باللون غير حقيقية، ولكن هذا لا يماثل القول بأننا "يجب أن نرى الأشياء مباشرة بأعيننا المجردة، حتى يمكننا إدراك قيمتها".

إننا نستطيع الاستمتاع بصور جبال "الهيمالايا"<sup>(١)</sup>، ونستخلص منها متعة جمالية، حتى لو كنا لم نسافر إلى "كاتماندو"<sup>(٢)</sup> فقط. أرجو أن تنظر إليها من هذه الوجهة: أخرج إلى الخلاء أنشاء الليل وتطلع بصمت تام إلى النجوم، وسوف ترى على الأكثر نحو ألفين وخمسمائة نجم، وكوكب واحد أو اثنين. إننى أتفق معك، أن هذا المشهد رائع للغاية، بيد أنه مجرد قطرة فى دلو، مقارنة بما هو موجود فى الكون من أجرام فضائية، إذ إن مجرتنا (الطريق اللبنى) بمفردها تحتوى على أكثر من عشرة بلايين نجم<sup>(٣)</sup>، وهى مجرد واحدة من بلايين المجرات التى يزخر بها الكون. وإذا قيدنا معرفتنا بالكون، بما يمكننا إدراكه بشكل مباشر عن طريق الحواس، فإننا بهذا نتعمد

(١) سلسلة من الجبال تتدلى نحو ٢٤٠٠٠ كيلو متر، وتمر فى الصين والهند وبنغال وباكستان وبوتان وأنغافانستان. (المترجم)

(٢) عاصمة دولة بنغال فى آسيا. (المترجم)

(٣) البليون ألف مليون. (المترجم)

التقليل من قيمة أبحاثنا، بقبول تجربة أقل ثراء مما يجب أن تكون عليه. ولا ريب أنه شيء رائع، أن نرى نجماً في السماء التي نقوم بدراستها، ولكن ثمة جمال أخاذ في صورة المجرة المأخوذة بالأشعة تحت الحمراء<sup>(١)</sup>، صورة لحلقات كوكب زحل التي التقطتها المركبة الفضائية (فوياجير)، أو صورة مُنشأة بالحاسوب، لعقود هائل من المجرات، يبعد عنا بمسافات مروعة، وهو ينتشر بجلال عبر السماء. وبالتأكيد ثمة دور لكل من الشاعر والتكنولوجي في علم الفلك المعاصر. بيد أن هناك أمراً بالغ الأهمية، لم يستطع نقاد العلم إدراكه، وهو الذي يتعلق بما حصل في الكون الحديث.

حقاً إننا استبدلنا بكون له بعد آدمي - أي مثال للضعف والخطأ الإنساني - آخر متراكم الأطراف بشكل لا يمكن تخيله وكذلك أكثر تعقيداً. وعلى الرغم من ذلك، أليس من الأهمية أن يشبع كوننا قدرتنا على الفهم والتعلم والتفكير بالإضافة إلى احتياجاتنا ورغباتنا وتوقعاتنا ووجوداتنا وخلجاتنا؟

أليس من الأهمية، أن كوننا، بالرغم من هذا الاتساع الهائل والتعقيد المرئي، ما زال العقل البشري قادرًا على سبر غوره واكتشاف ذلك النظام الجومري الدقيق والمنطقى الذى يحكمه، والذى يدعم تعقيده؟

نعم، لقد استبدلنا بكون يتخيل فيه البشر، أن بمقابرهم السيطرة على الآلهة، من خلال مجموعة من الطقوس والشعائر الدينية، آخر تكون فيه سيطرتنا على الطبيعة، تتآتى من خلال إدراك قوانينها الأساسية، ولكن - فى الحقيقة - هل يمكنك أن تستبدل جراح مشعوذاً إذا كنت مصاباً بالتهاب الزائدة الدودية؟

لقد قمنا بالفعل بمقايضة كون يتدخل فيه الخالق جل شأنه في الأمور البشرية، بكون آخر يقتصر فيه دور الإله، على ابتداع قوانين الطبيعة ثم يدع - بعد ذلك - كل الأشياء تنتشر وتنتفع ذاتياً، دون الحاجة إلى أي تدخل آخر منه.

---

(١) إشعاع كهرومغناطيسي حراري غير مرئي. (المترجم)

ولكن أليس من الأفضل أن يكون لك إله، يعرف كيف يدير أمور الكون بالطريقة  
الصحيحة وبدقة تامة؟

كل ما يمكنني قوله، إننى أفضل كوناً تسسيطر عليه الحقائق الواضحة والثابتة  
للقوانين الفيزيائية، وتميز بجماله الأخاذ فى كل أجزائه، وقد ابتدعه العقل البشري.  
وإننى لن أستبدل هذا الكون المعاصر، بأى كون آخر ذكر آنفاً.

## الفصل الثاني

### اكتشاف المجرات

قال رفيقى الطيب: «الآن يجب أن نصلى، انظروا لقد اختفت النجوم وهذا شيء عجيب».

وقال قائد الأسطول الشجاع: «ماذا يمكنني أن أقول؟ قل واصلوا الإبحار! واصلوا الإبحار».

جوakin ميلر

كولومبوس

ما إن نبذ العلماء فكرة أن الشمس توجد في مركز الكون، وأن الكون أصبح أكثر اتساعاً ورحابة، بدأ الناس في التساؤل عن كيفية جمع أجزاء الكون معاً. لقد كان فلكيو القرنين الثامن والتاسع عشر، مثل رحالة اكتشفوا قارة جديدة، تحتاج إلى من يسبر غورها ويرسم خرائط دقيقة لتضاريسها.

ما دامت القدرة على رصد الأجرام الفضائية في السماء، كان يحد منها قوة التلسكوب ودرجة استجابته، فإن الرادار الذي يستخدم تلسكوباً أكبر كان بمقدوره التوصل إلى اكتشاف عظيم.

ويتعاقب السنين، آثار تفحص الكون بدقة، سؤالين جوهريين يمعن العلماء التفكير فيهما: كم يبلغ حجم مجرة "الطريق اللبني"؟ هل هناك جزر كونية أخرى - أى مجرات - في الكون؟

ومع كل اكتشاف جديد، يزداد حجم الكون المدرك عن طريق الحواس، ومرة تلو الأخرى، وجد الفلكيون أنفسهم يرصدون كوناً مروعًا أضخم من أى شيء تخيلوه. وكان التطور التاريخي لحامل الرمح العتيق، مرتبطةً بشكل واضح، بمدى مقدرة الإنسان المعاصر، على الإجابة والتعامل مع السؤالين المذكورين آنفًا.

وإذا وقفت بالخلاء في ليلة صيف صافية، وتطلعت إلى السماء، لشاهديت - بلا ريب - مجرة "الطريق اللبني". حشد من بلادين النجوم (معظمها لا يرى بالعين المجردة)، تندمج معاً لتكون دربًا مزدداً، عبر الظلمة. إنه أكثر السمات البارزة والمثيرة، للليل السماء. كما أنه يمدنا بتأول مفتاح لغز بنية الكون، خارج المنظومة الشمسية. وعمومًا فإنه يمكن اعتبار "توماس رايت Thomas Wright" (١٧١١ - ١٧٨٦)، الفيلسوف الطبيعي<sup>(١)</sup> (الإنجليزي)، أول شخص تأمل بفاعلية في بنية (إن لم يكن حجم) المجرة، التي نطلق عليها في الوقت الحاضر "الطريق اللبني". وتغلب على مصنفه الذي كتب حوالي عام ١٧٥٠، النزعة الصوفية الغامضة وطابع القرون الوسطى العتيق. ونظر إلى الكون باعتباره من خلق الله جل شأنه، وأن دراسته وتفحصه بدقة، مقتربة بعلم اللاهوت<sup>(٢)</sup>.


وفكراً بمنطق أن الله خلق الكون في أكمل صورة، ومن ثم، فلا بد أنه شيد في شكل كرات. ودأب الفلكيون الذين يتبعون نظرية (إسحق نيوتن)<sup>(٣)</sup>، بينما كانوا يقومون بحساب المدارات البيضاوية للكواكب، على أبعاد المجال الكروي إلى خارج المنظومة الشمسية، بيد أن (رايت) قام بمحاولة جريئة لإعادته إلى داخل إطار الكون الأكبر.

(١) الفلسفة الطبيعية (أو فلسفة العالم الفيزيائي)، مصطلح يطلق على نراسة الطبيعة وما فيه الكون. (المترجم)

(٢) دراسة طبيعة الله والحقيقة الدينية. (المترجم)

(٣) عالم إنجليزي شهير (١٦٤٢ - ١٧٢٧) في الفيزياء والرياضيات. (المترجم)

وَثِمَة مُخْطَطٌ أُولَى لِلْكَوْن كَمَا تَصْوِرَهُ (رَأْيَتْ) فِي (الشَّكْل ٢-١)، حِيثُ تَوْجَد النَّجَومُ دَاخِل دَائِرَتَيْنِ مُتَحَدِّتَيِ الْمَرْكَزِ، وَالجَنْسِ الْبَشَرِيِّ، الَّذِي يَسْتَوْطِنُ كُوكَبَ الْأَرْضِ، يَتَحَدَّدُ مَوْقِعُهُ فِي مَكَانٍ مَا بَيْنَ الشَّكْلَيْنِ الْكَروِيْنِ، كَمَا هُوَ مَوْضِعُ فِي الرَّسْمِ:



الشكل 2.1

وَعِنْدَمَا نَنْظَرُ فِي اِتْجَاهِ الْمَاسِ<sup>(١)</sup> لِلَّدَائِرَتَيْنِ، فَإِنْ خَطٌ رَؤْيَتِنَا سُوفَ يَقْطَعُ نَجَومًا عَدِيدَةً. وَمَعَ هَذَا، إِذَا تَطَلَّعْنَا اِتْجَاهَ الْخَارِجِ بَعِيدًا عَنِ الْمَرْكَزِ، أَوْ إِلَى الدَّاخِلِ نَحْوَ الْمَرْكَزِ عَلَى طَوْلِ نَصْفِ الْقَطْرِ، فَإِنَّا سُوفَ نَرَى عَدِيدًا قَلِيلًا لِلْغَايَةِ مِنَ النَّجَومِ وَهَذَا التَّقْسِيقُ - طَبِقًا لِتَصْوِيرِ (رَأْيَتْ) - يَبْرُرُ لَوْجُودَ مَجْرَةً "الطَّرِيقِ الْبَنِيِّ"， وَيَحدِّدُ اِتْجَاهَ الْمَاسِ لِلَّدَائِرَتَيْنِ.

وَتَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْمَجَادِلَةِ إِفَادَةً عَنْ حَجمِ الْكَوْنِ، حِيثُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ نَصْفُ قَطْرِ الدَّائِرَةِ الدَّاخِلِيَّةِ، كَبِيرًا بِقَدْرِ كَافٍ، حَتَّى إِنَّا عِنْدَمَا نَنْظَرُ إِلَى الدَّاخِلِ، عَبْرِ مَرْكَزِ الدَّائِرَةِ الْكَوْنِيَّةِ، فَإِنَّا لَا نَرَى تَرْكِيزًا مُتَكَافِئًا لِلنَّجَومِ، إِلَى الْجَانِبِ الْبَعِيدِ.

(١) خَطٌ أَوْ مَنْحَنِيٌّ يَلْمِسُ وَلَكِنْ لَا يَتَنَاطِعُ مَعَ أَخْرِيٍّ. (المُتَرْجِمُ)

كذلك يجب أن يكون نصف القطر كبيراً بقدر كافٍ، حتى إننا إذا نظرنا تماشياً، فلن نرى التقوس في المجرة، بل سوف تبدو لنا - إلى حد ما - خط مستقيم.

وأعتقد أن (رأيت) لم يتبع البحث في هذه النقطة، حتى يمكن في نهاية الأمر، من تقدير حجم الكون برمته، إذ إنه تصور العلم كوسيلة لتقين الدرس الأخلاقية، أكثر من كونه هدفاً في حد ذاته. وفي عام ١٩٦٦، تم الكشف عن بعض من مخطوطاته التي لم تنشر، وكان عنوان إحداها "أفكار ثانية أو فردية عن نظرية الكون"، وتضمنت نموذجاً مبنياً أكثر على اللاهوت، وفيه تكون الشمس في مركز دائرة مفعمة بالنجوم. واستخدم (رأيت) قياس التشبيه<sup>(١)</sup> لبعض الظواهر الطبيعية الأرضية - مثل زلزال شبونة<sup>(٢)</sup> - لتفسيير مجرة "الطريق اللبناني"، كحمل<sup>(٣)</sup> سماوية تتدقق في مجال الدائرة الكونية.

ويبدو أن هدفه كان منظومة، فيها نسق من الأكوان المادية والأخلاقية المتاظرة تماماً فيما بينها.

ويصعب القول، بما إذا كان (رأيت) يريد الرجوع إلى النماذج السالفة للكون أو أنه مبشر بعلم حديث. وقد حاول أيضاً علماء الاجتماع الذين يتبعون الداروينية<sup>(٤)</sup>، في أواخر القرن التاسع عشر، أن يرسموا تنازلاً وظيفياً، بين النظام البيولوجي للطبيعة والنظام الاجتماعي للجنس البشري. وهذا ما يفعله أيضاً الماركسيون<sup>(٥)</sup>.

---

(١) شكل أو حالة من الاستدلال أو الاستنتاج المنطقى. (المترجم)

(٢) زلزال رهيب ضرب مدينة شبونة عام ١٧٥٥، وبعد الأشد فتكاً ودميراً في التاريخ. (المترجم)

(٣) مقوفات البراكين. (المترجم)

(٤) نظرية في النشوء والارتقاء طورها (داروين). (المترجم)

(٥) أتباع (كارل ماركس) (١٨١٨ - ١٨٨٣) وهو فيلسوف ألماني واقتصادي وعالم اجتماع. (المترجم)

ولم يغب عن ذلك الاتجاه باستخلاص تناozرات بين العلم والحقائق الاجتماعية والأخلاقية، خاصة في العصور الأكثر تنويراً. وأنذر - على سبيل المثال - أنتي قرأت أطروحة، جادلت قوانين ميكانيكا الكم<sup>(١)</sup>، ويرهنت على أن جدول أعمال الحركة السياسية النسائية الجذرية، والتي داع صيتها في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، كانت البنية السياسية الوحيدة، التي تتناغم مع العالم الطبيعي.

ولكن تماماً كما أدرك العلماء الذين أتوا بعد (رأيت)، أن شكل الكون ليس له أي علاقة، بال تعاليم الأخلاقية للكنيسة الأنجلو-كاثوليكية<sup>(٢)</sup>، وكما أنتا أدركنا بدورنا، بما لا يدع مجالاً للشك، أن التزامنا الأخلاقي يدفعنا إلى الاهتمام بمن هم أقل حظاً منا، والذين ليست لهم أى صلة عما إذا كانت الطبيعة تعمل طبقاً لمبدأ البقاء للأصلح<sup>(٣)</sup> أم لا. وأأمل أن يتمكن خلفاؤنا من العلماء - في نهاية الأمر - من تبيان أن قوانين الطبيعة موضوعية، وأنها لا تشتمل على أية تعاليم عن كيف علينا أن ننظم مجتمعنا أو نعيش حياتنا. ولتحديد مثل هذه الأمور، فإننا أحجار فيما نفعله.

ولم يتبع (رأيت) كثير من رجال العلم في بحثه عن نظام أخلاقي في خضم الكون. وجاءت أول محاولة حديثة، لسير غور مجرة "الطريق اللبناني"، بواسطة (وليام هيرشل)، الذي ولد في ألمانيا في عام ١٧٢٨، وكان قد استهل حياته العملية كعازف مزمار في أوركسترا عسكرية، ثم هاجر إلى إنجلترا، حيث أصبح موسيقياً مرموقاً وصانع آلات موسيقية.

كما أنه قام - بجانب عمله الأساسي - بتأليف بعض المقطوعات الموسيقية. ولم يكن هذا هو السبب الرئيسي لاكتسابه الشهرة فيما بعد. وعندما عرض مسار<sup>(٤)</sup> (أدلر) في شيكاغو، مجموعة من الأجهزة الفلكية القديمة، كانت هناك لوحة تصويرية

(١) نظرية فيزيائية أساسية خاصة على المستوى الذري وبين الذري. (المترجم)

(٢) الكنيسة الإنجليزية والكنائس الأخرى المتواقة معها. (المترجم)

(٣) أساليب أخلاقية لإجراء النجاح الشخصي والمؤسسي. (المترجم)

(٤) قاعة فيها جهاز يظهر حركة سير الشمس وكواكب وأقمار المجموعة الشمسية. (المترجم)

تمثل (هيرشل) يحدق في السماء، بينما كان هناك تسجيل لإحدى مقطوعاته الموسيقية التي تعزف على البيان القيثارى<sup>(١)</sup> ترافق الأفلام التسجيلية الدعائية.

وقرر (هيرشل) في نهاية الأمر، أن يجعل من هوايته الفلكية اهتمامه الأساسي، وعلى الرغم من انخفاض دخله نتيجة لهذا القرار، فإنه أصبح فلكياً محترفاً.

وقد انصبت أبحاثه على رسم خريطة للسماء، عن طريق إحصاء عدد النجوم التي كان بمقوره رؤيتها، عندما كان يوجه تلسكوبه في اتجاه معين. مفترضاً أن النجوم موزعة - بشكل أو بآخر - على نسق واحد في الفضاء، وعلل ذلك، أنه عندما رصد مساحة شاسعة عبر الكون (أو بالأحرى عبر المجرة)، كان يرى عدداً هائلاً من النجوم، وإذا نظر في اتجاه نحو الحافة، فإنه لا يشاهد الكثير منها. والخلاصة التي توصل إليها من مخطط مسح السماء: أن الكون مسطح، ولكنه غير منتظم الشكل، شيء ما يشبه أنياباً<sup>(٢)</sup> مهروسة. وبين مخطط (هيرشل) لجرة الطريق اللبناني، في (الشكل ٢-٢).



الشكل 2.2

وبينما كان المسح النجمي للسماء يجري على قدم وساق، تم التوصل إلى سلسلة أخرى من الاكتشافات الفلكية تتعلق بأجرام سماوية ضبابية يكتنفها الغموض، أطلق عليها "السدم" (أى السحب الكونية). وعندما تكون ظروف الرصد جيدة، يمكن رؤية هذه السدم، بالعين المجردة.

(١) آلة وترية قيمية تشبه البيانو. (المترجم)

(٢) كائن يقيني وحيد الخلية. (المترجم)

وقد كانت معروفة للفلكيين العرب في القرن الثامن الميلادي، ويمكنك أن ترى بنفسك أحد هذه السدم، إذا نظرت إلى كوكبة<sup>(١)</sup> (أندروميدا) "المرأة المسلسلة"<sup>(٢)</sup>، التي تكون فوق مستوى الرأس، في السماء خلال فصل الخريف والشتاء. وما سوف تراه، رقعة ضوء ضبابية بيضاء، أكبر كثيراً من أن تكون نجماً، بيد أنها ليست براقة للغاية أو تمثل مشهداً مثيراً. وعندما تمت دراسة بعض هذه السدم بالتلسكوبات، اتضح أنها تشتمل على نجوم مرئية على خلفية متألقة ولكنها غائمة، وكان الفيلسوف الألماني (إيمانويل كانط)<sup>(٣)</sup>، وهو أول من اقترح - في عام ١٧٧٥ - أن هذه السدم، ربما تكون جزراً كونية أخرى، كالمجرات، مثل مجرتنا (الطريق اللنبي)، وبسبب الافتقار إلى وسائل الرصد الحديثة، التي توفر فحصاً أكثر دقة لتراثيتها، بقي السؤال عن الهوية الذاتية للسدم أكثر فلسفياً منه علمياً.

وفي عام ١٨٤٥، كان (ويليام بارسونز) إيرل<sup>(٤)</sup> (روس)، يمتلك تلسكوباً شيد في إنجلترا، وكانت أهم أجزاءه التشغيلية، مراة قطرها - الذي لم يسبق له مثيل - يبلغ اثنين وسبعين بوصة. وأمكن له باستخدام هذا التلسكوب القوى ، أن يسبر غور التركيب الحلواني للعديد من السدم في السماء. وعلى الرغم من أنه كان يجري أرصاده في فترة سبقت توفر إمكانية تصوير الأجرام السماوية للفلكيين، فإن رسوماته التخطيطية للسدم، تذكر الإنسان بالصور الحديثة التي التقطت لل مجرات حيث تظهر بوضوح بالغ، تلك الأقراص الدائرية المسطحة وأندرعها اللولبية المتعددة. ولأن بعض السدم تبدو كأن شكلها المسطح يناسب إلى مجرة (الطريق اللنبي)، كان عمل (روس) مجدداً للامتناع بالاقتراح القديم بأن الكون جزيرة منعزلة.

(١) حشد من النجوم تكون شكلاً أو صورة. (المترجم)

(٢) أقرب مجرة كبيرة إلى مجرتنا (على بعد مليوني سنة ضوئية)، تحتوى على نحو مائتين وخمسين مليون نجم (المترجم).

(٣) (١٧٢٤ - ١٨٠٤) فيلسوف ألماني شهير. (المترجم)

(٤) لقب إنجليزي رفيع مثل مركيز. (المترجم)

واستمرت المجادلة حول طبيعة السدم، خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وحتى القرن العشرين، وقد أظهرت بعض السدم تركيباً حلزونياً، بينما بدوا البعض الآخر، كسحب دوارة من الغاز، تحضرن عدداً قليلاً من النجوم المبعثرة في غير انتظام.

ولو كانت السدم هي بالفعل جزر كوكبية على أبعاد شاسعة، مثل مجرتنا، إذن فلماذا تبدو البعض منها على شكل سحب من الغاز واضحة للغاية؟ وإذا كانت السدم كلها داخل مجرة (الطريق лбнی)، فلماذا يظهر البعض منها، في شكل حلزوني، يشبه إلى حد كبير تجمعات النجوم؟ وثارت مجادلة عنيفة بين علماء الفلك حول هذا الأمر، ما يربو عن ستين عاماً - جيلين من الأبحاث العلمية الدقيقة - وكما سوف نرى، لم يتم التوصل إلى حل حاسم لها حتى العشرينيات من القرن العشرين. وكانت الإجابة النهائية للسؤال عن طبيعة المجرات هو "كل ما تقدم ذكره". وهناك سدم ترتبط بمجرة الطريق лбні، هي سحب من الغاز يتخللها عدد قليل من النجوم. وثمة سدم أخرى عبارة عن مجرات مثل مجرتنا. وليس هناك حل وحيد للغز الذي يكتنف طبيعتها، إذ اتضاع أنه يوجد سدم من كلا النوعين.

و تلك فترة ذات شأن في التاريخ، وذلك لأسباب متعددة. وفي الصفحات التالية من هذا الكتاب، سوف نناقش سؤالاً مشابهاً، يمكن صياغته على النحو الآتي "ما المادة المظلمة؟". وحتى وقت قريب، فكر ملياً علماء الفيزياء الفلكية في هذا السؤال، وجنحوا إلى الاقتداء بأسلافهم، إذ حاولوا حل المشكلة بافتراض أن هناك نوعاً واحداً من المادة المظلمة.

واجتهوا لإيجاد شيء ما، يمكن أن يؤدي كل الأفعال التي من المفترض أن تؤديها المادة المظلمة. وإنني أشعر بسعادة غامرة، عندما أقول بأنه عندما واجه هذا السعي عدة مشاكل، أبدى زملائي مرونة كافية، للشروع في النظر إلى إمكانية أن نأخذ في الحسبان "كل الاحتمالات الآتية الذكر".

والجادلة الطويلة التي ثارت حول الهوية الذاتية للسم، تضرب مثالاً - من جديد - لدى سهولة وتلقائية، القيام بحجب الإدراك الحسى الواضح وال بصيرة.

وقراءة الأبحاث التي تخوضت عنها تلك الجادلة عن طبيعة السدم، تبين بوضوح بالغ، مدى ضحالة وتواضع هذه التجربة العلمية. وكان ثمة جيلان من أفضل العقليات العلمية في العالم، يتبعون بالحاج في وجه مصاعب شتى وأوقات عصيبة، تلك المشكلة العصبية، فقد وضعوا نظم القياس، وقاموا بمناقشات مستفيضة فيما بينهم، ولم يقترح شخص واحد منهم (على الأقل حسب معلوماتي) ما يبدو أنه الحل الواضح لهذه المشكلة صعبة المراس.

ومع هذا، فقد كان الأمر واضحاً - من قراءة أبحاثهم - أن هؤلاء الباحثين كانوا علماء أكفاء، نوى تفكير ثاقب من الطراز الأول، موهوبين أكثر مني ومن معظم أصدقائي. وأتسائل كيف كان بمقدورهم التفاضل عن أمر بالغ الوضوح، خلال هذه المدة الطويلة؟

وبناء على مستوى تفاؤلك العام، يمكنك أن تنظر إلى هذا الحدث من زاويتين؛ يمكنك أن ترى علماء أكفاء يغفلون - مدة طويلة - حلولاً واضحة، مما أدى إلى حدوث اليأس الذي حاول بالتقدم الفكري، ومن ناحية أخرى، يمكنك أن تتبين، أنه على الرغم من المماطلة والتسويف، فإن التقدم العلمي - في نهاية الأمر - قد توصل إلى إجابة صحيحة.

ولكن مهما يكن استنتاجك الذي اخترته، من هذه الجادلة عن طبيعة السديم لابد من الاعتراف من أنها كانت بالغة الأهمية. إذ إنها كانت تعنى في المقام الأول، بالحجم النهائي وبنية الكون. كما أنها توضح عن طريق استخدام الأمثلة - أفضل من أي شيء آخر أعرفه - تلك الصلة الوثيقة التي توجد في العلم، بين مدى كفاءة الأجهزة المتوفرة، والتقدم الذي يمكن تحقيقه، في الإجابة عن الأسئلة المهمة.

وكما سوف نرى، لم تكن الإبداعية الخلاقة، هي التي توصلت إلى الحل الصحيح لشكلة السديم، والتي كانت مطروحة للنقاش والتساؤل، ولكن توفر تلسكوب المائة بوصة، الذي شيد فوق جبل (ويسون) في كاليفورنيا.

ولا شك أن العلاقة بين الأجهزة والتقديم العلمي انتقادية، وذلك لأن إثبات أن سديماً معيناً، يوجد في مجرة الطريق البني أو لا يوجد، يجب على الباحث أولاً أن يحدد مدى بُعد هذا السديم عنا، وثانياً إيجاد حجم مجرة الطريق البني. وهكذا، فإن التعرف على طبيعة السدم تتطلب بالضرورة قياس حجم المجرة وقياس المسافات إلى النجوم.

وقياس المسافات وتحديد الأبعاد في علم الفلك، أحد الموضوعات التي يفضل الباحثون الفلكيون عدم مناقشتها على الملأ مع غير المتخصصين. وثمة كثير من الأسرار لا يتم الإفصاح عنها، بل تظل في طي الكتمان.


وقياس المسافات الشاسعة بين النجوم، ليست - بالطبع - مثل قياس طول منضدة ما، الذي يتم بوضع مسطرة فوقها، وتحديد نهايتها بعلامة، ثم تحريك المسطرة من هذه العلامة حتى نهاية المنضدة. أما في علم الفلك فإن "المساطر" التي يمكن استخدامها لقياس أقرب النجوم إلينا، لا يمكن تشغيلها لقياس النجوم الأكثر بعدها عنا، ومن ثم يجب ابتكار تدريج<sup>(١)</sup> للمسافات، بحيث تستخدم مسطرة أولى لتحديد المدى الأقصى لهذه النجوم، وتنصم مسطرة ثانية تتلام مع الأولى في المناطق التي تداخل معاً، ثم تستعمل المسطرة الجديدة إلى أبعد مدى لها، وبعدها تستخدم مسطرة أخرى لتقييم مسافات أكثر بعدها، وهلم جرا.

ويبدو أن هذه الطريقة يمكن استخدامها، ولكنها - دون شك - تعطى لقياس المسافات الهائلة في الفضاء، معنى جديداً يمكن الثقة في نتائجها.

وفي أواخر القرن التاسع عشر، كانت هناك مسطرتان مستخدمتان في قياس المسافات إلى النجوم. أبسطهما عبارة عن تقنية "التلبيث"<sup>(٢)</sup> الموضحة في (الشكل ٢-٣). (صفحة ٤٥).

(١) نظام من العلامات المرتبة بفواصل ثابتة تستخدم مقاييس. (المترجم)

(٢) حسب هذه التقنية تقسم منطقة إلى عناصر مثبتة تعتمد على خط معلوم الطول حتى يتمكن من قياس بقية الأضلاع باستخدام علم المثلثات. (المترجم)



الشكل 2.3

ولو أن الزاوية تجاه النجم تفاس عندما تكون الأرض في الموقع أ، ثم يعاد قياسها بعد ستة أشهر من جديد، فإن معرفة بسيطة بعلم الهندسة وقطر مدار الأرض، يمكننا من حساب المسافة إلى النجم، وهذا مفهوم بسيط، وتعتمد هذه الطريقة، على قدرتنا على قياس الاختلافات الصغيرة في الزوايا. وإذا كانت المسافة إلى النجم كبيرة جداً، مقارنة بقطر مدار كوكب الأرض، فإن الزوايا التي تفاس بين المواقع تكون متشابهة للغاية، ومن ثم فقد القراءة على التمايز بينهما.

ويمكن استخدام "التنبیث" لتحديد الأبعاد إلى ما يقرب من نحو مائة وخمسين سنة ضوئية، وهذا جزء ضئيل للغاية من قطر مجرة "الطريق الالبي". وفي القرن التاسع عشر، وباستخدام تلسكوبات أقل قدرة من تلك المتوفرة في الوقت الحاضر، كان من الصعب استخدام "مسطرة التنبیث حتى نحو مائة وخمسين سنة ضوئية، ومن ثم، كان من المؤكد أنه لا يمكن استخدامها في قياس المسافات الشاسعة إلى حافة مجرة الطريق الالبي.

وهكذا، يمكن استخدام التنبیث لقياس مسافات قريبة من كوكب الأرض. أما المسطرة التالية، التي لا أريد الخوض في تفاصيلها، تتضمن استخداماً أكثر تعقيداً للهندسة، بالإضافة إلى قياسات الحركة الظاهرية للنجوم. وبهذه التقنيات أمكن للفلكيين تطوير مسطرة لقياس مسافات تصل إلى عدة مئات من السنوات الضوئية.

وهذه المسطورة أيضاً، كانت متاحة في أواخر القرن التاسع عشر، ولكنها لم تسهم إلا قليلاً في تحديد حجم مجرة الطريق اللبناني، لأنها مقصورة على قياس المسافات الكونية البعيدة.

بيد أن هذا الموقف تغير في عام ١٩٠٨، عندما توصلت (هندريتيا سوان ليفت) - التي تعمل في مرصد "هارفارد" - إلى اكتشاف مهم، عن ذلك النوع من النجوم الذي يطلق عليه الفلكيون "المتغيرات القيفاوية". وهذه النجوم يحدث لها نموذجاً منتظمًا من السطوع والخفوت ثم السطوع. وعندما تم رصدها عبر فترات من الزمن، تراوحت بين عدة أسابيع وعدة أشهر. وما لاحظته ليفت، أنه كلما اشتد سطوط النجم، زادت مدة النبضة وأكتشفت مدى سطوط النجم (أو بمعنى آخر، كم كمية الطاقة التي تتدفق إلى الفضاء). وإذا قارنت هذا الرقم بكمية الضوء، التي تتلقاها بالفعل من النجم، لأتمكنك أن تحدد مدى بُعد ذلك النجم عننا.


وهذه "المسطورة" الثالثة، مكنت الفلكيين أخيراً، من قياس المسافات الكونية لأكثر من مائة مليون سنة ضوئية. وكما سوف نرى، قادتنا - في آخر الأمر - إلى حل مشكلة السدم.

وثمة معلومات عرضية مثيرة، عن حالة علم الفلك في أوائل القرن العشرين، مفادها أنه على الرغم من معرفة أن كوكب الأرض ليس مركز الكون، فإنه كان من المعتقد أن الشمس تقع في مركز مجرتنا أو قريبة منه.

ولم يكن هذا افتراضاً خفيّاً مناظراً لتصور بطليموس عن موقع كوكب الأرض، بل كان مبنياً على ما بين أيدينا من بيانات في ذلك الوقت. ولقد وجدت أن هذه الحقيقة البسيطة مثيرة للاهتمام، لأنها تظهر أننا كلما استطعنا أن ننسى تفسير البيانات، حتى تبدو منظومتنا الشمسية أكثر مركزية لكل شيء، خلافاً للواقع، نكون قد انتهينا الفرصة التي لاحت لنا.

وأتساءل إلى أي مدى وصل هذا الحماس الشائع في الوقت الحالي، لإيجاد حضارات كونية مثل حضارتنا، وهو أمر يدعمه نفس الاتجاه.

وكان الرجل الذى حدد - فى النهاية - شيئاً مهماً مثل حجم مجرة الطريق اللبنى، والذى مازلنا نأخذ به حتى الوقت الحاضر، عالم فلك أمريكي نابغ يدعى "هارلو شابلی"<sup>(١)</sup> ولد فى ولاية "ميسوري"، وبدأ حياته العملية مراسلاً للحوادث والجرائم، لجريدة تصدر فى مدينة صغيرة بولاية "كانساس". وكان عمله يتتركز فى تغطية أخبار الحفلات الصاخبة التى يقيمها الرجال السكارى الذين يعملون فى مجال النفط، ورعاية البقر، وأصبح عمل (هارلو شابلی) مملاً، ومن ثم، قرر أن يلتحق بإحدى الكليات الجامعية، ولعل السبب الذى برر به استقراره فى قسم الفلك - جامعة ميسوري، أقل ما يوصف به، أنه غير عادى: "فتحت الكatalog الذى يضم المقررات الدراسية.. وكان أول مقرر يدرس هو (علم الآثار) (y-a-r-c-e-o-a-t-o-g-y)، ولم استطع نطق الكلمة! وقلبت الصفحة ورأيت مقرر (علم الفلك) (a-s-t-r-o-n-o-m-y) واستطعت أن أنطقها بسهولة. وهكذا التحقت بقسم الفلك." وما اكتشفه (شابلی) يمكن أن يُفهم من الرسم فى (شكل ٢).



شكل 2.4

(١) (١٨٨٥ - ١٩٧٢) فلكي أمريكي، قام بقياس حجم مجرتنا (الطريق اللبنى). (المترجم)

إننا نعرف الآن أن مجرة "الطريق اللبناني" ذات بنية معقدة؛ إذ بالإضافة إلى القرص اللوبي المسطح المأكوف، محاطاً بمنظومة من النجوم على شكل عناقيد كروية، يطلق عليها "العناقيد الكروية الكونية". ويحتوى كل عنقود على الملايين من النجوم، وهذه العناقيد (وبداخلها التغيرات القيفاوية) يمكن رصدها بسهولة بالتلسكوبات التى كانت متوفرة لدى (شابل) وزملائه. وعندما تم إحصاء هذه العناقيد، وُجد أنه يمكن مشاهدتها فى جانب واحد من السماء، وأققنع (شابل) زملاءه بأسلوب منطقي، مؤكداً أن هذه العناقيد - فى الواقع - موزعة بانتظام حول مجرة الطريق اللبناني، وأوضح أن الوسيلة الوحيدة لفهم هذه الملاحظات تتائى عن طريق: (١) جعل المجرة أكثر اتساعاً مما اعتقاد سابقاً و (٢) إبعاد الشمس عن المرکز، كما هو موضح في الشكل.

وباعتاق أفكار (شابل)، نقترب حثيثاً من النظرة الشاملة الحديثة عن مجرة (الطريق اللبناني). إنها قرص مسطح قطره نحو مائة ألف سنة ضوئية<sup>(١)</sup>. وتقع منظومتنا الشمسية على أحد الجوانب، في الضواحي الخافتة الإضاءة، عند ثلث المسافة إلى حافة المجرة. ويمكن القول، إن (شابل) قام بدور في الفلك المجرى. يماثل نفس الدور الذي قام به (كوبرنيكس) في المنظومة الشمسية - إذ إنه أزاح كوكب الأرض عن مرکز أي شيء. وهكذا تم إبعاد آخر أثر مرئي واضح عن مرکزية الأرض من المبادئ العلمية السائدة.

وفي نفس الوقت، تعااظم الكون المعروف إلى حجم أضخم مما تصوره بعض الناس - مثل (هيرشل) - الذي كان أول من حاول وضع خريطة لعالم النجوم.

اعتقد نقاد النتائج الذي توصل إليها (شابل)، أن السدم اللوبي، كانت في الواقع الأمر، مجرات مثل مجرتنا. وعلتهم في ذلك أنه إذا كانت مجرة (الطريق اللبناني) - في

---

(١) كانت تقديرات (شابل) الأساسية أكثر من هذا قليلاً. (المترجم)

حقيقة الأمر - بالحجم المروع الذي قال به (شابلي)، فثمة أمل ضئيل أن السدم تكون خارج حدودها. وساند هذا الرأي، اكتشاف نجوم براقة جديدة، أطلق عليها "نوفات"<sup>(١)</sup>، في بعض المجرات اللولبية. وكانت هذه النجوم متألقة للغاية للغاية، وبدت كما لو أنها لا تبعد عنا كثيراً. وفي الوقت الحاضر، نعرف أنها كانت "سوبرنوفات"<sup>(٢)</sup> أي انفجارات مرؤعة لنجوم عملاقة. كما أنتنا ندرك بوضوح وبتقدير، أنه خلال زمن قصير، يزود السوبرنوفا بالوقود عن طريق التفاعلات النووية، وكان يمكن أن يفوق ضياؤها مجرة باكملها. وفي العشرينيات من القرن العشرين، عندما لم يكن قد اكتمل الفهم الصحيح للطاقة النووية، لم يلق هذا التفسير اهتماماً كبيراً. ويبعد أن الاتجاه السائد لدى العلماء، ضد النظرية التي مفادها أن الكون عبارة عن جزر، والاعتقاد بأن الكون يتكون من مجرة واحدة، وليس العديد منها.

وكان الموقف مرتباً ومشوشًا، وفي شهر أبريل من عام ١٩٢٠، عندما عقد (شابلي) و(ميرير كورتس) - أحد أشد المؤيدين لنظرية أن الكون يتتشكل من جزر (المجرات)، مجادلة في معهد (سميثونيان)، عن مسألة بنية الكون، برعاية الأكاديمية القومية للعلوم. ونظر الفلكيون إلى هذه المجادلة، كمثيل للمجادلات الشهيرة التي دارت بين هكسلي وويلبر نورس، حول مدى صلاحية نظرية التطور وفاعليتها. وقدم (شابلي) دليلاً الذي استند إليه لتقدير حجم مجرة (الطريق البني)، وجادل (كورتس) في صالح وجود مجرات أخرى مثل مجرتنا. ولم "يكسب" أحد تلك المجادلة، والسبب الرئيسي في هذا أن العالمين نقشا مسائل متباعدة. وكان كل منهما محقاً في مجاله. وكما جادل (شابلي)، فإن الطريق البني له حجم مروع، بينما المسافات إلى المجرات الأخرى شاسعة للغاية.

(١) مفرداتها (نوفا) أو (مستعر). (المترجم)

(٢) مفرداتها (سوبرنوفا) أي (مستعر أعظم). (المترجم)

وتؤكدت طبيعة السدم أخيراً في عام ١٩٢٢، عندما أصبح الفلكي الأمريكي (إدوبن هابل)<sup>(١)</sup>، أحد أول العلماء الذين قضوا وقتاً طويلاً في الرصد بالتليسكوب الجديد ذي العدسة التي قطّرها مائة بوصة، فوق جبل (ويسون)، بالقرب من (لوس أنجلوس). وبواسطة هذا التليسكوب، تمكن (هابل) من رصد نجوم فردية، ومن بينها "المتغيرات القيفاوية" في المجرات القريبة. ويستخدم العلاقة التبادلية، بين التذبذب والتألق، التي طورتها (ليفت)<sup>(٢)</sup> استطاع (هابل) أن يثبت صحة أن المسافات إلى السدم اللولبية، يمكن قياسها بـملايين السنوات الضوئية، أي تزيد كثيراً عن تلك التي قدرها (شابل) (سابل) بالنسبة لحجم المجرة.

ومن جديد، اتسع الكون أكثر بفضل تحسن قدرتنا على سبر غوره، ولم يكن هناك جزر كونية أخرى فقط، ولكنها كانت أبعد كثيراً، مما كان يمكن لأى شخص أن يتخيله. الواقع أن السدم اللولبية هي منظومات نجمية مثل مجرتنا، تقع على مسافات مروعة منا. أما السدم الأخرى - تلك التي تشتمل على عدد قليل نسبياً من النجوم، ومادة كثيرة خفيفة ومجدولة، فهي عبارة عن سحب غازية في داخل مجرتنا (الطريق اللبناني). ولكل ثنين الفرق بينهما، فإننا نحتاج إلى تليسكوب قادر على تحديد أن مجموعة من السدم، أكثر بعدها عن الأخرى. وإذا أمكن تحقيق هذا الأمر، تم حل المشكلة.

### كلمة عن العناقيد المجرية

قبل الاستطراد في هذه المناقشة عن إنجاز (هابل)، يجب ملاحظة حقيقة واحدة عن هذه الجزر الكونية<sup>(٣)</sup>. ومنذ ذلك الوقت، أصبح جلياً أن المجرات لا تتوزع في الكون

(١) عالم فلك أمريكي (١٨٨٩ - ١٩٥٣) أثبت وجود مجرات أخرى غير مجرتنا (الطريق اللبناني). (المترجم)


(٢) عالمة فلك أمريكية (١٨٦٨ - ١٩٢١). (المترجم)

(٣) "الجزر الكونية" نظرية صاغها (إدوبن هابل) في عام ١٩٢٤ مفادها أن السدم الناشئة عبارة عن مجرات مثل مجرتنا (الطريق اللبناني). (المترجم)


بعشوائية، ولكنها تجنب لأن تتكتل معاً في مجموعات تركيبية يطلق عليها "عقائد مجرية"، وأن تلك العقائد بدورها تجتمع في شكل "عقايد مجرية فائقة". وعلى الرغم من أن (هابل) لم يجد طريقاً لعرفة هذه الحقيقة، فقد تم التوصل إلى أن تفسير هذا التوزيع المتباين للجرارات، يمثل واحداً من أهم المشاكل، بل يقول البعض بأنه أهمها على الإطلاق، في علم الكون الحديث.

## الكون المتمدد

ولا يقل أهمية عن إثبات (هابل) بوجود مجرات أخرى، ذلك الاكتشاف الذي توصل إليه كجزء من نفس الدراسة التي أجراها، وكان أكثر إثارة وإدهاشاً. إذ عندما نطلع (هابل) إلى المجرات القريبة منا، أدرك أنها تتحرك بعيداً عنه، وأنه كلما كانت المجرات أبعد، ازدادت سرعة تحركها. وكان هذا الاكتشاف مثيراً للغاية - ومفعماً بالتضمينات والتلميحات والاستدلالات، لعلم الكون الحديث - حتى إنه علينا أن نفك ملياً في القاعدة التي استند إليها (هابل) كبرهان ليعلن اكتشافه. عندما تقف بجانب طريق سريع، وتسمع صوت دوى نفير سيارة أثناء انطلاقها، سوف تلاحظ أن صوت النفير يتغير، عندما تمر بك السيارة. إذ تكون طبقات موجاتها الصوتية أعلى عندما تقترب منك السيارة، وأكثر انخفاضاً عندما تبتعد عنك. هذا هو مجرد مثال لما يعرف بهر دوبلر، ويفسر بطريقة بسيطة للغاية في (الشكل ٢-٥).



يسمع كل المراقبين نفس طول الموجة، والمسافة بين قمم الموجات متساوية



الشكل 2.5

إذ عندما تطلق سيارة ثابتة موجة صوتية، كما في أعلى الرسم البياني للشكل ٢-٥، تتبع سلسلة من الحلقات متحددة المركز وانضغاطات وخلخلات، في الهواء الذي يتحرك من السيارة. وعندما يرتطم كل هذا بآذاننا، فإننا نسمع صوتاً، وتعتمد طبقاته على مدى تكافف الموجات الصوتية. إذا كلما زاد عدد الموجات الصوتية التي ترتطم بآذاننا في كل ثانية، زاد ارتفاع طبقات الصوت.

أما إذا كانت السيارة تتحرك، كما في الرسم البياني الأسفل، إذن، فإنها سوف ترتحل - في واقع الأمر - لمسافة قصيرة معينة، بين الوقت الذي نطلق فيها موجة صوتية واحدة، والوقت الذي تطلق فيه موجة أخرى. وسوف تتركز كل موجة في البقعة التي كانت فيها السيارة، عندما أطلقت هذه الموجة تحديداً.

وتكون النتيجة أن النموذج متعدد المركز السابق، قد استبدل به النموذج المائل الموضع بالشكل. وإذا كان ثمة شخص يقف عند النقطة A عندما تكون السيارة مقربة، فإنه سوف يتبين أن الموجات الصوتية أكثر اندماجاً عن العتاد. وسوف يسمع هذا المراقب صوتاً ذا طبقة أعلى. ومع هذا، ففي النقطة B، تكون الموجات الصوتية أقل اندماجاً عن العتاد، وسوف يسمع المراقب صوتاً ذا طبقة أكثر انخفاضاً.


إن هذا يفسر (تأثير بوبير)، كما أنه يشرح أيضاً، كيف اكتشف (هابل) تمدد الكون. إن ما حدث لموجة الصوت يمكن أن يحدث لأى نوع من الموجات، من الأمواج المتكسرة على شاطئ المحيط إلى موجات الضوء، إن اندماج الموجات عندما يقترب الشيء الذي يطلقها، يمكن اعتبارها مثل إزاحة للون الشيء نحو الأزرق في الطيف، وانتشار الموجات الصادرة عن شيء ما يتحرك بعيداً، يمكن اعتباره متوجهاً نحو اللون الأحمر<sup>(١)</sup> إزاحة نحو الأحمر.

وما فعله (هابل) أنه قارن الضوء الصادر عن نيزات، لعناصر معروفة في المجرات القريبة، بضوء نفس النيزات الصادر في المختبرات الأرضية. واتضح له أن الضوء المنبعث من المجرات بعيدة، تنزاح إلى اللون الأحمر الذي يقع في نهاية الطيف، واستخلص من ذلك أن المجرات تتحرك بعيداً عن كوكب الأرض.

وتكشف نموذج آخر، عندما حسب (هابل)، بعد المجرات النائية عنا، وبعض بيانات الأصلية مرسومة على هيئة مخطط في (الشكل ٢-٦). وكان من رأيه أن البيانات تتبع اتجاهًا معيناً، كلما كانت المجرات أبعد، زادت إزاحتها نحو الأحمر.

---

(١) إزاحة الخطوط الطيفية للمجرات البعيدة نحو الطرف الأحمر للطيف. (المترجم)



الشكل 2.6

ويجب أن أعترف أن هذا الاتجاه ليس واضحًا ومؤثراً في الشكل (على الرغم من أنه بالغ الوضوح في البيانات الحديثة). ويجب عنوان اكتشاف (هابل) - جزئياً - إلى التقنية التجريبية الرائعة، وكذلك إلى التخمين المليم، الذي تضمن التساؤل عما يمكن أن يتحقق عندما تطبق مقاييس أفضل في المستقبل.

ومع ذلك، فإن النموذج الذي توصل إليه (هابل)، والذي سوف ينبع في النهاية من هذه البيانات، وكان اكتشاف الإزاحة نحو الأحمر للمجرات، واحداً من أهم النتائج وأعمقها، التي تكشفت عن الملاحظات الفلكية. وهي تحمل في طياتها بنور الصورة الحديثة التي تتتوفر لنا عن الكون المتطور، تلك الصورة التي نطلق عليها "انفجار الأعظم"<sup>(١)</sup>. Big Bang

---

(١) نظرية تقول بأن الكون نشا بانفجار مروع قبل حوالي ١٣,٧ بليون سنة. (المترجم)

## الفصل الثالث

### الانفجار الأعظم

”لماذا يولد الناس؟ ولماذا يموتون؟ ولماذا يقضون أغلب أوقاتهم، ما بين ارتداء الساعات الرقمية؟“.

(دوج آدامس)

”دليل المسافر المتطفل إلى المجرة“

ليس ثمة شك، في أنك لو أردت معرفة إجابات عن الأسئلة الأساسية التي يطرحها العلم، عليك أن ترجع إلى علم الكون. وعبر التاريخ، أخذ الفلكيون على عاتقهم إجابة أسئلة مثل ”كيف بدأ الكون؟“ أو ”كيف شيد؟“ أو ”ما مصيره؟“. وإذا طرحت هذه الأسئلة على فلكي العصر الحديث، سوف تصاغ الإجابات في لغة النموذج المقبول في زمننا هذا، وهو ما يطلق عليه ”الانفجار الأعظم“. وهذا النموذج نمو منطقي نتيجة تراكم الاكتشافات عن المجرات، التي توصل إليها (هابل).

وإذا كانت المجرات النائية تبتعد عنا بالفعل، وأن المجرات الأكثر بعداً، تبتعد أسرع من مثيلاتها القريبة نسبياً، هنا تتبثق صورة للكون لافتة للنظر. تخيل أن

الجرات مثل حبات زبيب<sup>(١)</sup> مبعثر فوق قطعة من عجين الخبز أثناء خبزها. وبينما تمدد قطعة العجين، فإن حبات الزبيب سوف تبتعد عن بعضها البعض أكثر فأكثر. وإذا تخيلت أنك تقف فوق واحدة من حبات هذا الزبيب، كيف تبدو لك الأشياء من حولك؟ إنك بالطبع لن تشعر بأنّي حركة، مثلاً لا تحس بآثار حركة كوكب الأرض في مدارها حول الشمس، إلا أنك سوف تلاحظ أنّ أقرب جار لك، يتحرك بعيداً عنك. وتنسب هذه الحركة إلى حقيقة أنّ عجينة الخبز، بينك وبين أقرب جار لك تمدد، ومن ثم تدفع بكما بعيداً عن بعضكم.

وإذا نظرت بعد ذلك إلى حبة الزبيب التي تضاعف بعدها عنك وعن جارك الأقرب، الذي سوف تراه يبتعد أيضاً. فإنها سوف تتحرك بضعف سرعة جارك، لأنّه سوف يكون ضعف كمية عجين الخبز، بينك وبين حبات الزبيب، مثلاً كان بينك وبين جارك. وكلما نظرت أبعد، سوف يفصلك المزيد من عجين الخبز عن الزبيب الذي تراه، وسوف تزداد السرعة التي يتحرك بها بعيداً عنك.

وفي الواقع، أنّ هذا ما شاهده (هابل) عندما نظر إلى بقية الكون من مرصد (فيلسون) كان كوننا سيطر عليه تمدد شامل للفضاء ذاته، وكانت الجرات فيه تتحرك مثل حبات الزبيب في عجين الخبز. لقد كان تمدداً، يوحى لأى مراقب فى أى مجرة، بأنه يقف ساكناً، وأنه يشاهد كل الأشخاص يتحركون بعيداً عنه. إنه كما قال (نيكولاوس أوف كوسا) - بعبارات اقتبسها في الفصل الأول - "الكون مركزه في كل مكان ومحيط دائنته ليس في أى مكان". لقد أصبحت فكرة تعدد الكون، شيئاً مألوفاً للغاية في الوقت الحاضر، إلى الحد أنه من السهولة أن ننسى، كم كانت هذه الفكرة ثورية في ذلك الوقت.

---

(١) حبات العنب المجففة. (المترجم)

ولتوضيح هذه النقطة، دعنا نناقش كل تفاصيل الأشياء التي تضمنها رأى (هابل) عن الكون، تلك الأشياء المهمة من الناحية الفلسفية.

## بداية الكون

لو تصورت أن تمدد الكون، شريط سينمائي، فيمكنك أن تخيل بسهولة "إدارة الفيلم بطريقة معكوسة". وإذا فعلت ذلك، سوف تجد أن الكون يصغر ويصغر، وفي نهاية الأمر ستائى اللحظة التي تصبح فيه كل كتلته، متراسمة في نقطة كثافتها لا نهائية. ومن هذه النقطة ، في ذلك الزمن الموجل في القدم إلى الوقت الحاضر، كان الكون يتمدد. وقبل هذا الزمن لم يكن الكون موجوداً، أو على الأقل لم يكن موجوداً بشكله الحالى.

وتجبرنا الحقيقة البسيطة بأن الكون يتمدد، لنسخلص أن الكون له بداية في الزمن. وسوف نرى أن هناك بعض الجدال عن العمر الفعلى للكون، ولكن في عصرنا الحالى نلاحظ بسهولة أن معظم الفلكيين، يقولون بأن عمر الكون يتراوح تقريباً ما بين عشرة إلى عشرين بليون سنة<sup>(١)</sup>. وللقياس، يمكن أن يقارن هذا بعمر المنظومة الشمسية (حوالى أربعة ونصف بليون سنة)، ووقت انقراض الديناصورات (خمسة وستين مليون سنة) وعمر الجنس البشري (نحو ثلاثة ملايين سنة).

إن الحدث الذى ميز بداية الكون، أطلق عليه " الانفجار الأعظم" ، وقد دخل هذا المصطلح مفردات اللغة والأحاديث اليومية الشائعة فى ثقافتنا. وفقط يشير ذلك الاسم - أصلاً - إلى الحدث الوحد الذى يمثل بداية الكون، واليوم يستخدمه الفلكيون، ليعنى الصورة الكاملة للكون، كما وصفناه فيما سبق، كون انبثق من حالة استهلالية كثافتها مروعة، وأخذ يتمدد منذ ذلك الوقت. وسوف أستخدم مصطلح " الانفجار الأعظم" بهذا المعنى. ويعزو إلى العملية الكونية برمتها: الحدث الاستهلالى بالإضافة إلى التمدد، وبالنسبة للحدث الاستهلالى ذاته، دعنا نطلق عليه "لحظة الخلق".

---

(١) آخر ما توصل إليه علماء الفلك بأن عمر الكون نحو ١٣.٧ بليون سنة. (المترجم)

وأحد الاعتقادات الخاطئة الشائعة عن الانفجار الأعظم، والذي يجب التخلص منه في التو، الاعتقاد أن التمدد الكوني يشابه انفجار قذيفة مدفعية. فالمجرات ليست كرات شربينيل<sup>(١)</sup> تتسارع بعيداً، من انفجار مرکزى. إن التشبيه بالزبيب في عجينة الخبز، هي طريقة مقبولة لنفسك في العملية الكونية كلها، إن ما يتمدد هو الفضاء ذاته، وليس مجرد سحابة من المجرات في داخل الفضاء.

أصبح الاعتقاد البسيط بأن الكون له بداية في الزمن، وأضحاً للفانية للفيزيائيين الفلكيين، حتى إن عدداً قليلاً منا يمكن أن يشك فيه. ومع هذا، فإنه اعتقاد، له تضمينات عميقه، إن معظم الحضارات تعتقد واحداً أو اثنين من المفاهيم المتعلقة بالزمن، والتي يمكن أن نميزها - بصفة عامة - بخطى<sup>(٢)</sup> وداخري أو بغربي وشرقي. فالزمن الخطى له بداية واستمرارية ونهاية، أما الزمن الداخري، وكما يوحى به اسمه، يظل يدور ويدور إلى الأبد. وفي الكون الذي يعمل بالزمن الداخري، لا تثار أبداً مسألة الخلق، وفيه يكون الكون قائماً في الماضي، وسيظل كذلك في المستقبل.

وعندما نفكّر في الزمن الخطى، فإنك في التو سوف تواجه بسؤال محير ليس فقط عن الخلق، ولكن عن الخالق جل شأنه. وعلى الرغم من أنه ليس هناك سبب منطقى لهذه الفرضية، فإن العديد من الناس يعتقدون بأنه إذا وجد شيء ما، فلا بد أن وجوده كان استجابة لأفعال بعض الكائنات العاقلة. وبسبب ذلك الاعتقاد، فإن الفلكيين - على الرغم من كراهيتهم للانحرافات في مناقشات لاهوتية - وجدوا أنفسهم متورطين في إحدى هذه المناقشات، عندما افترضوا حدوث كون الانفجار الأعظم. فقد وضعهم ذلك الفرض مباشرة، في خضم المجادلة الموجلة في القدم، عن وجود الله!

---

(١) قذيفة مدفعية تحتوى على كرات معدنية صغيرة مصممة لتفجر في الهواء. (المترجم)

(٢) مؤلف من خطوط. (المترجم)

## الكون ليس ساكناً

منذ اكتشاف (هابل) للإذاحة نحو الأحمر، كان يفترض عادة أن الكون ساكن، وأن النجوم أبدية ولا تتغير، وأن مشكلة سبر غور الكون، مشابهة لرسم خريطة لمنطقة مكتشفة حديثاً. بيد أن المنطقة كانت معقدة ومتباينة، ومن ثم، كانت المهمة صعبة، ولكن - على الأقل - يمكن للشخص أن يتتأكد بأن الأرض لن تتحرك في كل اتجاه، بينما يتم رسم الخريطة، وقد غير اكتشاف (هابل) كل هذا. فبدلأ من الاعتقاد بأن الكون ساكن، أصبحنا نتعامل مع كون يتطور باستمرار مع مرور الوقت. ويجب أن نفك في الكون كسلسلة من العمليات والتغيرات.

وبالتالي، فإن كل الملاحظات التي تمت عبر الزمن المدون، تعطينا أقل من لقطة للكون، خلال جزء ضئيل من تاريخه الطويل. ولو أن عمر الكون كله المولى في القدم، قد ضغط إلى سنة واحدة، فسوف يشغل التاريخ المدون - تقريباً - اللحظة الأخيرة قبل منتصف ليلة رأس السنة. ولو أن الكون كان ساكناً، إذن، فإن لقطة واحدة سوف تكون كافية لتخبرنا كيف كان يبدو الكون، وكيف تطور منذ بداية الزمن. ولكن ما دام الكون يتتطور، فإن اللقطة سوف تخبرنا بما هو عليه في الوقت الحاضر، وعلينا أن نستنتج كيف كان الكون في الماضي.

وتحدث وجهاً النظر هذه، فرقاً كبيراً فيما ارتضيناه كتفسيرات، للكون الذي يتراوح أمام أعيننا حالياً. وسوف نرى فيما بعد، أن ملماً واحداً للكون يظهر أنه مليء بالفراغات المروعة، مناطق لا توجد بها مجرات على الإطلاق. ولو اعتنق المرء الرأي بأن الكون ساكن ولا يتغير، إذن، فعليه أن يجد آلية ما، يمكن بواسطتها تخليق هذه الفقاعات والحفاظ عليها إلى الأبد، وهي مهمة - بكل المقاييس - مستحيلة. ومن ناحية أخرى، إذا اعتقد شخص ما أن الكون يتتطور، سوف تكون المهمة أكثر سهولة إلى حد كبير. كل ما على المرء أن يفعله هو أن يفكر في شيء ما يمكن أن ينتج فقاعة بحيث تستمر في الوجود لزمن طويل، يكفي لكي يمكننا مشاهدتها. ويمكن للعديد من

العمليات الطبيعية الفيزيائية أن تنتهي فقاعة مؤقتة، كما سوف نرى في الفصل الخامس.

## لن يبقى الكون على وضعه الحالى إلى الأبد

كما أن للكون بداية، فسوف تكون له نهاية. وستتعرض فيما بعد لتفاصيل الشكل الذي ربما تتخذه تلك النهاية، أما في الوقت الحاضر، فإننا نلاحظ أن كوناً متطولاً يجب أن تكون مراحل تطوره في اتجاه نهاية محتملة.

وفي القرن التاسع عشر، لاقت فكرة "الموت الساخن" للكون، قبولاً لدى العلماء، ومفادها أن الكون أصبح ضعيفاً وأصابه الكلل، وفقاً للقانون الثاني من الديناميكا الحرارية<sup>(١)</sup>، وفي النهاية سوف يتحول كلخلق إلى كيان ضعيف مفتقر للمعالم، كثة خفيفة لا شكل لها من المادة. أما المستقبل المحتمل لعلم كون الانفجار الأعظم، فسوف تكون درامية إلى حد بعيد، أكثر من الموت الحراري، ولا نستطيع أن نجزم القول. أى من النهايات المحتملة، هي التي سوف تحدث، وذلك بسبب قصور تقنيات الرصد لدينا، أو لعلها مجرد حالة جهل عابرة. ولكن حتى الوقت الحاضر، يمكننا إدراك أن هناك رؤيتين مستقبليتين محتملتين، نستطيع الخوض في تفاصيل كل منها.

## عندما كان الكون أكثر شباباً، كان أشد كثافة وحرارة مما هو عليه في الوقت الحاضر

عندما كان الكون أكثر شباباً، كانت نفس كمية مادته مضغوطه في حجم أصغر كثيراً مما هو عليه في الوقت الحاضر. وبينما على هذا، كانت كثافته أشد مما هي عليه الآن.

---

(١) علم يبحث العلاقة بين خواص المواد وتفاعلاتها التي تتأثر بالحرارة، وتحول الطاقة من وجه لآخر. (المترجم)

ومعروف أنه كلما ضغطت المواد إلى كثافة عالية، تصبح أشد حرارة، والتفسير الشائع لهذه الحقيقة، من ممارساتنا اليومية، هو استخدام مضخة يدوية لتفخ إطار، وبعد برهة، تصبح أنبوبية المضخة ساخنة، وقد تولدت هذه السخونة من الانضغاط المستمر للهواء. وبالمثل، عندما نعود بالزمن إلى الوراء، سنجد المادة أكثر كثافة والحرارة - تبعاً لذلك أشد - وفي الحقيقة، إذا كان على اختيار شعار وحيد، وأطلب من الناس أن يتذكروه عن الانفجار الأعظم، فسوف يكون: "فيما يتعلق بالكون، فإنه في مرحلة شبابه، كان أشد حرارة وكثافة".

وتشمل هذه الحقيقة استدلالات وتلميحات وتضمينات مروعة، وفي الواقع يمكن القول إنها المسئولة عن ازدهار علم الكون في الوقت الحاضر. والسبب في ذلك، أننا عندما نقول بأن المادة ساخنة، فإننا نعني بهذا، أن الذرات المكونة لها تتحرك بسرعة. وكلما زادت سرعة تحركها، زادت الاصطدامات العنيفة التي تحدث من وقت لآخر. ويشابه ذلك الموقف حوادث السيارات. ففي المادة الباردة، تتحرك الذرات ببطء، وتكون الاصطدامات مثل سيارتين تتصادمان عندما تتحركان بسرعة بطيئة في موقف مخصص للسيارات. وليس من المحتمل أن تتحطم السيارات أو الذرات بشدة. ومن جهة أخرى، إذا كانت المادة ساخنة، سوف تشبه الاصطدامات اصطدام سيارتين وجهاً لوجه، عندما تسيران بسرعة قصوى. وفي هذه الحالة، ثمة احتمال كبير، أن تتمزق السيارات والذرات إرباً إرباً، تاركة مكان الاصطدام ركامًا مبعثراً، ورفارف ومصدات وأجزاء أخرى.

وهكذا، عندما كان الكون أشد حرارة وأكثر شباباً، كانت الاصطدامات بين الذرات عنيفة، ولابد أنه كان هناك وقت، كانت فيه الحرارة لافحة إلى الحد أنه كان من المستحيل على أي ذرات أن تعيشهن بعد هذه الاصطدامات. إذ لابد أن يتفكك كل شيء إلى مكوناته الأساسية، ونعرف من هذا، أنه كان هناك وقت، لم توجد فيه ذرات، ووقد آخر، انبثق في ذلك إلى الوجود. وقبل خلق الذرات، وجدت المادة على شكل إلكترونات

تنجول في كل مكان، باحثة عن نواة ترتبط بها، وكانت النواة بدورها ترتحل في جميع الاتجاهات، للبحث عن الإلكترونات، وهذه حالة من المادة يطلق عليها الفيزيائيون « بلازما »<sup>(١)</sup>. وإذا حدث وارتبط إلكترون بنواة لكي يشكل ذرة، فإن كليهما سوف يتمزق في الاصطدام التالي.

و تلك السلسلة من الأحداث، التي تتحول فيها المادة - باستمرار - من حالة إلى أخرى، كلما انخفضت درجة حرارة الكون، من أفضل أن أطلق عليه « التجمد »، لأن ذلك يشبه تحول الماء، من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، إذا ما انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من صفر مئوي. الواقع أن التحول من مركبات من الإلكترونات والنوى، إلى ذرات، ربما حدث في درجة حرارة أعلى من هذا، بيد أن للعمليتين خصائص عده مشتركة.

### عندما كان الكون أكثر شباباً. كانت الأمور أبسط

إن الذرة بنيان بالغ التعقيد؛ إذ إن لها نواة مدمجة، ذات شحنة موجبة وحشد من الإلكترونات ذات شحنة سالبة، تتحرك في مدارات حولها، ومن ناحية أخرى، فإن الذرة منظومة بسيطة نسبياً. إذ - على الرغم من كل ذلك - لتكوين ذرة ما، عليك بوضع كل الأجزاء المكونة لها معاً، بالأسلوب الصحيح تماماً. ولعمل مزيج ما، يمكنك وضعها كييفما اتفق، وذلك هو الفرق بين حزم الامتنعة بعنایة فی حقیبة سفر، ومجرد إلقاء شيء - دون عنایة - داخلها.

وحكاية ما حدث للذرات، يعد نموذجاً للتاريخ المبكر للكون؛ إذ عندما أخذت الحرارة في الانخفاض، كنتيجة لمدد الكون - وفقاً لنظرية (هابل) - تشكلت بُنى أكثر وأكثر تعقيداً. وكانت الذرات - وهي أكبر وأكثر نشاطاً من كل البُنى التي تلقى

---

(١) غاز متآين تكون فيه الإلكترونات حرة وغير مرتبطة بالذرة. (المترجم)

اهتمامانا - هي آخر ما تشكلت. وإذا رجعنا بالزمن إلى الوراء، لوجدنا أن البنية التالية التي مرت بمرحلة التجمد هي النوى نفسها. إن النوى هي - ببساطة - تكبس من البروتونات والنيوترونات. وإذا حدث بين هذه الجسيمات اصطدام عنيف إلى حد ما، فإن البروتونات والنيوترونات، يمكن أن تتفصم عراها وتبتعد عن بعضها. لابد إذن أنه كان ثمة وقت، عندما لم تكن نوى الذرات موجودة، وقت آخر انبعثت فيه إلى الوجود.

وبنفس الطريقة، فإن البروتونات والنيوترونات والجسيمات الأساسية الأخرى، التي تكون النوى، مكونة بدورها من جسيمات يطلق عليها "كواركات"<sup>(١)</sup> وهي "أولية" أكثر، ويعتقد بأنها اللبنات الأولى للمادة، حتى الآن.

عندما كانت حرارة الكون مرّعة، لم تستطع هذه الكواركات أن تبقى "محبوسة" في داخل الجسيمات الأساسية، بل انطلقت كجسيمات حرة. وبمعنى آخر، في باواكيز الزمن، لم يكن هناك أى جسيمات أساسية، التي تتخذ لها - في الوقت الحاضر - موطنًا داخل النواة. وكان ثمة وقت، لم تكن موجودة فيه، وقت آخر انبعثت فيه إلى الوجود.

وعندما كانت درجة حرارة الكون، شديدة بقدر كاف، عندئذ كانت المادة خليطاً من الكواركات وجسيمات كإلكترونات، جسيمات يطلق عليها الفيزيائيون "لبتونات" (أى الجسيمات التي تتفاعل بضعف).

ووفقاً لأفكارنا الحالية، لقد وصلنا إلى نهاية الطريق: إن المادة لا يمكن تقسيتها أكثر، والبحث عن جسيمات دون ذرية داخلها. وأن كل شيء حولنا مكون من توافقيات متباعدة من الكواركات واللبتونات. وبينما كان الكون يتمدد، تجمدت الكواركات داخل الجسيمات الأساسية، ثم تجمدت الجسيمات داخل النوى، وفي النهاية تجمدت النوى والإلكترونات لتكون الذرات. ويجب أن تعرف أنها صورة بارعة ودقيقة لتطور أشكال المادة.

---

(١) تروي قصة الجسيمات الأساسية والكواركات، في كتابي "من الذرات إلى الكواركات" "From Atoms to Quarks" (المؤلف)

بيد أن تبسيط الكون إلى أجزاءه الأساسية، لا يتوقف على المادة، إذ ما إن تفككت المادة إلى عناصرها الجوهرية، حتى وجد مصدر آخر للتعقيد في الكون، ألا وهي القوى الرئيسية التي تحكم في الطريقة التي تتفاعل بها الجسيمات مع بعضها. وفي كوننا الحالى الذى يتميز بأنه - إلى حد ما - قارس البرودة، ثمة أربع من هذه القوى؛ إذ إن هناك (بترتيب تنازلى لدى قوتها) القوة الشديدة، التى تمسك بمكونات النواة معاً، والقوة المألوفة للكهرباء والمغناطيسية (الكهرومغناطيسية) والقوة الضعيفة التي تحكم في بعض أنواع التحلل الإشعاعي، والجانبية. وعلى الرغم من أن هذه القوى، تبدو متباعدة إلى حد كبير، ولكن وفقاً لنظرياتنا عن البنية الرئيسية للكون، فإن تلك القوى ليست إلا جوانب مختلفة لنفس القوى. وعندما تزداد شدة طاقة الاصطدامات، فإنه من المفترض أن تخفي الصفات الفارقة التي بين القوى الأساسية.

وحالما يختفى التمايز بين قوتين، نقول بأن هاتين القوتين قد توحدتا، والنظريات التي تشرح عملية الاندماج هذه يطلق عليها نظريات "المجال الموحد". وتشتمل هذه النظريات على استدلالات وتلميحات وتضمينات، عن تطور الكون. وعندما نرجع في الزمن، فيما وراء النقطة التي تفككت فيها المادة إلى مكوناتها الجوهرية، نجد أن أول قوتين توحدتا، هما القوة الكهرمغناطيسية والقوة الضعيفة. وقبل هذا التوحد، كانت هناك ثلاثة قوى أساسية فقط: القوة الشديدة، والقوة الموحدة الجديدة "الكهروضعيفة"، وقوة الجانبية.

وبالرجوع في الزمن إلى الوراء، وبعد هذا التوحيد، كان الحدث ذو الأهمية، توحيد القوة الشديدة والقوة الكهرهروضعيفة. وقبل هذا التوحيد كانت هناك فقط قوتان أساسيتان: القوة الشديدة - الكهرهروضعيفة والجانبية. وبعد هذا، أصبح هناك ثلاثة قوى. وباستمرار هذا التوحيد بين القوى، أصبحت الكواركات واللبتونات، قابلة للتبدل فيما بينها، وفي الواقع، صارت نوعاً واحداً من الجسيمات.

وأخيراً، مع الارتفاع المروع لدرجات الحرارة، لحد لا يمكن تخيله، تقترب النظريات الكوبنية والفيزيائية، أن آخر قوتين قد اتحدتا. (والنظريات التي تصف هذه العملية، تسمى نظريات "التماثل الفائق"، وسوف نناقشها في الفصل الحادى عشر).

وفي هذه المرحلة من دراستنا للكون، لا نحتاج إلى ملاحظة أن العلماء يخبروننا بأنه في أول جزء من الثانية من وجود الكون، كان بسيطًا ورائعًا وأنبيًا، كما يمكن أن يكون. وكان يتكون من محيط من نوع واحد من الجسيمات، وأخذت هذه الجسيمات تتفاعل مع بعضها عبر نوع واحد من القوة الكونية.

ويبينما أشعر بمحنة أن أخبر جماهيرى الحبيبة التى تتبعنى إلى هذا الحد البعيد من تاريخ الكون، أن كل شئ يتفاقم منذ ذلك الوقت<sup>(١)</sup>.

### الجدول الزمني

تاريخ الكون منذ لحظة الخليقة، كان عبارة عن تمدد وتبريد "تجددات"، وفيها لا يحدث للمادة ذاتها أو للتفاعلات الأساسية أي تغير في الشكل. وبدون الخوض في التفاصيل، يمكن تأريخ تطور الكون على أساس زمني، بمساعدة جدول زمني بسيط. دعونا ننسب للحدث الأولى نفسه، الكمية التي نطلق عليها الوقت صفر. ثم الأوقات التالية تميز التجددات التي تم وصفها فيما سبق:

٤٣ - ١٠ ثانية<sup>(٢)</sup>.

في هذا الوقت، انفصلت قوة الجاذبية، عن القوة الشديدة المتحدة بالقوة الكهروضيافة. وبعد "شهر العسل" القصير من أقصى درجات البساطة، صار الكون

(١) يمكن أن تجد مناقشة كاملة للخطوات التي أوجزت هنا، وذلك في كتابي (لحظة الخليقة) The Moment of Creation (المؤلف).

(٢) سوف أستخدم ما يطلق عليه "التحول العلمي" الذى يعني باستخدام العلامات والرموز فى التطبيقات العلمية، وذلك لتوفير المساحة. وليس من الصعوبة فهم التحول العلمي. إن رقم ١٠ له أنس مكين من رقم سالب، يجب أن يفسر بأنه إشارة لـ تحريك الفاصلة العشرية بعدد هذا الرقم إلى اليسار. وهكذا فإن الرقم إلى أعلى عبارة عن فاصلة عشرية، واثنين وأربعين صفرا ثم واحدا. أما الأسس الإيجابي فيعني "حرك الفاصلة العشرية بعدد هذا الرقم إلى اليمين". (المؤلف)

- إلى حد ما - أكثر تعقيداً، إذ إن التفاعلات بين الجسيمات، أصبح يتحكم فيها الآن، نوعين من القوى. كانت الحرارة بالغة الشدة والاصطدامات عنيفة للغاية، وهذا يفوق إلى حد كبير، أي شيء في كوننا الحالى، حتى في مراكز النجوم والكوازرات. ولدى بعض الفيزيائين النظريين، أفكار عما كانت عليه الأمور في ذلك الوقت، ولكن ليس ثمة اختبارات تجريبية متاحة، تؤكد لنا صحة أفكارهم.

## ١٠-٣٥ ثانية

انفصلت القوتان: الشديدة والكهروضعيفة، تاركة الكون بثلاث تفاعلات أساسية. وتوقفت قابلية الكواركات واللبتونات للتبادل فيما بينهما، واتخذتا - تقريباً - صورتهما الحالية. وبإضافة إلى ذلك، ففي خضم هذا التجدد تشكل عدد من الأشياء الغريبة، استوجب خلقها طاقة مروعة أشد كثيراً، مما هو متوفّر في الوقت الحاضر، سواء في الطبيعة أو المختبر. وهذه الأشياء، مثل الأوتار الكونية، سوف يتم سبر غورها في الفصل الثاني عشر، وتتميز بأنها تكون مستقرة بمجرد تشكيلها. ومن ثم، فربما استطاعت أن تبقى بعد زوال غيرها، منذ هذا الزمن المبكر الموجّل في القدم، ولعلها تؤدي دوراً رئيسياً في بنية الكون.

وعلى المستوى التجاري، فإن العلماء النظريين الذين وصفوا هذا التحول، لم يقدموا دليلاً قاطعاً عليه. بل صاغوا نظرية أطلقوا عليها (النظريات الكبرى للتوحد) GUT، وتنبأوا فيها بأن البروتون - الذي أعتقد حتى ذلك الوقت بأنه مستقر تماماً - سوف يض محل بحلول زمن يزيد كثيراً عن عمر الكون. وقد باع بالفشل كل المحاولات لرؤيتها هذا الأضمحلال بتجارب بالغة الحساسية والدقة، ومن ثم، فإن العمر المقدر يزيد كثيراً جداً، مما تم التنبؤ به في أبسط الرؤى للنظريات.

## ١٠-١ ثانية

في هذا الزمن حدث آخر تجميد للقوى؛ إذ انفصلت القوة الكهرومغناطيسية عن القوة الضعيفة، وبقي الكون بالجامعة الكاملة من الأربعة تفاعلات. ويمثل ذلك أيضًا الزمن الأبكر الذي يمكن فيه أن نستحدث من جديد - في مختبراتنا - تلك الظروف التي كانت سائدة في الكون. وفي المعجلات العملاقة للجسيمات، يمكن إنتاج هذه الظروف خلال تلك الحقبة الزمنية، ولكن في قياسات ضئيلة للغاية، لا تزيد على حجم البروتون. وليس هذا بالإنجاز العظيم، بيد أنه يعد كافيًّا، لإمدادنا بطريقة موثوقة بها للغاية، لتصور الظروف التي كانت سائدة في ذلك الزمن الموجل في القدم.

## ١٠ مايكرو ثانية<sup>(١)</sup>

### اندماج الكواركات لتشكيل الجسيمات الأساسية

#### ثلاث دقائق

التحام البروتونات والنيوترونات معًا، لتكوين النوى. ولنكن أكثر دقة، فقط النوى الخفيفة - حتى الهيليوم والليثيوم - تكونت خلال هذه المراحل المبكرة من الكون. أما كل العناصر الأثقل، فقد تشكلت فيما بعد، في النجوم.

من ١٠٠,٠٠٠ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠ عام

اندمجت الإلكترونات والنوى معًا ، لتكوين الذرات. وما أن تكونت الذرات حتى أصبح الكون يشبه - إلى حد ما - شكله الحالى، واستمر تمدد الكون دون أي تغيرات جذرية.

(١) جزء من مليون من الثانية. (المترجم)

## دليل على حدوث الانفجار الأعظم

صورة "الانفجار الأعظم"، كما يدرك كل شخص، رؤية شاملة وبارعة لتطور الكون، تأخذنا من لحظة الخليقة إلى الوقت الحاضر، عبر سلسلة من الخطوات البسيطة نسبياً. ولكن هل هذا ما حدث بالفعل، أم هي حكاية تعطى انطباعاً خادعاً للحقيقة، وكأنها من أحداث قصص (روديارد كيلنجل) التي أطلق عليها "قصص مطابقة للحقيقة"؟

إن الوسيلة الوحيدة للإجابة عن هذا السؤال، هو اللجوء إلى الدليل الذي يعتمد على الأرصاد الفلكية والقياسية، التي تساند النظرية. وبغض النظر عن "الإزاحة نحو الأحمر" ذاتها، ثمة دليلاً رئيسياً متاحاً: التخليق النوى بسبب الانفجار الأعظم وال WAVES الموجات الدقيقة الخلفية الكونية. ثمة عدد آخر من الدلائل، بيد أنها من الصعوبة بحيث لا يتسع المجال لشرحها، هنا، وإنما، فإن هذه الدلائل أقل تأثيراً من الدليلين اللذين سوف أناقشهما فيما بعد.

تخليق النوى (أي وضع النوى معاً) يعزى إلى سلسلة العمليات والتغيرات التي حدثت أثناء نقطة التحول التي استمرت ثلاثة دقائق (معلم الثلاث دقائق). فخلال فترة وجيزة، تصادمت البروتونات والنيوترونات ببعضها ثم التصقت معاً، مكونة نواة خفيفة.

وبعد مرور ثلاثة دقائق، كانت درجات الحرارة مروعة، بحيث لم تتمكن النوى من الالتحام معاً، وبعد ذلك استمر تعدد الكون إلى النقطة التي أصبحت فيها كثافة الجسيمات منخفضة للغاية، إلى الحد أنها لا تستمع بحدث عدد كبير من الاصطدامات. ومن ثم، فهناك رؤية ضيقة للغاية، حول حدود الثلاث دقائق الأولى من عمر الكون، حيث تم فيها عدد كافٍ من الاصطدامات التي كانت أعداداً كبيرة من النوى، وكانت درجة الحرارة منخفضة لتسمع بالنوى التي تشكلت حديثاً، بالبقاء "على قيد الحياة".

وتخبرنا نظرية الانفجار الأعظم، عن مدى كثافة المادة المكثسة، خلال تلك الحقبة الزمنية القصيرة، ومن ثم عدد الاصطدامات التي حدثت في تلك الفترة، ويمكن إعادة إنتاج هذه الاصطدامات نفسها، في مختبراتنا، وهكذا نعرف كم مرة تنتج نواة معينة من كل اصطدام محدد. ومن ثم يكون عدد كل نوع من الأنوية المنتجة - "الفيض الأساسي الأولى" - اختباراً متخصصاً لكل جوانب الرؤية الشاملة للانفجار الأعظم.

وأفضل مثال لكيفية عمل هذا الاختبار، يتعلق بالفيض الأساسي الأولى، للهيليوم - 4، وهي نواة تتكون من بروتونين ونيوترونين. وتنبأ النظرية بأن ٢٥ بالمائة من المادة في الكون، بعد الثلاث دقائق، يجب أن تتكون من هذا العنصر. وعندما تطلع الفلكيون إلى الفضاء وقادوا الكمية الفعلية للهيليوم في الكون المعاصر، وطربوا منها تلك الكمية التي أنتجت في النجوم منذ زمن الانفجار الأعظم، توصلوا إلى تحديد الكمية التي تتبأ بها، بدرجة كبيرة من الدقة. ولو كانوا قد وجدوا فيوضاً من الهيليوم، اختلفت كميته بنسبة تصل إلى اثنين أو ثلاثة بالمائة، مما تم التنبؤ به، لأن أصبحت نظرية الانفجار الأعظم في محنـة خطيرة.

وهذا الموضوع عن التنبؤ الدقيق والإثبات اللاحق، يمكن تكراره لعدد من النوى المتباعدة، ويتضمن نواة "الديوتريوم"<sup>(١)</sup>، (بروتون واحد ونيوترون واحد) ونواة "الهيليوم - 2" (بروتونان ونيوترون واحد ونواة "الليثيوم - 7" (ثلاثة بروتونات وأربعة نيوترونات). ويتفق جميع العلماء، أن تنبؤات الانفجار الأعظم، ثبتت صحتها وقتما يتم إخضاعهما للاختبار.

والدليل الدامغ الثاني لنظرية الانفجار الأعظم، يتأتى من مصدر مختلف تماماً، وأفضل طريقة لفهمه، يكون بضرب الأمثلة. إذا دخلت حجرة بها مدفأة انطفأت فيها النيران، ويمكنك أن تعرف منذ متى كانت النيران مشتعلة، إذا نظرت إلى فحم المدفأة. فإذا كان الفحم أحمر وساخناً، معنى ذلك أن النيران انطفأت منذ وقت قليل. أما إذا كان الفحم برتقاليياً باهتاً، فربما تكون قد انطفأت منذ مدة طويلة. إن هذا التتابع

---

(١) الهيدروجين الثقيل. (المترجم)

المتواصل لعملية تبريد الفحم، والتي تصدر فيها إشعاعات لها موجات تزداد طولاً مع مرور الزمن، من الضوء المرئي إلى تحت الأحمر (التي لا تستطيع رؤيتها، ولكنك تشعر بها على راحة يدك).

ويمكن التفكير في المراحل المبكرة للانفجار الأعظم، وكأنها نيران مشتعلة، والكون بذاته كفحم لهذه النيران. ومثل الفحم في مدفأتك، فإن الكون يصدر إشعاعات تزداد أطوال موجاتها، أثناء عملية تبريد، واليوم بعد اشتعال تلك النيران، بنحو خمسة عشر بليون سنة، لابد أن تكون هذه الإشعاعات في شكل موجات دقيقة<sup>(١)</sup>، وهي نفس النوع من الإشعاع الذي نستخدمه لطهي الطعام (فرن المايكرويف) وإرسال إشارات بث التلفاز. ويمكن الفرق بين الكون والفحم في المدفأة هو أنه في المثال الأخير، تقف بعيداً عن الفحم وتشعر بالإشعاع، بينما في حالة الكون تكون في داخل المصدر الذي يصدر الإشعاع، أي إننا - في حقيقة الأمر - داخل كومة الفحم ذاتها.

وفي العام ١٩٦٤، قام (أرنو بنزياس) (روبرت ويلسون) - وهما فيزيائيان يعملان في مختبرات هاتف بل في نيوجيرسي - بتوجيه طبق تلسكوب راديو ضخم إلى السماء، واكتشفا بأنه بغض النظر عن الاتجاه، فإنهما يستقبلان إشارة تدل على وجود الإشعاعات الدقيقة. وبعد مناقشات في المجتمع العلمي، اتضح أن هذا الإشعاع هو تماماً ما يمكن أن يتوقعه المرء، إذا كان الكون قد بدأ بالانفجار الأعظم الشديد الحرارة، منذ نحو خمسة عشر بليون سنة. وفي هذا الزمن الموجة في القدم، برد الكون من درجات الحرارة المروعة التي سادت عند بدايته إلى درجة الحرارة المميزة للموجات الدقيقة، وهي حوالي ثلاثة درجات فوق الصفر المطلق<sup>(٢)</sup>. ويحتمل أن يكون هذا الاكتشاف قد جاء في وقت، ما زالت المناقشات محتدمة حول بنية الكون، مما رجح كفة

(١) إشعاع كهرومغناطيسي تقع أطوال موجاته بين مليمتر وعشرون سنتيمترات. (المترجم)

(٢) درجة حرارته ١٥، ٢٧٣ درجة منوية تحت الصفر. (المترجم)

الميزان، وأقنع المجتمع العلمي بتأييد نظرية الانفجار الأعظم، واستمر هذا حتى الوقت الحاضر.

## ما الاحتمالات؟

خلال شتاء وربيع عام ١٩٨٦، حظيت بمتعة وامتياز قضاء إجازة عمل لمشاركة مجموعة من علماء الحفريات<sup>(١)</sup> في جامعة شيكاغو. كنت أعكف على دراسة مشكلة الانقرارات الجماعية (ما الذي قتل الديناصورات؟)، وأتاحت لي هذه الزيارة التعرف على (دافيد روب)، رئيس المجموعة. وقالوا لي عن (دافيد) إنه أعظم علماء الحفريات في العالم كله، وهو تقدير - بعد أن عملت معاوناً له لفترة من الوقت - أعتقد أنه يستحقه تماماً. وهو أيضاً واحداً من مؤلاء الأفراد النادرين، الذين يجدون متعة هائلة من كل ما يقومون به من عمل. كما أنه يحب طرح الأسئلة عن الأمور، التي يقبلها أي شخص دون مناقشة، وأعتقد أن هذه الصفة لها صلة وثيقة، بما حققه من نجاح كعالم يشار إليه بالبنان. وهو أيضاً لاعب ورق ماهر (كما عرفت - لشدة أسفه - ونحن نلعب "البوكر" في أواخر إحدى الليالي)، كما أن دافيد يقضى بعضه من وقت فراغه على حاسوبه الشخصي، محاولاً إيجاد طريقة ليهزم بها النظام في "البلاك جاك"<sup>(٢)</sup>!

إنني أذكر هذه الأشياء كخلفية لما أريد أن أخبرك بها، أمر ما حدث أثناء زيارة قمت بها مع مجموعة علماء الحفريات. كان في مكتب دافيد نناقش بعض الأمور من هنا وهناك، عندما استدار إلىّ وسائلني، فجأة دون أية مقدمات "ما الاحتمالات بأن الانفجار الأعظم قد حدث بالفعل؟". وكما تخيل، فقد توقفت عن المناقشة مع الآخرين، إذ أخذتني على حين غرة. وانتابتني قوة دافعة أولية أن أجيب قائلاً بالطبع إن نظرية الانفجار

(١) دراسة أشكال الحياة القديمة. (المترجم)

(٢) لعبة ورق يكون مدهها تجميع أوراق بعد أعلى من عد الموزع للورق ولكن لا يتجاوز ٢١. (المترجم)

الأعظم صحيحة بيد أننى توقعت أن يسألنى كيف عرفت، ومن ثم، فقد تراثت فى الإجابة.

وكما أمعنت التفكير فى السؤال، أتت إلى ذهنى المزيد من الذكريات المتناثرة، تطفو فى عقلى، وتذكرت أثناء تناول غداء خفيف فى قسم الفيزياء المھيب، أن عضواً بارزاً نو مكانة مرمودة من أعضاء التدريس فى الكلية (لا أريد إخراجه بذكر اسمه) قال بأنه كثيراً ما يفكر فى ترك مظروف مختوم، لا يفتح إلا بعد وفاته بخمسين عاماً. وسوف يُضمن هذا المظروف تنبؤات عن الطريقة التى سوف تتمحض عنها مناقشات خلافية وجديية معينة. وفي أعلى القائمة، سيكون التتبؤ بأن تفسير "الإزاحة نحو الأحمر" دليلاً على تمدد الكون، سوف يثبت أنه ليس متسقاً مع هذه الذكريات التي انتابتني، بالإضافة إلى تجربتى الشخصية فى دراسة بعض الأفكار التي لم تستمر طويلاً، فى علم الكون، والتى سوف نناقشها فيما بعد، كل هذا جعلنى متربداً فى أن أكون متسماً بالتأكيد الجازم فى إجابتى عن سؤال دافيد "ما الاحتمالات بأن الانفجار الأعظم قد حدث بالفعل؟" وأخيراً، قلت له بأننى أعتقد أن الرؤية الشاملة للتمدد الكونى من البداية المروعة للحرارة، يساندھا احتمال مرتفع للغاية، بأنها صحيحة، بيد أن الكثير من التفاصيل التي يتضمنها فهمنا، يمكن أن تكون ببساطة، غير صحيحة. ويبعد أن هذه الإجابة قد أشبعت توقعات دافيد، الذى أعتقد أنه طرح السؤال على، لأن وجهه من قبل إلى أحد أعضاء التدريس فى قسم الفلك - جامعة شيكاغو، وكانت إجابته بأن الانفجار الأعظم كان مؤكداً بنسبة مائة بالمائة. وباعتبار دافيد مقاماً ماهراً، فقد ارتتاب فى الشيء القاطع والبات الذى يكون صحيحاً تماماً.

بيد أننى كلاماً أمعنت التفكير أكثر فى السؤال، أدركت أنه ليس من الممكن الرد عليه بإجابة وحيدة محددة وحاسمة، إذ إن لنظرية الانفجار الأعظم جوانب متعددة، يرتبط بكل منها مستوى مختلف من الثقة.

وكتدريب لإعطاء تقديرات - في الجدول التالي - فإننى أقدم حدسى الشخصى فى الاحتمالات التى تقدمها الجوانب المتعددة لرؤية الانفجار الأعظم، المقدمة فى هذا الفصل، ومن ثم إثبات صحتها.

الاحتمال	جوانب النظرية
٪٩٩ وأكثر	الرؤية الشاملة للتعدد الكونى من البداية المروعة الحرارة
٪٩٥	تشكيل الذرات وتخلق النوى
٪٩٥	توحيد القوة الكهرومagnetic(١)
٪٨٥	تجميد الكوارك والرؤية الشاملة للكوارك - ليتون
٪٥٠	توحيد القوة الشديدة والكهرومagnetic
٪٣٠	التوحيد مع الجاذبية
٪٢٠	التماثل الفائق، الأوتار الفائقة
٪١٠	أى نظريات عن تشكيل المجرات والبنية على نطاق واسع التى نوقشت فيما بعد

(١) لابد أن هذا صحيح، فقد حصل العلما (شيلدون جلاشو ومحمد عبدالسلام وستيفن واينبرج على جائزة نوبل في الفيزياء عام ١٩٧٩، بسبب هذا الاكتشاف الذى يعد ركيزة من ركائز فيزياء الجسيمات والنماذج المعياري. (المترجم)



## الفصل الرابع

### خمسة أسباب تشرح لماذا لا يمكن للمجرات أن توجد

يقول التقرير عن التقدم، إنه ليس هناك تقدم

نك كوزوروك

سائق كاسحة ثلج من موتان

خلال العاصفة الثلجية في ١٩٨٥

يمكننا تلخيص الرؤية الحديثة للكون في عبارتين موجزتين، الأولى، أن الكون كان يتمدد على الدوام، منذ الوقت الذي تشكل فيه، وخلال هذه العملية تطور من بُنى بسيطة إلى أخرى معقدة، والثانية، أن المادة المرئية في الكون منتظمة في شكل تسلسل هرمي: تجتمع النجوم في مجرات والمجرات في عناقيد مجرية، والعناقيد مجرية في عناقيد فائقة، والمشكلة التي تواجهنا عند ذلك، هي فهم كيف أن كوناً تسيطر على تطوره العبارة الأولى، يمكن أن تصبح بنيتها قابلة للتفسير بالعبارة الثانية.

وقد ثبت أن مشكلة تفسير وجود المجرات، واحدة من أكثر الموضوعات الخلافية في علم الكون، وبأعمال المنطق، فإن المجرات يجب ألا تكون موجودة في الكون، ومع هذا، فإنها رابضة هناك. ومن الصعوبة أن نننقل مدى عمق الإحباط الذي أحدثه تلك الحقيقة البسيطة بين العلماء، ويمرور الوقت، تحققت تطورات ناجحة، وبدا أنه تم

التوصل إلى حل المشكلة. ولكن في كل مرة ينهاه الحل، وتتشاءم مشاكل جديدة. ونجد أنفسنا ثانية من حيث بدأنا.

وكل بضع سنوات، تعقد الجمعية الفيزيائية الأمريكية - التي تضم تجمعاً مهنياً للفيزيائيين - جلسة في أحد اجتماعاتهم، يتحدث فيها الفيزيائيون الفلكيون، عن الطرق الجديدة الأكثر إثارة التي تعالج مشكلة المجرات. وكانت أحرص على حضور عدد كبير من تلك الجلسات، التي جعلتني أشعر باحترام كبير لأنجعية وبراعة زملائي. وفي نفس الوقت، أثارت في نفسي الشكوكية<sup>(١)</sup> العميقية، عن الآراء التي قدمواها.

واستمعت بشغف في هذه الجلسات، إلى تفسيرات عن كيف أن الاضطرابات الواقمية الكونية والثقوب السوداء والانفجارات أثناء تشكيل المجرات، والنويوتينات الثقيلة والمادة المظلمة الباردة، سوف تقدم حلولاً لكل مشاكلنا، وهذا كونت حصانة لما أطلق عليه (جيم بيلن) الفيزيائي الفلكي في جامعة (برنستون) "أسلوب المخادعة" في علم الكون. وعلى الرغم مما قد تقرأه في الصحف والمجلات، فإننا ما زلنا غير قادرين على الإجابة عن السؤال، لماذا تمتلك السمااء بال مجرات، مع أننا نجحنا في استبعاد إجابات عديدة خطأنا. وربما تكون في الوقت الحاضر أقرب كثيراً للحقيقة، مما كان عليه من قبل، ولكن لا تدع هذا يخدعك ويدفعك إلى سلامة الطوبية.

فليس مستحيلاً أن تفاصيل الحلول الموصوفة فيما بعد، سوف تتحقق بالجهود الفاشلة التي تمت في الماضي. وعلى الرغم من هذا، فإننا سوف نناقش الرأى القائل بأن بعض الأفكار العامة المتضمنة في تلك الحلول، سوف تشكل - على الأرجح - جزءاً من الحل الكبير، وذلك إذا توصلنا إليه في أى وقت.

وفي البداية، أود أن أشعرك بمدى الصعوبة والتآثير العميق لهذه المشكلة الملحّة، بتقديم خمسة أسباب تؤكد بأن المجرات لا يمكن أن توجد. وسوف يمنحك ذلك أيضاً

---

(١) المذهب القائل بأن المعرفة المطلقة تكون مستحيلة وغير مؤكدة. (المترجم)

الفرصة لكي نتجول خلال "معرض روج"<sup>(١)</sup> للأفكار الفاشلة، أى تلك الآراء التي لم تؤتِ ثماراً. وسيتركتنا هذا بإحساس شديد بالاتضاع، ونحن نتفحص النظريات السائدة في الوقت الحاضر.

**السبب الأول:** لا يمكن أن تكون المجرات قد تشكلت قبل تكوين الذرات

ربما نفكر في الكون - خلال المراحل المبكرة من تمدد (هابل) - أنه يتكون من عنصرين: المادة والإشعاع، ورأينا فيما سبق، كيف أن المادة خضعت لسلسلة من التجمادات، بينما كانت تحول تدريجياً إلى بنى أكثر وأكثر تعقيداً. وبينما كانت هذه التغيرات تستمر باطراد في شكل المادة، حدثت تحولات جذرية في الطريقة التي تتفاعل بها المادة مع الإشعاع. وهذا بدوره، يؤدي دوراً محورياً في تشكيل المجرات.

إن الضوء والأنواع الأخرى من الإشعاع، تتفاعل مع الجسيمات الحرة المشحونة كهربائياً من النوع الذي يوجد في البلازماء التي شكلت الكون قبل تكوين الذرات.

ويسبب هذا التفاعل، وعندما يتحرك الإشعاع عبر مثل هذه البلازماء، فإنه يصطدم بالجسيمات، فترتدى إلى الخلف باذلة ضغطاً، بنفس الطريقة تقريرياً التي ترتد بها جزيئات الهواء عن جدار إطار العجلة المطاطي، لتحتفظ به منفوخاً. وإذا حدث أن تكتلاً للمادة - في حجم مجرة - حاول أن يتشكل قبل تجميد الذرات، فإن الإشعاع المتدقق عبر المادة، سوف يمزق التكتل إرباً. وبينما ينفي الفكرة، يميل الإشعاع إلى الاحتياز داخل المادة. وإذا حاول الخروج، فسوف يعاني من الاصطدامات، ومن ثم يرتد إلى الخلف.

---

(١) صالة عرض لجموعة من صور الجرمين والمشتبه فيهم، من مقتنيات الشرطة، يتم الاحتفاظ بها لأغراض إثبات الهوية ودليل للإدانة. (المترجم)

وتكمّن أهمية هذه العبارة، بـأنه من الصعب المبالغة في تقديرها. إذ إن ما تعنيه - في واقع الأمر - أنه ما دامت المادة تبقى في حالة بلازما (أى ما دامت الذرات لم تتجمد بعد)، فلا يمكن أن تكون الجراث قد تشكّلت أو حتى بدأت في التشكّل. وتبع هذا فترة محدودة، بدأت قبل هذا التاريخ بحوالي مائة ألف سنة، عندما حدث أول تشكّل للمجرات. وقبل ذلك الوقت، كان التفاعل بين المادة والإشعاع، سوف يمنع أي شيءٍ، مثل كوننا المعاصر، من التشكّل.

وبعد تكون الذرات، تغير الموقف بشكل واضح. والحقيقة الدامغة هنا، أن الإشعاع لم يتفاعل بنفس القوة مع الذرات، كما حدث مع الجسيمات المشحونة في البلازما. فإذا وقفت على قمة جبل أو أعلى مبني مرتفع، وتطلعت إلى ما يحيط بك من مشاهد طبيعية، فإنك - على سبيل المثال - ستتمكن من رؤية علامات بارزة مميزة لتضاريس الأرض، على بعد خمسين ميلًا أو حتى مائة ميل. وفي بعض المناطق، مثل قمم الجبال التي تنتصب عالياً في الهواء الرائق في غرب الولايات المتحدة، يمكنك أن ترى معالم على بعد أكبر.

والآن، وقبل أن ترى هذه المعالم، من الضروري أن الضوء يجب أن يرتحل من الشيء الذي تراه، إلى عينيك. إذن الخبرة البسيطة لرؤيه طريق طويل ممتد، تخبرنا أن الضوء يمكنه أن ينطلق لمسافات طويلة، خلال الهوا، دون أن يتشتت أو يشوش. ولا يمكن حدوث ذلك في البلازما. إن ذلك يحدث في الهواء الذي يتكون من ذرات وجزيئات، يُظهر أن التفاعل بين الضوء وهذين الشكلين من المادة، لا بد أن يكون مختلفاً تماماً الاختلاف.

في ذلك الوقت، عندما كان الكون في مرحلة مبكرة من تطوره، جرت الأحداث في تسلسل مثل هذا. حتى معلم<sup>(1)</sup> الـ ١٠،٠٠٠ سنة تقريباً، كانت المادة في شكل بلازما،

---

(١) علامة بارزة مميزة. (المترجم)

ولم يكن من الممكن تشكيل أي أجرام فضائية في حجم مجرة. وعند المئة ألف سنة، بدأت الذرات الظهور وببدأ يضعف التفاعل بين الضوء والمادة.

ولم يحدث تكوين الذرات فجائياً، بل استمر لما يقرب من مليون سنة. وبين هذين الزمنين انتقلت بنية الكون - تدريجياً - من البلازما إلى الذرات، وفي الوقت الذي انتهى فيه هذا الانتقال، تبقيت بعض الجسيمات الحرة المشحونة كهربياً. وكانت الذرات هي الشكل السائد من المادة.

وبين الحين والآخر - أثناء تكون الذرات - انخفضت قوة التفاعلات بين المادة والإشعاع، إلى الحد أن الإشعاع لم يعد محبوساً داخل البلازما. ومن ثم، تدفق الإشعاع حراً، ومنذ ذلك الوقت فصاعداً، كان له تأثير بسيط على عملية تشكيل المجرات. وباستخدام مصطلحات علماء الكون، نقول بأنه خلال تكوين الذرات، فك الإشعاع تقارن<sup>(١)</sup> بالمادة.

وعلى الرغم من أن فك التقارن كان تدريجياً، فإننى بين فترة وأخرى متباude، سوف أشير إلى هذه العملية على نحو طليق. سأتحدث عنها على أساس أنها حدثت خلال  $500,000$  سنة، وهذا رقم تقريبي، ويمثل - إلى حد ما - منتصف الطريق إلى تجميد الذرات. وسوف يكون هذا كمراجع مختصر، ويجب إلا يعني أن الكون كان معتماً إلى أن أصبح عمره  $500,000$  سنة، ثم صار شفافاً بعد  $500,000$  سنة بثانية واحدة!

وقد توصلت إلى مثال مفيد، للمساعدة في تكوين صورة ذهنية، لعملية فك التقارن. عندما يقدم إليك مشروب مثل الشاي المثلج، في كوب زجاجي طويل، لاحظ ما الذي يحدث عندما تضع السكر وتحركه. في البداية، سوف يصبح المشروب معتماً، ذلك

---

(١) التقارن: ما يحدث بين الأشياء من تأثير بعضها في الآخر. (المترجم)

أنه في تلك المرحلة، يكون السكر في شكل مكعبات كبيرة نسبياً، تشتت الضوء بفاعلية. وأنت تعلم أن التشتت فعال، لأن الضوء لا يستطيع تخل الشاي. بطول كل الكوب، بيد أنه - بدلاً من ذلك - يتشتت. إن الذي يعطي الشاي مظهره الغائم، ذلك الضوء الذي ينتشر داخله باتجاهات عشوائية مختلفة. وفي هذه الحالة يشبه الشاي - مع الفارق - الكون قبل تكون الذرات، عندما كان الإشعاع يتفاعل مع البلازما. وبعد عدة لحظات، يصبح الشاي فجأة شفافاً من جديد.

وما حدث هو أن السكر ذاب في الشاي، والآن يوجد في شكل جزيئات تتفاعل بضعف مع الضوء. وأصبح الضوء يأتي خلال الشاي دون أن يتشتت، فيذهب التغيير. وهذا التغيير من التغيير إلى الشفافية في كوب الشاي، يشبه ما حدث في الكون، عندما تشكلت الذرات. وأصبح الكون شفافاً، عندما فُكَّ تقارن الإشعاع، ولم يتبق شيء ليقاوم قوة الجاذبية، التي تجمع المادة معاً.

وهكذا يمنع التفاعل بين الإشعاع والمادة، بداية عمليات تؤدي إلى تشكيل المجرات، قبل أن يبلغ الكون من العمر ٠٠٠٠٠ سنة، ويصبح ذلك مشكلة أساسية لأن..

## السبب الثاني: لم يكن لدى المجرات الوقت الكافي لتتشكل

الجاذبية، هي أكبر قوة تفقد الكون استقراره وتوازنه، وهي لا تترك شيئاً على حاله بل تعمل دائمًا بنشاط وفاعلية، تحاول أن تجذب كلًا من المادة معاً. وبشكل ما، فإنه يمكن النظر إلى تاريخ الكون برمته، على أنه محاولة يائسة وعبثية وغير مجده مطلقاً - في مآل الأمر - للتغلب على الجاذبية. وسيكون من المذهل حقاً، أن نعترف بقوة الجاذبية الكونية، إذا لم تكن قد أدت يوماً رئيسياً في تشكيل المجرات.

افتراض أن الكون قد بدأ بتجمّع على نسق واحد. لكل مترادفة من المادة، ولا يوجد موقع فيه به تركيز أكبر للمادة، أكثر من أي موقع آخر. في هذه الحالة، يمكنك أن تتوقع أن قوة الجاذبية تعمل على جذب كل شيء في الكون معاً، إلى شمس مركبة محال وجودها. يمكنك أن تعتقد ذلك، ولكنك ستكون مخطئاً، إذ لا يمكن هذا متسقاً مع الحقيقة والواقع.

وتكمّن المشكلة في أن أي تركيز للمادة، مهما كانت موزعة بطريقة متماثلة، سوف توجد بها تجمعات ضئيلة في مكان ما حتى لو استخدمنا الفحص المجهري للبحث عنها، إذ سوف ينبع عن الحركة العشوائية للذرات - في نهاية الأمر - وجود حالة من عدم التمايز في الكون، تؤدي إلى تكوين فائض صغير من الذرات في بعض المواقع، ونقص ضئيل في مواقع أخرى.

وليس من الصعب تصور ما يحدث بعد ذلك، ففي لحظة معينة، تراكم كمية إضافية من المادة في مكان ما، إما بسبب حركة الذرات أو بسبب آخر. وبؤدي التكثف الزائد للمادة في هذا الموضع، إلى أن تكون قوة الجاذبية فيه أشد من المواقع الأخرى المحيطة. وبالتالي، سوف تجذب كتلة أكبر إلى الموضع الذي حدث فيه التركيز الأصلي للمادة. ومع انجذاب المزيد من الكتلة، يصبح التركيز قادراً على ممارسة قوة تجاذبية أكبر، وسحب المزيد من المادة إليه، ويغض النظر عن التوزيع المماطل الأولي، فإنه ما إن يتشكل أصغر تركيز للمادة، حتى تتحطم الكتلة الخفيفة إلى أجزاء أصغر، ويلتحق كل منها بأحد تركيزات الكتلة الأساسية. وعدم الاستقرار هذا المتأصل في كتلة من المادة، قد أشار إليه - في العشرينيات من القرن العشرين - الفيزيائي الفلكي البريطاني سير (جيمس جينز)<sup>(١)</sup>.

---

(١) (١٨٧٧ - ١٩٤٦)، عالم شهير عمل في مجالات الفيزياء والفلك والرياضيات. (المترجم)

واللوحة الأولى، يبدو هذا كبارقة أمل. إن الكون يجب أن يفت إلى وحدات صغيرة من كتل المادة، وبالمصادفة وبصرية حظ، يمكن أن تتحول هذه الوحدات الصغيرة إلى مجرات. ويحدث لها هذا التحول، على الرغم من أنها تحولنا فقط عن كون لا يتمدد، والنتيجة التي توصل إليها جينز حقيقة أيضاً، حتى لو كان هناك تمدداً للكون. بيد أن المشكلة ليست بهذه البساطة، إذ إن نفس النظرية التي تخبرنا أن التوزيع المتماثل للمادة، غير مستقر في حالة وجود هذا التفت إلى كتل صغيرة، تبلغنا أيضاً عن المدى الزمني الذي سوف تستغرقه هذه العملية.

ويمكن تخفيض هذا الأمر فيما يلى: هل يمكن لقوى الجاذبية أن تعمل بالسرعة الكافية، بعد حدوث فك التقارن، لتجميع المادة في كتل بحجم المجرات، قبل أن يجعل تمدد الكون كل شيء خارج السيطرة؟ ولعل واحدة من الصدمات الكبرى لمجتمع علماء الفلك، في الثلاثينيات من القرن العشرين، هي أن الإجابة الكبرى المدوية لهذا السؤال، النفي بكلمة "لا". وفيما يبدو أن أكثر آلية مرحلة لتشكيل المجرات - تلك الآلية المصاحبة لعدم الاستقرار التجانبي، والتي شرحناها للتو - سوف لا تعمل مع كون يتمدد. وربما أن هذه الحقيقة هي التي قادت (جينز) - عندما تقدم به العمر - ليقترح كوناً خلقت فيه المادة باستمرار في الفراغات التي تختلف عن التمدد المجري. وفي هذه الرؤية، فإن تشكيل المجرات عملية متواصلة، وليس مقتصرة على زمن معين من تاريخ الكون.

وأطلق على هذا الرأى فيما بعد "الكون المستقر"، وفي نهاية الأمر، أهمل بعد تجميع الدليل الدامغ والملقن، الذي يدعم نظرية الانفجار الأعظم (انظر الفصل الثالث). وهكذا يمكن تخفيض مشكلة تشكيل المجرات، كما يلى: لا يمكن أن تبدأ المجرات في التشكل، إلا بعد أن فك تقارن الإشعاع والمادة. ومع هذا، إذا كانت الآلية الوحيدة التي تتتوفر لنا هي الاختلالات التجانبية من النوع الذى قال به (جينز)، فإن كل المادة سوف تخرج عن المجال الذى يحدث فيه أى نشاط، قبل أن يتمكن أى شيء - مثل

الكلل المجرية الحالية - من التجمع، وثمة رؤية ضيقة للزمن بين فك التقارن والنقطة التي تكون فيها المادة منتشرة في الكون على نحو رقيق غير كثيف للغاية، وأى آلية لتشكيل المجرات يمكننا قبولها، يجب أن تعمل بسرعة كافية حتى تتناغم مع تلك الرؤية الضيقة للزمن.

وهناك طريقة واحدة تفرض نفسها للوصول إلى حل، إذا لم نتمكن من الانتظار حتى تتكدس التركيزات الذرية، وإذا استطعنا إيجاد طريقة ما لمنع الانهيار التجاذبي، دفعاً البداية، فربما نكون قادرين على ضغط تشكيل المجرات، ليحدث في الوقت المخصص، وثمة طريقة واحدة ممكنة لحدوث ذلك هو الحصول على تركيزات الكلل التي تكونت ببعض العمليات الفيزيائية الأخرى، مثل الأضطرابات في سحب الغاز الكونية، بعد تكوين الذرات، ولكن للأسف يقودنا هذا الاتجاه في المناقشة إلى.....

### السبب الثالث: لن تعمل الأضطرابات أيضاً

إن "دفعاً البداية عبر الأضطرابات" ، فكرة بسيطة، تتضمن الرؤى الأولى، التي تم الإعلان عنها في نحو العام ١٩٥٠، وكان نص الافتراض كما يلى: أى عملية كونية في عنفها وأضطرابها مثل المراحل المبكرة من الانفجار الأعظم، لن ينجم عنها توزيع متباين للمادة، ولن يكون الانفجار الأعظم مثل النهر العيق والساكن، ولكن مثل أنهار الجبال سريعة الجريان التي تمتلئ بالزبد والأضطراب، وفي هذا التدفق المضطرب، تتوقع وجود دوامات ودورات ونوابع من الفارات. وفي تلك النظرية، تكون الدوامة - في واقع الأمر - تركيز من المادة من النوع الذي قال به (جينز)، تجذب إليها المادة المحيطة بها، بسبب قوتها التجاذبية. وإذا كانت الدوامة بالحجم المناسب، فيمكنها أن تجذب كتلة في حجم مجرة، قبل أن تجد الفرصة لكي تتشتت، وهنا تصبح هذه المادة ضخمة بدرجة كافية، حتى تكون متماسكة بقوة الجاذبية، بعد انتهاء الدوامة الكونية.

هذا شيء رائع، بيد أن هناك بعض الصعوبات التي تواجهنا. في المقام الأول، إن الدوامة التي تتكون قبل علامة ...، مازالت تركيزاً لكتلة، ومثل كل تركيزات المادة الأخرى، سوف تتنزق إرباً بتأثير الضغط الإشعاعي المر杜.

وبالتالي، فإن الدوامات الكونية الهائجة، التي تعمل كنوى تكافث للمجرات، يجب أن تبرد إلى الوجود، بعد ظهور الذرات. ومعنى ذلك أن الدوامات الكونية التي تشكلت بعد التجديد الذي مباشرة، هي تلك التي - على الأرجح - أدت إلى تكوين المجرات، لأنها الوحيدة التي كان لها الوقت الكافي لتجميع المادة معًا. وإذا كانت هذه الدوامات بالحجم المناسب، فإنها تستطيع - بلا ريب - أن تنتج المجرات التي نرصدها في الوقت الحاضر. ويمكننا - ببساطة - أن نفترض أن هذه الدوامات كانت في حجم المجرات (أو قريبة من حجمها)، عندما وجدت في وقت تفتق التجمد.

بيد أن هذا الرأي يثير نقطة فلسفية مريكة. إننا يمكن أن نتطلع إلى المجرات التي نراها، ونتخيل شكلها في الزمن الموجل في القدم، ولنفترض وجود مجموعة من الدوامات الكونية العنيفة التي سوف تنتج هذه المجرات. إن هذه الصورة الذهنية لن تحل المشكلة، بل إنها تصيغ السؤال القديم بشكل مختلف، دافعة إياه إلى الوراء خطوة واحدة، وبدلًا من السؤال "لماذا تكون المجرات كما هي الآن؟" نوجه السؤال "لماذا كانت الدوامات الكونية بهذا الشكل في الزمن الغابر؟" وهذا ليس تقدماً كبيراً، أليس كذلك؟

وعلى أية حال، فإن فكرة استخدام الاضطراب الكوني كسبب لبدء تشكيل المجرات، لم تلق نجاحاً على الإطلاق إذ إن مدى عمر الدوامات الكونية - أي استمرارية وجودها في حركة نورانية ملتوية - ليس طويلاً بما يكفي لإنتاج أنواع المجرات التي نرصدها في الوقت الحاضر. وأهمل العلماء هذه الفكرة لتفسير تشكيل المجرات، في منتصف السبعينيات من القرن العشرين.

#### **السبب الرابع: لم يكن لدى المجرات الوقت الكافي لتشكيل العناقيد المجرية**

ولعلنا نواجه صعوبات في بحثنا، لأننا ننظر إلى مشكلة تكوين المجرات، نظرة ضيقية محدودة. وربما الأجرد بنا أن نبحث الأمور على مستوى أوسع، ونأمل فهم كيفية تشكيل عناقيد المجرات، أما نشوء المجرات الفردية فسوف تعتني بنفسها. وتؤدي بنا هذه الفكرة - بطبيعة الحال - إلى السؤال المطروح عن كيفية تشكل التركيزات الهائلة للكتلة في الحياة المبكرة للكون. وإحدى أبسط الأفكار عن الشكل الذي ربما كان يتبعه الكون، عند تكون الذرات، أنه بصرف النظر عن الأحداث الكونية الأخرى التي تجري، فإن درجة الحرارة كانت متماثلة في كل مكان. ويطلق على هذا "النموذج المتحارر".<sup>(١)</sup> ويتناغم هذا مع الافتراض بأن الإشعاع في الكون المبكر كان منتشرًا بتماثل، سواء كانت المادة متنكّلة معاً أم لا؟<sup>(٢)</sup>.

وإذا بحثت في النتائج الرياضية للنموذج المتحارر، لوجدت أن أنواع تركيزات الكتلة، التي تكون قد تشكلت في الكون المبكر، يمكن شرحها بغاية السهولة. إذ مع انتشار درجة الحرارة في كل أرجاء الكون، سوف تنتج التذبذبات العشوائية العادية، تركيزات للكتلة من كل الأحجام، فإذا أردت إيجاد تركيز بحجم كوكب، سوف تجده دون عناء، وكذلك بحجم مجرة وعنقود مجرى، وهلم جرا. وفي اللغة الاصطلاحية لعالم الفيزياء الفلكية، سوف تظهر تركيزات الكتلة على كل المستويات.

وفي هذا النموذج، ثمة حل بسيط محدد، لحل مشكلة المجرات، ذلك أن أصغر تركيزات الكتلة، تنمو بسرعة أكبر من تلك التي لها حجم كبيرة، وأول أشياء سوف تنمو ستكون الأشياء الصغيرة نسبياً، والتي يطلق عليها "المجرات الأولية"، وربما

---

(١) متساوي الحرارة. (المترجم)

(٢) إن العلاقة بين الحرارة الثابتة والتوزع التماثل للإشعاع، قد لا تكون واضحة، وسوف تأخذ وقتا طويلاً لإثباتها. أرجو أن تأخذها الأن كامر مسلم به. (المترجم)

تحتوى كل منها على حوالى مليون نجم. وهذه المجرات الأولية سوف تتكلل فيما بعد، بتأثير الجاذبية، لتشكيل مجرات مكتملة النمو، التى سوف تتكلل معاً بدورها، لتكوين العناقيد المجرية والعناقيد المجرية الفائقة. وهذا النموذج، يبنى نفسه "من أسفل إلى أعلى". والعقبة الوحيدة هنا - ببساطة - أنه لم يتوفّر الوقت الكافى لاتحاد المجرات مع بعضها، تحت تأثير الجاذبية، منذ لحظة الخلق. ومع هذا، وكما سوف نرى بالتفصيل في الفصل الخامس، أن هناك بعضاً من تجمعات المجرات في السماء، بالغة الضخامة والتعقيد. وهذا يدفعنا إلى الاستنتاج، بأن الكون، لم تكن درجة حرارته متمائة خلل كل أجزائه، عندما حدث فك التقارن.

والجادلة التي طرحتها للتو، لا تعنى على الإطلاق، أنها ضد وجود المجرات. ولكنها تظهر فقط، أن المجرات لا يمكن أن توجد، إذا افترضنا أن الإشعاع كان موزعاً بتماثل في الكون المبكر. وهذا الافتراض - على الرغم من أنه منطقى بقدر كافٍ فإنه ليس محفوراً كالوصايا العشر، فوق ألوان حجرية<sup>(١)</sup>. وحيث إنه أثبت فشله في التطبيق، إذن، فإننا أحراز دائماً، لتجربة شيء آخر، على سبيل المثال، الافتراض بأن الإشعاع لم يكن موزعاً على نسق واحد في الكون المبكر. وإذا واصلنا بحثنا في هذا المجال، فإننا سوف نرتطم ب.....

**السبب الخامس:** لو أن الإشعاع يتكتل مع المادة، والمادة تتكتل في المجرات فيكون إذن الإشعاع الكوني للموجات الدقيقة غير صحيح.

إذا لم يكن الإشعاع قد انتشر بشكل متماثل، مستقلًا عن المادة في الكون، أين كان يمكن أن يوجد؟ ويتبين الأساليب النموذجية للفيزيائين النظريين، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الافتراض العكسي، سوف نفترض أنه في الكون المبكر، أن المادة

---

(١) يقصد المؤلف أن هذا الرأى ليس منزهاً عن النقد. (المترجم)

والإشعاع مندمجان معاً، إذا كان الوضع هكذا، ففي حالة وجود تركيز للكثافة، سوف يكون بالتالي تركيزاً للإشعاع. وفي اللغة الاصطلاحية للفيزياء، فإن هذا يسمى وضعياً "أدياباتيكياً"<sup>(١)</sup>، الذي سوف ينشأ مع التغيرات في توزيعات الغاز، وستكون سريعة للغاية، إلى الحد أن الطاقة لا تتمكن من الانتقال بسهولة من إحدى النقاط إلى النقطة التي تليها. إننا نعرف أنه لكي نشكل مجرة، فلا بد أن تكون المادة في الكون، مقسمة بشكل واضح إلى كتل، عندما تكون الذرات، وإننا نطلق على هذا "نعطي العملية إشارة تشغيل البداية". والنتيجة الطبيعية الضرورية، هي أنه تحت ظروف الأدبياتية السائدة، لا بد أن الإشعاع أخذ يتكتل أيضاً. بيد أن هذه النتيجة تتحدى إحدى الحقائق الثابتة للكون الذي نعرفه. وإذا تعلقت إلى إشعاع الموجات الدقيقة (انظر الفصل الثالث)، الذي يتدفق إلينا من القطب الشمالي للأرض، ثم استدر وانظر إلى الإشعاع يأتي من اتجاه القطب الجنوبي، سوف تلاحظ أنهما متطابقان إلى حد كبير. وفي الحقيقة، إنك بغض النظر عن الاتجاه الذي توجه نظرك إليه في السماء، فإن إشعاع الموجات الدقيقة الخلفية للكون، يجيء لنا متماثلاً من كل الاتجاهات في السماء. وهذه العبارة صحيحة بدقّة تبلغ واحداً في الألف. ومن هذا التماثل، نستنتج أنه عندما فك الإشعاع تقارنه بالمادة، لا بد أنه كان موزعاً بطريقة متماثلة تماماً في كل أرجاء الكون. والمحصلة النهائية هي: أن ما هو مطلوب من إشعاع الموجات الدقيقة الخلفية للكون، فيما يتعلق بعملية تشكيل المجرات، وما نلاحظه من تماثلها، يتعارضان تماماً فيما بينهما إذ يتطلب المذكور أولاً أن يكون الإشعاع متجمعاً مع المادة، فإذا كانت المادة متكلّلة عندما تكونت الذرات، كان لا بد من آثار لهذا التكتل في إشعاع الموجات الدقيقة الخلفية للكون، في الوقت الحاضر. ومن ناحية أخرى، فإن التماثل الملاحظ لإشعاع الموجات الدقيقة الخلفية للكون، يدل ضعفياً على أن الإشعاع من المستحيل أنه

---

(١) Adiabatic، أي ثابت الحرارة، وهي صفة تطلق على كل عملية تحدث في نظام حراري، لا يصاحبها فقد أو كسب حرارة. (المترجم)

كان متكتلاً بشكل كامل، وإلا ما أصبح متماثلاً في أيامنا هذه. وعندما تجري الحسابات الرقمية، يجد علماء الفيزياء الفلكية، أنه من المستحيل التوفيق بين هذين المطلبيين المتعارضين. إذن لا يمكن لإشعاع الموجات الدقيقة الخفية للكون أن يكون متماثلاً وغير متماثل في نفس الوقت.

### وماذا بعد؟

إن المنطق المستخدم فيما سبق، في التفكير والمناقشة، يؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك ويوضح تماماً – أننا لا نستطيع أن نأخذ كوناً يمتنى بالجرات كأمر مسلم به. وأسهبنا في شرح أن الكون كان أكثر تعقيداً مما تصور أي شخص، عاش في زمن (هابل). بيد أن تفحصنا للنظريات التي لم يصادفها النجاح، أظهرت أيضاً بعض العناصر التي يجب أن تشملها أي نظرية صحيحة عن تشكيل الجرات.

إننا نعرف أنه إذا كان على الجرات الانتظار، إلى ما بعد فك تقارن الإشعاع، حتى تبدأ في التشكل، لما استطاعت تحقيق ذلك أبداً. إن التقلص التجاذبي من توزيع متماثل للمادة، يكون بطريقاً للغاية ليقاوم بمعقول مضاد تمدد الكون الذي قال به (هابل). وبالتالي، فإن الكون – بعد فك التقارن – تكون مجراته بالفعل قد قطعت شوطاً طويلاً، في طريقها إلى استكمال تشكيلها. ولا تحتاج الجرات أن يكون تشكيلها مسبقاً، ولكن على أقل تقدير، فإن الكون يجب أن تغرس به بنور ويدعم، بنوع من تركيزات الكثافة التي يمكنها أن تطلق عملية التقلص التجاذبي. وسوف تعمل هذه التركيزات – بلا ريب – مثل هباءات الغبار التي تعمل كنوى تتشكل حولها قطرات المطر في الجو. إن تلك التركيزات للكثافة سوف تكون بمثابة النوى المتكتفة للجرات.

وإذا كانت هذه النوى في المكان المناسب عند الاحتياج لها، فلابد أنها تكونت في موضع ما مبكراً في تاريخ الانفجار الأعظم وبقيت على قيد الحياة حتى عالمة

الـ . . . . . سنة. ومن المناقشة في صفحة ٥٦ (السبب الأول)، نعرف أن التركيزات العادية للمادة، لا يمكنها أن تقوم بهذا. إذا كانت قد تمزقت إرباً بتأثير ضغط الإشعاع المروع، قبل زمن طويل من تمكنها من العمل كنواة متكتفة لجرة. وأيًّا كانت "البذرة" التي نشأت مبكراً، كان لابد لها أن تقاوم احتدام الإشعاع وضيقه المروع، لدد طويلة. ومن ثم، يجب أن تكون "بنور" المجرات مكونة من نوع من المادة، التي لا تتفاعل بقوة مع الإشعاع. إن هذه تفويه عن الكون، كما سنرى في الفصل السابع، التي زودتنا ببعض الأمل، بأننا سنتمكن من تلمس طريقنا خارج ذلك النوع من المعضلات التي في مناقشتها.

مع ذلك، وقبل أن نتوجه إلى هذا التساؤل، يجب أن نلاحظ أن السببين الرابع والخامس، اقترحاه بقوة، أن مشكلة المجرات هي في حقيقة الأمر، جزء يسير من تساؤل أكبر، يتعلق بالبنية الشاملة للكون. وقبل أن نستطرد في بحثنا، ونتأمل الحلول الحديثة للتساؤل، ثم سوف نستغرق بعض الوقت لمناقشة - بشيء من تفصيل أكثر - الطريقة التي تتنظم بها المجرات في السماء.



## الفصل الخامس

### ففاقيع وعناقيد مجرية فائقة

وأدركت أن حياتي كانت فاشلة  
عندما أخذت لألاحظ بانتباه الففاقيع في كأس الجمعة.  
(أغنية شعبية غريبة)

يعرض بمتحف الفن في شيكاغو مجموعة من لوحات فرنسية تنتهي لواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وتعد إحدى أفضل المجموعات في العالم لهذه الفترة من الزمن، وقد اقتربت خلال الوقت التي كانت فيه مدينة شيكاغو بحق، كما يقال عنها "مركز صناعة تعبئة اللحوم وتغليفها، كما تشتهر بخطوط السكك الحديدية التي تعد الأفضل في كل الولايات المتحدة".

ومن بين أشهر تلك اللوحات الفرنسية، تلك اللوحة الكبيرة المرسومة على الكنفا<sup>(١)</sup> للفنان الفرنسي (جورج سورا)<sup>(٢)</sup>. وعنوانها الرسمي "البحيرة الكبرى"، ولكنها معروفة بين العامة باسم "بعد ظهر يوم أحد في المتزه العام".

(١) قماش غليظ من القطن أو الكتان معد للرسم الزيتي. (المترجم)

(٢) (١٨٥٩ - ١٨٩١) من كبار الرسامين الفرنسيين. (المترجم)

وتظهر مجموعة من الباريسين يتجلون في متنزه عام قريباً من نهر السين. وبلغ من روعة اللوحة، أنها أصبحت إلهاماً لأحد عروض برو沃اي أطلق عليه "يوم أحد في المتنزه العام مع (جورج)". واستخدم الفنان (سورا) تقنية في الرسم لم تكن مألوفة في عصره. فبدلاً من جر فرشاته على الكتفا بالطريقة التقليدية، عمد إلى لس الكتفا فقط بطرف الفرشاة. وكانت النتيجة، رسم زيتى مكون من كمية هائلة من النقاط الصغيرة الملونة وبطرق على هذه الطريقة في الرسم "التقريطية"<sup>(١)</sup>.

ويسبب هذه التقنية في الرسم، يكون النظر إلى اللوحة الفنية تجربة فريدة. وإذا تطلعت إلى اللوحة من بعيد، ترى ما الذي كان يعنيه الفنان، منظر المتنزه العام وما به من أشخاص يتشرون أو يجلسون. وإذا اقتربت من اللوحة، فإن المنظر يخفي وكل ما تراه مجرد مجموعة من النقاط الملونة المنتشرة فوق قماش الكتفا. وإن المشاهد الصقيقة والناعمة التي تتراهى لا عندما تنظر إلى اللوحة الكبيرة، تخفي بين طياتها التركيب الفعلى المنقط.

وتقدم لوحة (سورا) هذه، تشابهاً جزئياً بأحد أهم المفاهيم الباقية في الذهن والتي تلقى تقبيراً من الفلكيين، عن بنية الكون. ومضمون هذا المفهوم أننا إذا نظرنا إلى أحد المستويات الكبيرة بما يكفي، سوف نجد أن الكون صقيل وناعم وموحد كلّياً في البناء والتركيب. ومنذ عهد أينشتين وما بعده، اعتبر ثقة علماء الكون أن هذه العبارة صحيحة.

ومع هذا، فإنه وفق الحقيقة الواقع، فإن الكون الذي نعرفه، متكتل<sup>(٢)</sup>. وتتألف مناطق الكون المجاورة لنا - في معظمها - من فضاء فارغ، لا تقطعه إلا الشمس وكواكب وقطع الصخور التي نطلق عليها "الكويكبات". وإذا تطلعنا إلى العالم الخارجي، سوف نجد كونا فيه الكثرة المرئية متجمعة في مجرات تفصل بينها مسافات مروعة، وهذه المجرات نفسها، قد تجمعت في عناقيد مجرية. ومهم ما حاولنا، فالأرجح

(١) مذهب في الرسم يعتمد على التصوير بالنقاط الملونة. (المترجم)

(٢) مكس بالكتل. (المترجم)

أتنا لن نجد طريقة لنحصل بها على مشهد من الصخامة بقدر كاف من الخلق، تمكنا من رؤية بنية بسيطة وصقيلة للكون. ويبدو أنه من المستحيل أن نبعد إلى حد كاف عن لوحة (سورة).

ويجد العلماء أن مجموعة العوامل والظروف، التي سادت في تلك الحقبة، مزعجة ومثيرة للقلق. وإنني دائمًا مدرك بقدرة بتفضيل زملائي للرأى القائل، بتماثل الكون، ولكن حتى بدأت التخطيط لكتابه هذا المصنف، لم أعمل تفكيرى كثيراً في الأسباب التي أدى بهم إلى اعتقاد هذا الرأى، ولا أعتقد أن هذا الأمر مشابه لافتراض الذى جعل اليونانيين يفضلون فكرة أن الأرض مركز الكون. ويدرك العلماء - بكل تكيد - وجود عدم التجانس في الكون، إذ كان هناك، بل يتعاملون معه إذ لزم الأمر، وأعتقد أن ذلك ما يتمتعون، في قراره أنفسهم وجوده، وبأنه في مستوى ما، سوف يختفي عدم التجانس من الكون، تماماً كما اختفت النقاط الملونة في لوحة (سورة)، إذا ابتعدنا عنها بقدر كاف.

وجزء من السبب الذي أدى بالعلماء إلى الانخراط في ذلك الاتجاه، له أصول تاريخية. لقد تطورت الفيزياء وعلم الفلك، بدراسة المنظمات المتتجانسة، ولا ريب أن هذه الطريقة هي الأسهل في التعامل معها. وحتى عندما تعامل العلماء مع منظمات مكونة من وحدات متمايزة مثل المجرات والذرارات، فضلوا تجاهل الصعوبية التي تكتنف عدم التجانس، ومن ثم، ظاهروا بأن بنية الكون صقيلة وملساء، وهذه الطريقة في التعامل مع الطبيعة لها ميزة واحدة هائلة: أنها تؤتي ثمارها. وإذا لم تنجح في هذا، ما استطاع المهندسون ابتكار المحرك البخاري أو خط الأنابيب، قبل استكمال تطوير النظرية الذرية. ويمكننا عادة تجاهل حقيقة، أن المياه مكونة من ذرات، ونتعامل معها كما لو كانت وحدة متواالية، بحيث لا يمكن تمييز أي جزء منها عن الأجزاء المجاورة. وهذه الحقيقة محفورة في ذهن كل طالب أو طالبة علوم، منذ بدأنا تعليمها (أو تعليمها)، ولا عجب - حينئذ - بأننا طورنا في داخلنا شعوراً - على الرغم من أنه قد يكون

حنيناً للماضي - إلى الأيام التي كان فيها كل شيء صحيلاً وسلسًا ومريحاً، ومن ثم فإننا نظل نأمل أن يكون كوننا - في نهاية الأمر - متناغماً مع هذا الإطار المألف لنا. واستمر هذا التفضيل، بعد اكتشاف المجرات، وكان من الممكن دائمًا الاعتقاد، بأننا ما زلنا قريبين للغاية من المشهد الكوني. بيد أنه منذ السبعينيات من القرن العشرين، أصبح من الصعوبة - التي تتزايد عبر الأيام - أن نظل ننتمي بذلك الاعتقاد الذي لا يقدم على دليل منطقى أو مادى. إذ عندما نتطلع إلى الكون على مستويات ضخمة واسعة النطاق و شاملة، نفشل في مشاهدة منظومة كونية، تزداد بساطتها على مر الزمان. وفي حقيقة الأمر، إننا نرى كوناً، يبدو أنه يظل معتقداً، حتى في أضخم المستويات التي يمكننا رصدها. وأدى اكتشافان إلى الدفع بذلك الرأى - بقوة - إلى بذرة المجتمع العلمي: أولهما الاكتشاف الذي بدأ في العام ١٩٧٨، لسلسلة من العناقيد المجرية الفائقة المروعة، والثاني كان في العام ١٩٨١، باكتشاف الفراغات الكونية.

### **عنقيـدـ مجرـيـهـ وـعـنـقـيـدـ مجرـيـهـ فـائـقـهـ**

المحنا بالفعل فيما سبق، إلى إحدى أهم السمات البنوية للكون، وهي حقيقة أن المجرات ليست موزعة عشوائياً في الفضاء، لكنها تجتمع معًا لتكون ما أطلق عليه "العنقيـدـ مجرـيـهـ". وأول دراسة جادة لهذه العناقيد أجريها الراحل (جورج أبل)<sup>(١)</sup> بمعهد كاليفورنيا للتقنية، في العام ١٩٥٨. لقد عكف على دراسة ألواح فوتوجرافية التقطت في مرصد (مونت بالومار)، واستطاع التعرف على ٢٧١٢ تجمعاً للمجرات التي يطلق عليها الآن "عنقيـدـ أبلـ مجرـيـهـ". وهذه العناقيد هي تركيبات تشتمل على أعداد هائلة من المجرات، في تقاريب وثيقة من بعضها.

---

(١) فلكي وباحث في جامعة كاليفورنيا (١٩٢٧ - ١٩٨٣). (المترجم)

وتنتظم أكثر من نصف كل المجرات في الفضاء، في عناقيد متباعدة الأحجام.  
ومجرة الطريق اللبناني، هي جزء مما يطلق عليه الفلكيون "المجموعة المحلية".

وهذا العنقود المجري تحديداً يتكون من الطريق اللبناني ومجرة "أندروميدا" (المرأة المسلسلة). وهما مجرتان هائلتان تؤديان دور مرساتين تجاذبتيين، بالإضافة إلى عشرين مجرة أخرى صغيرة - على الأقل - تجر معهما. ويقدر العلماء هذا التجمع كله، بنحو ثلاثة ملايين سنة ضوئية، من جانب إلى آخر. ويمقارنه العناقيد المجرية الأخرى، لا يعد هذا الرقم لافتاً للنظر، إذ إن بعض العناقيد الضخمة تحتوي على آلاف عديدة من المجرات.

## اكتشاف بنية كونية ذات أبعاد مروعة

إن القصة التي سوف أحييها في هذا الجزء، يمكن تلخيصها بطريقة بالغة البساطة: تقريباً كل المادة المضيئة في الكون - أي المادة التي يمكننا رؤيتها<sup>(١)</sup> - تكمن في العناقيد المجرية الفائقة. وتلك العناقيد المجرية الفائقة، مثل أوتار بالغة الطول تنتظم فيها مجموعات المجرات، وكأنها حبات من اللؤلؤ تصفط في عقد، وقد أطلق اصطلاح "الفراغات" على المسافات المروعة، بين هذه العناقيد المجرية الفائقة، وتخلو تلك الفراغات - نسبياً - من المادة المضيئة، كما سوف نرى ونشيّك.

وقد بدأ الاعتقاد باحتمال وجود العناقيد المجرية الفائقة، بالعمل الذي قام به (جورج آبل) والمذكور آنفًا. وعلى الرغم من أنها لم تكن مجال بحث أساسي، فقد شهدت الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين، تدفقاً وطيداً من المحاولات لاستخدام أسلوب ما، مثل تقنية (آبل)، لاستنباط البنية ذات المقاييس المروعة للكون. وفي

---

(١) المادة المرئية هي تلك المادة التي يبعث منها الضوء أو الإشعاع الكهرومغناطيسي. (المترجم)

العام ١٩٦٧، نشر (بونالد شين) و(كارل ورتانن) من مرصد (ليك) في كاليفورنيا، فهرساً مفصلاً يتضمن موقع مليون مجرة في السماء، وكان هذا - حتى ذلك الوقت - مسحًا شاملًا لم يسبق له مثيل. وكان العالمان يذبيان عمليهما المضني كليّة بالعين المجردة، وقد تمكنا من تفحص وتحليل آلاف من الألواح الفوتوغرافية، وسجلوا مواضع المجرات فوقها.

هب أنت كلفت بمهمة تفحص وتحليل خريطة شارع لكل مدينة كبيرة في الولايات المتحدة، وطلب منك تسجيل أماكن كل التقاطعات الرئيسية بها. سوف تكون مهمتك الشاقة، متماثلة مع تلك التي أنجزها (شين) و(ورتانن).

ولا عجب أنهما استغرقا اثنى عشر عاماً لإتمام هذه المهمة البالغة الصعوبة! ووفقاً للمعتقدات والأفكار المتعارف عليها في علم الفلك، قاما بتطوير كل الطرق الممكنة لينجزا مهمتهما في إحصاء المجرات، في غمرة المهام الشاقة الأخرى. وكان (ورتانن) - باعتباره مدير مختبر - بمقدوره أن يكون قادرًا على العمل في تفحص وتحليل أحد الألواح الفوتوغرافية، بينما يجري محادثات هاتفية طويلة حتى السأم والملل، مع مدربين ينعمون بمكاتب أنيقة فاخرة!

وياستخدام المسح الذي قام به (شين) و(ورتانن)، تمكنا (ب.ج.أ. جيم بيبلز) ومعاونوه في جامعة (برنستون) من تجميع خريطة كاملة للكون بأسره. وكان هذا أول تصور ذهني شامل للكون، ومن ثم، فقد حازت تلك الخريطة على شعبية واسعة ورواجاً كبيراً. وظهرت في كل أنواع الكتب الدراسية وفي لوحات ضخمة ملونة، وعلقت في معظم الأقسام الفاكهة بالولايات المتحدة، بل لقد تم تسويقها لتزيين داخل وعاء للحساء؛ والرأي عندنا، أن الأمر البالغ التأثير في الخريطة، الاعتقاد بأنها تظهر - بشكل أخاذ للغاية - البنية الخيطية والشبيهة بالنسيج المشبك للكون.

بيد أن المظاهر قد يخدع. فعندما نشرت لأول مرة خريطة (بيبلز) الكاملة عن الكون، كانت هناك مناقشات ومجادلات عديدة، عن كيفية شرحها وتفسيرها، ما دامت

الألواح الفوتografية، التي كانت مصدراً لها، تشتمل على صور للسماء ذات بعدين فقط، إذن فليس هناك خصمانة بأن تلك المجرات التي تبدو منتظمة على طول خط رفيع ملفوف، هي في حقيقة الأمر، ترتبط مع بعضها. وربما كانت مواضعها لا تدعوا أن تكون على طول نفس خط الرؤية<sup>(١)</sup> من كوكب الأرض، ومن ثم، فهي - على غير ما هو مفترض في الخريطة - غير مرتبطة ببعضها.

وثمة حقيقة أخرى يجب التنويه عنها حول "خريطة المليون مجرة"، إنها تتفقيفية بشكل واضح ومحددة، وتمس طبقة رقيقة ملساء، من العقل البشري. لا تلقى إلا القليل من التقدير والامتنان، إن بصيرتنا وعقولنا - متألقة بمهارة وبراعة - لرؤية نماذج في بيئتنا. وبالنسبة لأسلافنا الأوائل، الرئيسيات<sup>(٢)</sup>، كان هذا النوع من المهارة، أساسياً لا غنى عنه لأداء بعض المهام اليومية، مثل البحث عن الفاكهة الصالحة للأكل، بين الأوراق المتشابكة للنباتات.

ولقد حملنا هذا الإرث معنا، في القدرة الرائعة للعقل البشري، المتمثلة في تتبع واكتشاف النماذج في البيئة. ولم يبتكر حاسوب حتى الآن يماثل قدرة طفل في الثالثة من عمره، عندما يتعلق الأمر برؤية النماذج في بيئتنا. بأذهاننا إبّننا في الواقع، لدينا قدرة رائعة لإدراك النماذج، تلك التي نراها عادة بأذهاننا وحتى لو لم تكن هناك!


فكرة في اختبار (رودشاخ)، الذي طوره علماء النفس ليعاونهم في دراساتهم المتعلقة بالشخصية الإنسانية، ويكون هذا الاختبار من سلسلة من البطاقات الصغيرة، تظهر عليها بقع غير منتظمة من الحبر. وليس هناك نموذج جوهري في البقع، ولكنك إذا نظرت إليها، فسوف ترى أشياء متباعدة. فعقل كل شخص يفرض بشكل إلزامي، نماذجه الخاصة به على تلك البقع، وهذا ما يعطي الطبيب النفسي رؤية ثاقبة للطريقة التي يعمل بها العقل. وعوده إلى خريطة المجرات، لكي نتساءل ما الذي نستفيد منه

(١) خط وهمي من العين إلى الشيء المدرك بواسطة الحواس. (المترجم)

(٢) شبكات الإنسان. (المترجم)

هذا النموذج الكوني، الذي يشبه النسيج المشبك؟ هل هو - في الحقيقة - موجود هناك في السماء، أم أن الكون قدّم لنا اختبار (بورشاخ) ولكن على مدى بالغ الصخامة؟

وهذا ليس سؤالاً فلسفياً مجرداً، ويمكن بالفعل الإجابة عنه بتطبيق بعض الإحصائيات شديدة البساطة، والمخطط مرسوم في (الشكل ٥-١) (إلى اليسار). ركز انتباحك على مجرة واحدة، مثل تلك التي معنونة أ ثم إحصِ كم عدد المجرات التي توجد على بعد أقل من المسافة  $r$ ، بعيداً عن  $\alpha$ . وفي الشكل، هناك أربع من هذه المجرات. ويمكنك أن تكرر ذلك الإحصاء لقيم متباينة للمسافة  $r$ ، ملقينا بشبكتك إلى مدى أرحب، بينما تتسع في إجراء هذا الإحصاء. وتمثل هذه العملية بالدوائر المتعددة المركز الموجودة في الشكل. وعندما تفرغ من تلك العملية للمجرة  $\alpha$ ، حول اهتمامك إلى مجرة أخرى، مثل المعنونة بـ  $\beta$ ، وكرر نفس الأداء. ولن تنتهي من هذه المهمة، حتى تعمل ذلك، لكل مجرة في المجموعة.



الارتباط  
الذاتي



المسافة

الشكل 5.1

وعندما تنتهي المهمة (لا حاجة بنا للقول، بأنها تؤدي بواسطة الحاسوب)، يكون لديك، ما يطلق عليه علماء الرياضيات، وظيفة الارتباط<sup>(١)</sup> الذاتي. إنها تخبرك عن مدى احتمالية وجود مجرتين، ضمن مسافة معينة، تحدد بعد كل منها عن الأخرى. ومن هذه الاحتمالية يمكن أن تفسر وتشرح أهمية خريطة المجرات كما يلى: إذا كانت الاحتمالية كبيرة بالنسبة للقيم الصغيرة لـ  $r$ ، فهذا يعني أن المجرات - على الأرجح - تربض بالقرب من بعضها، ويكون هذا دليلاً على حدوث التجمع في شكل عناقيد مجرية.

أما إذا لم تكن هناك قيمة معينة لـ  $r$ ، تكون لها احتمالية كبيرة وذات دلالة، أكثر من أي مجرة أخرى، يكون معنى ذلك أن المجرات سوف تتبعثر - بشكل أو آخر - عشوائياً عبر الفضاء، ومن ثم لن تتكون العناقيد المجرية.

ويرسم بيانياً (شكل ١-٥) (إلى اليمين) وظيفة الارتباط الذاتي، لمخطط (شين - ورتانن). ويوضح هذا الرسم بجلاء الآثار المترتبة على تكوين العناقيد المجرية، إنها الأكبر بالنسبة للقيم الصغيرة لـ  $r$ . ما دام هذا الاختيار مستقلاً عن المدارات الحسية وقبل أن تستطرد في البحث، يجب أن أشير إلى معركة كبرى اندلعت مؤخراً، حول جانب آخر من مسح (شين - ورتانن) للمجرات. وكانت الناقدة الرئيسية هي (مارجريت جيلر) من مركز (هارفارد - سيمثونيان) للفيزياء الفلكية، وتركزت مجادلاتها على الحقيقة التي مفادها أنه عندما قام (شين) و(ورتانن) بإجراء مسحهما للمجرات، قسما السماء إلى مربعات ثم وزعا هذه المربعات، بحيث يقوم كل منها بتحصص عدد منها. ووجهة نظر (مارجريت جيلر) تنحصر في أنه إذا كان لدى أحد الباحثين معايير مختلفة عن الآخر، فيما يتعلق بتفسير وشرح الألوان الفوتوفغرافية (فعلى سبيل المثال، قد

---


(١) قياس مدى تشابه متغيرين عشوائيين. (المترجم)

يتقبل أحدهما بقعة ضبابية معينة على أنها مجرة، بينما لا يتقبلها الباحث الآخر)، وسوف تكون النتيجة وجود نموذج من النقاط الفاتحة والداكنة فوق خريطة المجرات. ومثل هذا النموذج يمكنه بسهولة أن يظهر - على غير الحقيقة - أن بنية الكون خيطية.

وقد لجأ المدافعون عن خريطة المجرات، ومن أبرزهم (ب. ج. أ. بيبيلن)، إلى الرد على المعارضين بسلسلة من الحسابات المعقدة والتقنية إلى حد ما، ومن ثم بدا أن السؤال كل، غرق في لجة من الإحصائيات والرياضيات التي لا يهتم بها سوى الخبراء، وقد ذكرت الصراع فقط للتاكيد على مدى الصعوبة التي تكتنف التوصل إلى إجابة نهائية للسؤال، الذي يتعلق بالبنية الكونية ذات المقاييس الرووع، باستخدام التقنيات الفوتوجرافية العادية، لعلم الفلك التقليدي. ويجب الاحتفاظ بهذا الأمر جيداً في ذهنك، حتى تقوم - فيما بعد في هذا الفصل - بتقديم فكرة مسح "الإزاحة نحو الأحمر".

وكما سوف نرى وشيئاً، فإن مثل تلك المسوحات، تزودنا بمقاييس أكثر وثوقية، عن الطريقة التي تجمع بها المجرات في السماء، وثمة عدد كبير من مسوحات الإزاحة نحو الأحمر الرئيسية، أجريت منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين اكتشفت عشرات من بني طولية شبيهة بالأوتار، أطلق عليها "العنقود المجري الفائق". وكان أكبر هذه الامتدادات، يمر عبر الكوكبين (الجبار) و(الفرس الأعظم)، وهاتان الكوكبتان تتميزان بالجلاء والوضوح في السماء ليلاً، خلال فصل الخريف وبداية فصل الشتاء. وهذا العنقود المجري الفائق، هو أضخم بنية معروفة في الكون. وفي الرسم بالشكل ٥-٢، نظهر مخططاً لهذا العنقود المجري الفائق، معتمدين على نموذج أبدعه (دافيد باتوسكي)، عندما كان يعمل في جامعة (أريزونا). ويكون هذا النموذج من ثلاثة وأربعين عنقوداً مجرياً، تنتظم معًا على خطين رفيعين ملفوفين ومتشعبين، ويحيط بهذين الخطين ذاتهما، مساحات هائلة فارغة، وهي التي نطلق عليها "الفراغات".

والرأي عندي أن أكثر الأشياء إثارة في (الشكل ٥-٢)، ليست البنية الدقيقة للعنقود المجري الفائق، ولكن الحجم النحيل والرقيق له، إنه يمتد لمسافة تبلغ بليون سنة ضوئية عبر السماء، وهذا جزء يمكن تقديره وقياسه واستيعابه، من الحجم الكلى للكون، وحيث إننا قد وجدنا بالفعل بنى بهذه الصخامة المروعة، فإن الأمر يبيّن لي، أنه تنبؤ قوى، بأن الكون متكل وخيطي، حتى آخر الحدود التي يمكن أن تصل إليها أرصادنا. ولا أرى إلا أملاً ضئيلاً، بأن التجانس سوف يوجد فجأة، عند قياسات مروعة تزيد على بليون سنة ضوئية.



الشكل 5.2

وأتسائل: هل العنقود المجري الفائق بكوكبه الجبار وكوكبه الفرس الأعظم، أضخم بنية في الكون؟ بالتأكيد هو الأضخم حسب إمكانيات أرصادنا حتى الوقت الحاضر، ولكن على المرء أن يتذكر بأن كل المسوحات التي أجريت حتى الآن، قد اكتشفت أقل من واحد بالمائة من حجم الكون، في نطاق بليون سنة ضوئية بعدً من كوكب الأرض، ويعني آخر، أقل من واحد بالمائة من حجم الكون الكلى الذي يمكن رصده، وسوف يكون من المذهل، أننا - في حداثة مسوحاتنا المنهاجية للسماء - تعثرنا على الفور بأضخم بنية في الكون، وحتى النجاح بالصادفة يجب أن تكون له حدود، وهذا يعني أننا نتوقع إيجاد بنى كونية أضخم، مع تعمق وتتوسيع أبحاثنا المستقبلية.

## الفراغات

الفراغات هي تماماً ما يوحى به اسمها: مناطق هائلة من الفضاء، حيث لا توجد مجرات على الإطلاق أو يوجد قدر ضئيل منها. والفراغات ذات أبعاد مروعة، تصل أحياناً إلى مائتين وخمسين مليون سنة ضوئية، عرضاً، وتحت الظروف العادية، يتوقع المرء أن يجد أكثر من عشرة آلاف مجرة تقريباً، في مثل هذا الحجم. ومن ثم، فإن غياب هذه المجرات، أمر مثير للدهشة. وفي الواقع، فإن الدهشة الأكبر عن الفراغات، ليست في كيفية وجودها، بل السؤال الذي يتadarل لذهن، عن كيف أن وجودها استطاع مراؤحة المجتمع الفلكي حتى عام ١٩٨١، عندما أعلن عن اكتشاف أول فراغ، في كوكبة "العقاء"<sup>(١)</sup> (راعي الماشية).


والإجابة عن هذه الأحجية، لها علاقة بالحقيقة الأساسية عن الطريقة التي يرصد بها الكون، فعندما تلتقط صورة للسماء أثناء الليل، من خلال تلسكوب، فإن ما نراه مشهداً ذا بعدين، ويظهر كل نجم ومجرة مثل نقطة مضيئة في الصورة، ناهيك عن بعدها. وكل ما يهم هو كمية الضوء التي تسقط فوق الصورة السلبية للفيلم<sup>(٢)</sup>.

وسوف يمكنك أن تفهم بيسراً، مدى أهمية الوصف ذي البعدين لأرصادنا، إذا أخذت بعين الاعتبار الموقف الموضع في (الشكل ٥-٢). هب أن هناك مجموعتين من الأضواء في مكان ما، على سطح الأرض، وتفصل بين هاتين المجموعتين مسافة تقدر بعدها ياردات<sup>(٣)</sup>. وافتراض أنك تقف على مسافة ما، من تلك الأضواء ومعك كاميرا. فما الذي سوف تظهره الصورة الملتقطة؟

(١) كوكبة "العقاء" في نصف الكرة الشمالي على بعد نحو خمس وثلاثين سنة ضوئية من الأرض. (المترجم)

(٢) دعني أضيف أنه على الرغم من استخدام مفردات ومصطلحات التصوير الضوئي، لكنني أجعل الشرح أبسط في تفهمه، إذ إن معظم أرصاد التلسكوبات الرئيسية في هذه الأيام، لا تستخدم الصور الفوتوغرافية. وبدلاً من ذلك، فإنها تستخدم - منذ زمن طويول - منظومات إلكترونية شبيهة بكاميرات التلفاز. وهذا التباين التقني، لا يغير من جوهر المفاسدة. (المؤلف)

(٣) الياردة تساوى واحد وتسعين سنتيمتراً. (المترجم)



الشكل 5.3

من الواضح، أنك سترى شيئاً يشبه ما هو مبين على يمين الصورة الإيضاخية. سوف يتداخل السطحان المستويان التي يشع عليهما الضوء، ومن ثم سوف ترى عرضاً وحيداً متسقاً، للضوئين في الصورة. ولن تكون هناك أية إشارة - أياً كانت - لوجود فجوة بين السطحين المستويين، فإن الكاميرا سوف توحدهما عندما تلتقط الصورة. والطريقة الوحيدة لاكتشاف مثل هذه الفجوة، بالحصول على بعض المعلومات عن البعد الثالث - أي المسافة بين مجموعتي الضوء والكاميرا - في حالة الأضواء التي على سطح الأرض، فإن مثل هذه المعلومات قد يكون الحصول عليها صعباً، بيد أنه في حالة المجرات، فالامر ليس كذلك.

في الفصل الثاني، رأينا أنه في تمدد للكون، كلما زاد بعد مجرة عنا، تزداد سرعة تراجعها، وتصبح الإزاحة نحو الأحمر - التي تتلقاها منها - أكبر.

وبالتالي، فإن ظاهرة "الإزاحة نحو الأحمر" تزودنا بوسيلة تمكنا من تقدير المسافة إلى المجرة، أي البعد الثالث في مثال الأضواء، معنى ذلك أن هناك طريقة للحصول على صورة كاملة ثلاثية الأبعاد للكون بأسره، ومن ثم يمكننا تحديد - بشكل قاطع وحاسم - طبيعة البنية الكونية ذات القياس المروع.

ولسوء الحظ، فب بينما أن ذلك الاستدلال صحيح من حيث المبدأ، فإنه من الناحية العملية، لا تكون الأمور بهذه البساطة الشديدة، ولكن نحصل على الصورة المألفة للكون، ذات البعدين، كل ما نحتاج إليه أن نوجه تليسكوبياً إلى اتجاه معين، ومستحلباً فوتوفراقياً لإظهار الصورة. ومن ناحية أخرى، إذا أردنا الحصول على صورة ذات ثلاثة أبعاد، فإن علينا - بطريقة ما - أن نرصد كل واحدة من مئات (وحتى آلاف) المجرات، وذلك حتى نتوصل إلى تحديد دقيق لقيمة الإزاحة نحو الأحمر الخاصة بها، ثم تتبع ذلك بوضع كل ملاحظاتنا معاً، بمساعدة حاسوب. عندئذ فقط، يمكننا أن نحصل على الصورة النهائية. ويطلق على جمع البيانات بهذه الطريقة، مسح الإزاحة نحو الأحمر. وليس هذا عملاً بسيطاً ينجذب في وقت قصير. إنه يتطلب شهوداً وحتى سنوات من الجهد الشاق، يقوم به فريق من الخبراء المتخصصين والمتقانين في العمل.

وعندئذ، كانت مفاجئتنا المبكرة، أن اكتشاف البنية الكونية ذات القياس المروع، باستخدام مسوحات الإزاحة نحو الأحمر - التي لم يتم حتى عام ١٩٨١ - كان غير مبرر، وهذه الحقيقة - في الواقع الأمر - لم تكن مثيرة للدهشة على الإطلاق. إن إجراء مسوحات الإزاحة نحو الأحمر، تتضمن عملاً شاقاً للغاية، خاصة أنها تجري على الكون بأسره. وكان فريق الفلكيين من جامعة (ميتشجان)، الذي أعلن نتيجة مسح المجرات في كوكبة (العقاو) فضل تحقيق نتائج مذهلة لم يسبق لها مثيل، بإجراء مسح مفصل للغاية، لمنطقة صغيرة جداً، بدلاً من خريطة شاملة للسماء كلها، وأسفر عملهم عن اكتشاف أكبر فراغ في الكون.

ويقدر عرض "الفقاعة" في كوكبة (العقاو) بنحو مائتين وخمسين مليون سنة ضوئية، وبينما أنها لا تشتمل على مجرات عاديّة من أي نوع. ربما كانت تحتوي على عدة مجرات قزمة، ولكن هذا لا يلقى اهتماماً بين العلماء.

إن متوسط المسافة بين المجرات في مكان آخر من الكون، تبلغ عدة ملايين من السنوات الضوئية، ومن ثم، فإن وجود عدد قليل للغاية من المجرات، في مساحة بالفضاء بهذه الصخامة، أمر يثير الدهشة فعلاً.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، بدأ الفلكيون في الإشارة إلى الفراغات - بشكل غير رسمي - على أنها "فسيقيع (هابل)". إننى أحب هذا التعبير، إذ إنه يحتفظ بالروح الحرية لعلم الفلك الحديث، بالإضافة إلى تكريم الرجل الذى كان لعمله الفضل فى البدء بكل شيء (علم الرغم - لاكون أميناً - غير واثق من أن هابل كان سيقدر شرفًا يمنع إليه بهذا الشكل).


أحدث الإعلان عن فراغات كوكبة (العواء)، اهتماجاً في الصحافة العلمية، ولكنه لم يؤثر بطريقة فعالة على الفلكيين، لأنه من صفات العلماء، الإدراك بأن العامة غير واعية تماماً بالأمور العلمية، وعادة يستقبل العلماء المستحدثات دون حماس، إذ إن اكتشافاً مفرداً، يمكن دائماً أن يكون رمية من غير رام ومجرد ضربة حظ. ومن ثم فإنه - عادة - يكون من الأفضل تجاهله، على الأقل حتى تثبت صحته بتجربة مستقلة.

وفيما يتعلق بالفراغ في كوكبة (العقاء)، فإن وجوده يمكن أن ينبع دائمًا إلى محس الصدفة. ومع ذلك، فإذا كانت المجرات تنتشر عشوائياً في الفضاء، فإنه يلزم وجود عدد قليل من المناطق الفارغة، تماماً مثل وجود مساحات فارغة - أحياناً - في حشد كبير من الناس متجمعين في ساعة أو مركز تسوق مفتوح. وأدركت ذلك عندما سمعت عن الفراغ في كوكبة (العقاء)، وقلت في نفسي "يا إلهي، إن هذا أمر مثير"، واستمررت في عملي. لقد قاسيت من قبل مرات عديدة، بالظواهر الطبيعية التي حدثت مرة أو مرتين، ثم لم يسمع عنها بعد ذلك قط. ولهذا لم أشأ أن أقع في هذا الشرك من جديد.

بيد أنه فى خريف عام ١٩٨٥، حدث أمر جلل، إذ قام فريق من الفلكيين فى مركز هارفارد - سميثسونيان) للفيزياء الفلكية فى كامبريدج بولاية ماساشوستس، بالإعلان عن نتيجة مسحهم للإزاحة نحو الأحمر. لقد حققوا إنجازاً متميزاً، فى اتجاه مخالف تماماً عن فريق علماء ميشجان، لكنهم توصلوا إلى نفس الاكتشاف، أن الكون كان مليئاً بالفجائع الهائلة. وبهذا الإعلان المثير، انضمت فرقاً عظيم هابيل إلى ثانياً علم

الكون، إنه يمكنك تجاهل واحدة من تلك الفوقيع باعتبارها صدفة إحصائية محتملة، ولكن لا يمكن اعتبارها كلها محض صدفة أن مسحين للإزاحة نحو الأحمر في أعمق الفضاء، وفي اتجاهات متباينة، استطاع كل منها أن يكتشف فراغات، فكيف يحدث هذا، إذا كانت الفراغات بالفعل نادرة في الكون.

لقد استمتعت بصفة خاصة، بحقيقة أن خريطة مسح كامبريدج، مصوحة في الأنماذج المخططة في (شكل ٤-٥). هل يمكنك أن ترى شخصاً داخلاً؟



الشكل 5.4

إن قليلاً من التشبيه بالإنسان، لا يسبب أى عيب على الإطلاق في الخريطة، يقع كوكب الأرض عند الحافة المستديقة للوت، وتزداد المسافة من الأرض، كلما تحركنا بعيداً عن الحافة، في اتجاه الجزء الأوسع انتشاراً. وفي الواقع، فإن الوت مجرد شريحة، في قطاع من الكون، وكل نقطة في المخطط، تمثل مجرة تم تحديد موقعها، باستخدام تقنيات الثلاثة أبعاد، والتي شرحت آنفًا. خلال الفترة التي تلت نشر هذه النتيجة، أجرى عدد من مسوحات الإزاحة نحو الأحمر، وبيدو أن كلها أظهرت دليلاً على وجود الفراغات.

## الكون الإسفنجي

إن صورة الكون التي تكتشف من هذه الدراسات، تتسم بالإثارة والغرابة. فالمجرات ليست متباشرة بانتظام عبر الكون، كما أنها أيضاً ليست مبعثرة بعشوانية. ويدلاً من ذلك، فإن مقطعاً عرضياً للكون، يشبه ما تحصل عليه إذا قطعت كتلة من الإسفنج إلى شرائح. سوف تكون المادة الجامدة منتظمة في ترابط مع شبكة خيطية، تتوزع مع فوقيع ضخمة، حيث لا توجد مادة، أو يكون منها كمية ضئيلة للغاية. وكل محاولة تهدف لتفسير بنية الكون، يجب أن تجاهله هذه الرؤية الجديدة، للطريقة التي تنتظم بها المادة في الكون. وكيفية وصولها إلى تلك البقع؟

وفي الفصل السابق، ناقشتنا بعض المشاكل التي يواجهها الباحث، أثناء محاولته تفسير الطريقة التي تتكلل بها المادة في القياسات الضخمة. وأدى اكتشاف وجود الفراغات إلى أن تصيب المشكلة أكثر صعوبة. ثمة نوعان عامان من الإجابات، لهذه النوعية من الأسئلة: تلك التي تتعلق بالأحداث التي وقعت في وقت متأخر للغاية من تاريخ الكون، وتلك التي تتضمن بقاء البنى التي تشكلت خلال الجزء الأول من الثانية بعد خلق الكون. وفي الأساس، فإن النوع الأول من الإجابات، سوف يقرر بأن المجرات قد تشكلت أولاً ثم أزيخت فيما بعد من بعض المناطق بالكون، تاركة وراءها الفوقيع. أما النوع الثاني من الإجابات، سوف تعلن أن المجرات تشكلت على حدود الفراغات، حيث يمكننا رصدها، ولسيب ما لم تتشكل داخل الفراغات ذاتها.

و قبل أن نستطرد في المناقشة، أود أن أطرح عدة تحذيرات. إن فوقيع (هابل) موضوع رئيسي جديد للغاية (ومثير أيضاً) في علم الكون. والأراء عنها تتطاير هنا وهناك في جو مسبب للدوار ومزعج للتفكير، مما يحول لتخوم العلم. وهذا يعني أن شخصاً ما سوف يفكر في شيء ما، ربما يجد تفسيراً، ويقوم بنشره، ثم يأتي شخص آخر ليظهر بأن هذا الرأي له نتائج ليست في الحسبان، والتي لا يمكنها التوافق مع الأرصاد. إذن لابد من إيجاد أفكار أخرى تتضمنها نظريات جديدة، وربما يكون هذا

أمرًا معتادًا، أما عندما يحدث هذا في العلم، فإن بعض الناس يجدون أنه من الصعب تقبّله. ويبعدو أنهم يعتقدون بأنه ما أن تنشر النظرية، حتى تكتسب نوعاً من الحقيقة الخالدة. وفي واقع الأمر، فإن أي نظرية، ليست إلا تخميناً مبنياً على الحدس، عن الطريقة التي تتصرف بها الطبيعة، ولن يتقبلها العلماء، إلا إذا أمكن تطبيقها بعد أن تكون قد اختبرت بدقة. وكثير من الأفكار الموجة، التي صدّمت الصحافة، سرعان ما ثبت فشلها، والناس بطبيعتهم يصيّبهم أحياناً قليلاً من الارتباك والحيرة، أين - على سبيل المثال - فكرة "الأكوان الموازية" التي نادى بها البعض في الماضي<sup>(١)</sup>؟

وبينما أكتب هذا، أصبحت الآراء التي نوقشت لاحقاً، في بُؤرة اهتمام المجتمع الذي يضم علماء الكون، وفي الوقت الذي تقرأ فيه كلماتي، ربما يكونون قد عادوا لاعتناق نظرية الأكوان الموازية. ومن ثم، فعليك أن تعتبرها ليست أكثر من أمثلة للنظريات التي تم اختبارها. ومما لا ريب فيه، أنها لا تقدم الإجابات النهائية لمشكلة الفراغات والبنية ذات القياسات المروعة. ومن وجهة ما، فإنها ليست أمرًا يثير الدهشة البالغة، إذا علمنا أن الكون يشبه الجن السويسري<sup>(٢)</sup>. إنك لا تستطيع أن تكون كومة من التراب، دون أن تحفر حفرة في الأرض، وقياساً على هذا، إذا أردت الحصول على مناطق في الكون، يمكن لل مجرات فيها أن تت الكل في شكل عنقود مجرى، فإن عليك أن تتوقع وجود مناطق ليس فيها إلا عدد قليل جداً من المجرات.

وفي وقت سابق، اقترح فريق من علماء الفيزياء الكونية في جامعة (برنستون) تفسيراً فيزيائياً معقولاً للغاية، عن الفراغات. وكان من رأيهما، أنه بعد أن تشكّلت

(١) إن هذا ينطبق على فكرة انبثقت عن نظريات التوحيد العظمى في بداية الثمانينيات من القرن العشرين، وعندما تمت إعادة النظر في صيغ هذه النظريات، بدت كأنها تتباين بأن الكون يتشكل من رغوة من أكوان كاملة ذاتياً مثل كوننا. وللأسف - وبعد أن نشرت في مجلة "تايم" الأمريكية ومنتشرات أخرى - اندثرت ولم يعد لها وجود. (المؤلف)

(٢) نظرية تصور الكون على أنه مثل الجن السويسري، يمتلك بالفراغات بجانب المادة. (المترجم)

الجرات، وقع انفجار مروع، ذو طبيعة معينة، في منطقة من الفضاء، واختلفت وجهة نظر كل باحث عن الآخر، فيما يتعلق بالطبيعة الدقيقة للانفجار وكذلك الأسباب التي أدت إلى حدوثه. ومع ذلك، في بعض النظر عن مصدره، فإن الانفجار يمكن - بسهولة - أن يسبب موجة صدمية مروعة، تندفع عبر منطقة من الفضاء، وتندفع أمامها إلى الخارج، أي مادة كانت توجد في المنطقة وتنتج ذلك النوع من جدران الفقاعة الموضحة في (الشكل ٤-٥).

ولا شك أن هذه فكرة مثيرة للاهتمام، وهي بالتأكيد تزودنا بحل بديهي وقابل للتصديق عن المشكلة. وتبليو الفقاقب بالفعل، مثل ما قد ينتج من سلسلة من الانفجارات في وسط متناسق بشكل أو آخر. ولسوء الحظ، فإنه إذا وجدت آلية لإنتاج مثل هذه الانفجارات الهائلة، سوف يكون هناك تضارب مع قياس الإشعاع الكوني الخلفي للموجات الدقيقة (انظر الفصل الثالث).

إن انفجاراً مروعًا، يمكن اعتباره وقدراً مشتعلًا في حد ذاته، ومن ثم، فإن علينا أن نتوقع رؤية الإشعاع ينبعث من الانفجار بعد أن يخمد، تماماً كما نرى الإشعاع الكوني الخلفي للموجات الدقيقة، الذي تنتج عن الانفجار الأعظم. وتدل الحسابات والإحصاءات، بأن أي انفجار يكون من القوة، بحيث ينتج فقاعة (هابل)، يكون قادرًا أيضاً على بث كمية كافية من الإشعاع، ليحرف الإشعاع الكوني الخلفي للموجات الدقيقة. ما دام مثل هذا الانحراف لم يرصد حتى الآن، فإن المناقشات ما زالت مستمرة، ويمكننا أن نقرر أن الانفجارات لا يمكنها أن تحدث الفقاعات.

وعلى نقيض هذه المناقشة، يشير المدافعون عن فرضية الانفجار، إلى أن الفقاعة لا تحتاج أن تنتج كاملة مرة واحدة. إذ قد تنشأ من التحام العديد من الفقاعات الأصغر، مثل رغوة الصابون في حمامك، أو في قدح الجعة (أو الشمبانيا بالطبع)، أو البالونات التي تنفسها لأولادك. وإذا كانت هذه المناقشة سوف تظل معلقة حتى يتم التتحقق منها بالرصد والمشاهدة، فإن فكرة الانفجار، مثال جيد، لتفسير وجود الفراغات، التي تعزو إلى حدث كوني ما، وقع بعد أن تشكلت الجرات بالفعل.

وعلى خلاف ذلك، تبدأ النظريات الأخرى من الأطروحة بأن الفراغات والعناقيد المجرية الفائقة، نشأت عن أحداث كونية نشطة منذ زمن طويل، قبل أن تكتل المجرات من الغاز الأولى بالكون. وتفترض هذه النظريات بأن تركيزات الكتلة حول الواقع التي تشكلت فيها المجرات، لم تكن موزعة على نسق واحد، ولكنها ظهرت - منذ البداية - بنية الجين السويسري، التي نراها في مسوحاتنا للسماء، ووفقاً لهذا الافتراض، تتشكل المجرات في الوضع الطبيعي، حول حواف الفوقيع، وسوف تستقر هناك.

وعلى سبيل المثال، ثمة نوع من النظريات التي تلقى قبولاً معيناً، تتضمن شيئاً يطلق عليه "وتر كوني" (انظر الفصل الثاني عشر). والوتر الكوني، يمتد طويلاً للغاية، وكثافة بنيته مروعة، وقد تشكل في ١٠-٢٥ من الثانية بعد الانفجار الأعظم، ويمكنه - بسهولة - أن يكون مركزاً لتركيز مادة المجرات. وإذا كان الكون يمتليء بهذه الأوتار، فإن المجرات إذن، سوف تتشكل بمحاذاتها، مكونة من العناقيد المجرية الفائقة. وفي مثل هذا الأنماذج، سوف تكون الفراغات هي المسافات بين هذه الأوتار الكونية المجنولة. بيد أن هذا كله مجرد تأملات وتصورات ذهنية. إن الأمر الذي أصبح واضحاً، أن تفسير الفراغات والبنية ذات القياس المروع في الكون، ستكون مهمة بالغة الصعوبة للباحثين في علم الكون.

## الفصل السادس

### المادة المظلمة أقل مما تراه العين

كل التجارب الحديثة تمثل إلى بعض النظريات الأقدم.

(جول فيرن)

رواية "رحلة إلى مركز الأرض"

وهكذا لا نستطيع أن نفسر لماذا يكتتل الكون في مجرات، كما لا يمكننا أيضاً أن نوضح لأى سبب توجد هذه المجرات في فراغات وعناقيد مجرية فائقة. ويبدو أن آخر شيء سوف نحتاجه في تلك المرحلة، هو لغز آخر. ومع هذا، فإن أي شخص مارس لعبه أحجية الصور المقطوعة، يعرف أن إضافة جزء إضافي من الصورة، يمكن من رؤية النموذج بكامله، وهذا النموذج يظل يراوغنا حتى يتتوفر آخر جزء. إن اكتشاف ما أصبح يطلق عليه "المادة المظلمة" يؤدى نفس هذا الدور تماماً، في أحجية الكون.

إن السبب في هذا الخضم من الأمور والظروف الغامضة الكونية، بسيط: إننا حتى هذه النقطة ناقشنا مشكلة تفسير الكون، في ظل الافتراض الذى مفاده، أننا نتعامل فقط مع مادة مرئية. تلك المادة التى نراها عندما ننظر خلال تلسكوب بصري،

أو على الأقل ندركها عن طريق الحواس خاصة الرؤية والسمع كما في حالة التليسكوبات الراديوية والأجهزة الأخرى الحساسة لأطوال الموجات، خارج نطاق استجابات أعيننا. لو أن كثيراً من المادة في الكون - كما - سوف نناقش لاحقاً - ليست في هذه الحالة المألوفة لنا. من ثم، يجب إعادة النظر في "المدى الزمني" و"تشغيل البداءيات".

وثمة اعتقاد بأن الصفات المميزة لهذه الأشكال الجديدة للمادة، ربما تختلف كثيراً عن خواص المادة التي نراها في مختبراتنا، وربما تكون هذه الخواص غير المتوقعة، هي التي تخرجنا من بعض الطرق المسدودة التي صادفتنا. ومن الصعوبة بمكان أن نقبل الاعتقاد أن هناك مادة لا يمكن أن نراها بذاتها، لكنها - مع ذلك - تؤثر على ما نراه. وحتى نتفهم هذه الفكرة، وأنه من المحتمل حدوثها يمكننا أن نبدأ بأن نتطلع إلى الأجرام الفضائية في الجوار وأيضاً إلى مجرتنا "الطريق اللبناني".

### الطريق اللبناني .. نموذج لل مجرة الحلزونية


لا يمكن رؤية مجرتنا من الخارج، ولكن يمكننا مشاهدة عدد كافٍ من المجرات الأخرى. لنأخذ فكرة جيدة عن بنية مجرة الطريق اللبناني. إن ما يربو على نصف المجرات في الكون لها نفس الشكل العام، الذي يتمثل في لب مرکزى براق وذراعين حلزونيتين (ولكن أحياناً أكثر). والأذرع الحلزونية بالتأكيد، هي أكثر السمات البارزة لهذه المجرات، والرأى عندي، أنه إذا طلب من شخص عادى رسم صورة لإحدى المجرات الحلزونية، فإنه سوف يخط نموذجاً يشبه إلى حد كبير، ما هو موجود في (الشكل ٦-١).



الشكل 6.1

ويخبرنا وجود الأذرع الحلزونية بشيئين مثيرين للاهتمام للغاية، عن المجرات. أولهما: أنها تدور، وثانيهما: أنه ليس ضروريًا أن الواقع الأكثر تالقًا في المجرات، هي التي تجتمع فيها معظم المادة.. وأن هذه الواقع التي تتبع من البنية الحلزونية، ليست واضحة على الفور، ومن ثم، فإننا سوف نقوم باستطراد طفيف لمناقشتها. إذا قلبت الحليب في قهوتك، فإنه ترى عادةً أشكالاً حلزونية مؤقتة في فنجانك. ويرجع وجود هذه الحلزونيات في الحليب، إلى ما يطلق عليه الفيزيائيون "الدوران التفاضلي"<sup>(١)</sup> حيث يؤدي الاحتكاك إلى بطيء حركة السائل عند حافة الفنجان، ثم يميل إلى السكون، بينما يتدفق السائل بحرية في وسط الفنجان. وبالتالي، فإن سلسلة النقاط التي تكون خطًا مستقيماً في لحظة ما، سوف يحركها السائل لمسافات متباينة في اللحظات التالية. وعندئذ، سيتحول الخط المستقيم بسرعة، إلى منحنى حلزوني. كما هو موضح في (الشكل ٦-٢). إن هذا ما تراه في فنجان قهوتك الصباحية، مما يغرينا بالقفز إلى الاستنتاج، بأن ثمة علاقة ما، بين ما تراه من منحنيات حلزونية في قهوتك الصباحية وتلك الحلزونيات في مجرة "الطريق الابني".

(١) ظاهرة في المجرة، حيث تدور نجومها بمعدل أسرع بالقرب من المركز، عنه عند حافة المجرة، وكذلك تلاحظ في الأجرام الفضائية الغازية (مثل كوكب المشتري)، حيث تدور بمعدل مختلف عند خط استوانتها عنها عند قطبيها. (المترجم)



الشكل 6.2

بيد أنه لسوء الحظ، ثبت خطأ ذلك الاستنتاج، كما ستدرك إذا تأملت حقيقة بسيطة ثبتت صحتها بالرصد بواسطة التلسكوب. مفادها أن الشمس تقع - بالتقريب - على بعد ثُلث المسافة من مركز مجرتنا. وعندما تدور المجرة، فإنها تحمل معها الشمس وكواكبها، بسرعة تبلغ حوالي مائتين وخمسين كيلو متراً في الثانية الواحدة. وبهذا المعدل، يكون للشمس الفرصة أن تكمل تقريباً ستين دورة كاملة، منذ أن تشكلت مجرة "الطريق اللبنى". إذا كانت الأذرع الحلزونية - مثل الحليب الذى فى قهوتك - خطوط مستقيمة من مادة كثيفة التى انحرفت لتكون الشكل الحلزونى، بسبب تأثير الدوران التفاصيلي - حينئذ تكون قد التفت على بعضها منذ زمن موغل فى القدم ولم تعد موجودة.

وطبقاً للتفكير العقلانى الحديث، فإن الأذرع الحلزونية فى المجرات، تبرز إلى الخارج، لأنها مناطق توجد بها نجوم حديثة تحتدم فى لحظات ميلادها لتخرج إلى الوجود، ومن ثم، فإنها تكون أكثر بريقاً من الأجرام الفضائية المحيطة بها، ونحن نلاحظها لنفس السبب الذى نلاحظ به منطقة وسط مدينة ما، ونحن داخل طائرة فى

الجو، إذ إن كلامهما يبعث بضوء، أكثر، مما يحيط بهما. ييد أن هذا لا يعني بالضرورة، أن المناطق الأكثر إضاءة في المدينة، هي التي يسكنها أكبر عدد من السكان، كما أنها لا تستنتج من هذا، أن معظم المادة في المجرات، تتركز في الأذرع الحلوذنية.


ووفق الحقيقة والواقع، فإن المادة في المجرة، تنتشر منطقياً على نسق واحد، خلال كل جزء من القرص الدائري المسطح للمجرة. وأمكن للأذرع الحلوذنية أن تستمر في البقاء فقط لأنها متألقة، وليس لأنها تحتوى على مادة كثيفة أكثر. ويقودنا ذلك إلى واحد من أهم الأفكار التي سوف نطرحها للمناقشة في هذا الكتاب، وال فكرة مفادها أنه ليست ثمة أهمية لوجود علاقة، بين وجود المادة في منطقة ما، وانبعاث ضوء أو أي إشعاع آخر من هذه المنطقة.

إذ إن هناك طرقاً متعددة، يمكن للمادة أن تعلن بها عن وجودها، وتبعث بضوء (أو موجات راديوية أو أشعة سينية إكس وغيرهما)، الضوء مجرد واحد من تلك الإشعاعات، والحقيقة الواقعة الموجودة أن الشيء الوحيد الذي يجب أن تبذل كل مادة، هو ممارسة قوة تجاذبية. ومن ثم فإن الاختبار النهائي للتحقق من وجود المادة، ليس بما إذا كانت تشع ضوءاً، بل بما إذا كانت تجذب إليها المادة الأخرى.

### من حيثيات الدوران المجري والمادة المظلمة

في الفصل الثاني، نقاشتنا تأثير (نوبيل). ورأينا أن تردد الضوء المرئي، يمكن أن تغيره حركة المصدر. وبسبب وجود تأثير (نوبيل)، نستطيع أن ننظر إلى الضوء المنبعث من أجزاء متباعدة من مجرة دور، وتبينكم هي سرعة تحرك هذه الأجزاء في السطح المستوى لتلك المجرة، كما هو موضح في (الشكل ٦-٢). والسرعات التي تحصل عليها بهذه الطريقة - عندما تخطط بيانيًا على لوحة - تشكل ما نطلق عليه "منحنى الدوران المجري".

وتحتة أشكال متعددة ممكنته، يمكن أن يتخذها منحنى الدواران، وكل منها شبيه في خبراتنا اليومية. فعلى سبيل المثال، عندما ترك لعبة "الدوار"<sup>(١)</sup> سوف ترى أنك سوف تصاب بالدوار بشكل أشد بكثير، إذا كنت في الحافة الخارجية، عما لو كنت في الداخل. وهذا هو السبب في أننا نجعل الصغار يبدأون بامتطاء الخيول الخشبية الداخلية، ثم يتخذون طريقهم إلى الخيول الخارجية كلما تقدموا في السن، والسبب في حدوث هذه الظاهرة بسيط: إن لعبة الدوار عبارة عن قطعة صلبة، وعندما تدور، فإن الجزء الخارجي يجب أن يتحرك بسرعة أكبر، ليساير الجزء الداخلي، وهذا النوع من الحركة ينشئ منحنى دوران، مثل الموضع إلى اليسار في (الشكل ٦-٤). وهو منحنى تزداد فيه السرعة كلما ابتعدنا عن المركز. وهذا يطلق عليه "عجلة التدفق"، في لغة الفيزيائين، وذلك لأسباب واضحة. ونتوقع أن نجدها، كلما كانت المادة مكشوة بإحكام معًا، كما هي الحال في لعبة الدوار.




الشكل 6.3

ويمكنك أن تتصور نوعاً شائعاً آخر من التدفق، إذا فكرت في مجموعة من العدائين داخل ملعب رياضي، كل واحد منهم في أحد الممرات المحددة، التي تمتد من الداخل

(١) لعبة تتألف من منصة دائرة عليها خيول خشبية يجلس عليها الأفراد وتتدد بهم، وهي توجد في مدينة الملاهي. (المترجم)

إلى الخارج على سطح مضمار العدو. وبأن كل العدائين على درجة واحدة من المهارة، ومن ثم، سوف ينطلقون جمِيعاً بنفس السرعة، وإذا كان هناك منحنى في مضمار العدو، عندئذ سوف يبدأ طابور العدائين في الانحناء، وبالنسبة للعدائين الداخليةين، فإنهم سوف ينطلقون في خط مستقيم، ذلك أن عليهم اجتياز مسافة أقل. وإذا قمت بقياس منحنى الدوران للعدائين، سوف تحصل على شيء ما مثل الموضع في وسط (الشكل ٦-٤). وسوف يعبر كل العدائين الخط التخييلي بنفس السرعة، ولهذا سوف يصبح المنحنى، خطأً أفقياً مستقيماً. (إن الحقيقة بأنهم اجتازوا الخط التخييلي في أوقات متباعدة. يعد خارجاً عن الموضوع، ما دام الأمر يتعلق بجسيمات القياس هذه. إن كل ما يهم، هو كم السرعة التي يتحركون بها، عندما يجتازون هذا الخط التخييلي)، وسوف نطلق على هذا الموقف "تدفق السرعة الدائمة". وستحدث، متناغمة مع منحنى الدوران الأفقي المميز، وقتما تتحرك كل الأشياء بنفس السرعة. بعض النظر عن بعدهم من المركز. وتتفق السرعة الدائمة، يقود بالضرورة إلى الدوران التفاضلي - نفس الشيء الذي نراه في فنجان القهوة - ذلك أن النقاط الخارجية، الذي عليها أن تنتقل إلى مسافة أبعد، ملزمة بأن تتحرك بنفس سرعة النقاط الداخلية الناظرة لها.



الشكل 6.4

وبالإضافة إلى ذلك، إنه التأثير الذي نناقشه هنا، مسئول عن الحقيقة بأن العدائين يعطون تعاقب الترتيب، في منافسات مضمار العدو. إن موازنة موقع البداية، قد صممت لتعويض العدائين عن الاختلافات في المسافات، المقاومة على طول داخل مضمار العدو وخارجيه.


وتحة نوع ثالث من منحنيات الدوران، يمكن فهمه بالتفكير في الكواكب في المنظومة الشمسية. من المعروف جيداً أن طول "السنة" - الزمن اللازم لإتمام دورة واحدة - يتباين باختلاف الكواكب. ويترافق بين ثمانية وثمانين يوماً للكوكب عطارد إلى نحو مائتين وخمسين عاماً للكوكب بلوتو<sup>(١)</sup>. وإلى حد ما، فإن هذا مرد إلى الحقيقة بأن الكواكب الخارجية تستغرق وقتاً أطول لإتمام دورة كاملة، بيد أن هذا مجرد جزء من القصة. وكذلك اتضح أنه كلما كانت المسافة بين الكوكب والشمس أطول، تحرك ببطء أكثر. ومنحنى الدوران لمنظومة مثل الكواكب، موضحة إلى اليمين في (الشكل ٤-٦)<sup>(٢)</sup>.

والمنحنى من هذا النوع يسمى "كبلري" تيمناً بالفلكي الألماني (يوهانس كبلر) (١٥٧١ - ١٦٢٠)، وهو الذي صاغ القوانين الصحيحة لمدارات الكواكب، ونتوقع أن نجد ذلك المنحنى، في أي موقع، حيث توجد الكتلة التي تمارس قوة الجاذبية، في مركز المنظومة، كما تفعل في حالة الشمس والكواكب. ومن الأهمية، أن ندرك أن هذا المتطلب، لا يعني ضرورة أن تكون الكتلة المركزية صغيرة الحجم. وبالتالي، فإن الشمس ليست جرماً فضائياً صغيراً. وتعد المنظومة الشمسية "كبلرية"، ذلك أن حجم الشمس صغير، مقارنة بالمسافات إلى الكواكب، وبينما المفهوم، لو بعدنا كثيراً عن التركيزات الأساسية للكتلة في المجرة، إلى الحد أن منحنى الدوران سوف يكون وبالتالي "كبلرياً". وتلك نقطة بالغة الأهمية، ومن ثم، دعني أشرحها بالتفصيل في عجلة. افترض - مجرد تبادل وجهات النظر - أن كل المادة في المجرة، كانت مركزة في شكل كروي قطره مائة ألف سنة ضوئية، أي إنه يتطابق - بمعنى آخر - مع توزيع المادة المضيئة. عندئذ، إذا كان هناك بعض التوابع (شموس مثلاً أو حتى كواكب منفردة) تدور على بعد مائتي ألف أو ثلاثة وألف سنة ضوئية، فإننا نتوقع أن تكون منحنيات دورانها "كبلرية". وكلما كانت هذه الأجرام الفضائية أكثر بعداً، فإنها يجب أن تتحرك أشد بطئاً.

(١) أصبح الآن مجرد كويكب وليس كوكباً في المجموعة الشمسية. (المترجم)

(٢) الشكل الرياضي للمنحنى يكون ١/٢. (المؤلف)

وموضح في (شكل ٦-٥) منحنى دوران نموذجي مقاس، لإحدى المجرات. وفي اتجاه نواة المجرات، حيث تتقross وتنتمس المادّة، سوف نلاحظ أن السرعات تتضاعف، مع زيادة المسافة: أي تدفق العجلة. وكما ابتعدنا أكثر، اختفت مستويات الانحناء، ونرى أنفسنا في منظومة يتحرك فيها كل شيء، تقريباً بنفس السرعة، ومن ثم، يظهر نوع من الالتواء<sup>(١)</sup> الذي يصاحب الدوران التفاضلي. ويمتد هذا الجزء من المنحنى كثيراً إلى ما بعد المائة ألف سنة ضوئية، وبالتالي، يصل إلى ما وراء تلك المنطقة، التي يمكننا أن نراها بالفعل، عندما ننظر إلى مجرة ما. وربما ينتابك العجب، وتتسائل كيف نستطيع أن نتعرّف عن سلوك المادّة، فيما وراء المنطقة المرئيّة؟ ومن الواضح، أنه ليس ثمة أي ضوء مرئي يصل إلينا مما قد يوجد بعيداً هناك، بيد أن هذا لا يعني عدم وجود أي إشعاع على الإطلاق. إذ توجد غيوم رفيعة ورقيقة من غاز الهيدروجين في تلك المنطقة، وبيث هذا الغاز الموجات الراديويّة، التي يمكن رصدها، بواسطة مستقبلات فوق كوكب الأرض. ونوع تحليل دوبلير الذي تم شرحه فيما سبق، للضوء المرئي يمكن إجراؤه على الموجات الراديويّة، ومن ثم، يمكننا بالفعل التعرّف على سرعة تحرك الهيدروجين.



(١) الدوران الكامل لجسم ما حول محوره العمودي. (المترجم)

وإذا كان الغاز في منطقة فضاء فارغة<sup>(١)</sup>، سوف يتتخذ له مداراً حول المجرة، أنواع من التوابع الذرية. في هذه الحالة، يجب أن نرى منحنى الدوران، وقد تحول إلى شكل كبلي، ومن ناحية أخرى، إذا تدفق الغاز إلى الأمام بتأثير مادة غير مرئية - كحطام السفينة الطافى على سطح نهر صغير - عندئذ سوف يصبح منحنى الدوران للهيدروجين، مماثلاً لتلك المادة غير المرئية، المطمور فيها.

وكما ترى في (الشكل ٦-٥)، يظل منحنى الدوران مجرة نموذجية، مسطحاً تماماً خارج المنطقة، حيث يتم بث الضوء المرئي. وفي الواقع الأمر، فلم يلاحظ قط تحول أي منحنى دوران مجرى، ليصبح كبلياً، بل بقيت كلها مسطحة إلى مسافات تصل إلى مائتي ألف وثلاثمائة ألف سنة ضوئية، أكثر بعدة مرات من الجزء المرئي من المجرة. وهذا حقيقى بالنسبة للعديد من المجرات التى تم رصدها وقياسها. ومن ثم، فمن الأرجح - إلى حد بعيد - أنه حقيقى أيضاً بالنسبة لمجرة الطريق اللبنى.


ونعلم أننا بمجرد وصولنا إلى نقطة، حيث نكون خارج معظم المادة فى المجرة، سوف يصبح منحنى الدوران كبلياً، ويبعداً الرووال. والحقيقة أنه لم يلاحظ يفعل هذا، يعني شيئاً واحداً: حتى على بعد مسافات مروعة من المركز، مسافات بعيدة تماماً عن تخوم المجرة المرئية، ثمة كميات هائلة من المادة. ربما لا نستطيع رؤيتها، بيد أننا نعرف أنها هناك، بسبب التأثيرات التجاذبية، التى تمارسها على منحنى الدوران.

وفي الواقع، فإنه يمكننا تقدير كمية المادة الإضافية فى مجرة الطريق اللبنى والجرات الأخرى، عن طريق دراسة مدارات التوابع المجرية. كم قدر الكلة التى يمكنها إنتاج منحنين الدوران التى أمكن رصدها وملحوظتها؟ والإجابة هي أنه لابد من وجود - على الأقل - عشرة أمثال من المادة غير المرئية فى المجرات، عن المادة المرئية بها. وبمعنى آخر، فإنه على الأقل، تسعين بالمائة من المادة التى فى مجرة مثل مجرتنا، فى شكل لا يبعث بضوء مرئى أو أى إشعاع آخر، وأن أحداً لم تساوره

---

(١) فراغ يقع بين المجرات. (المترجم)

الشكوك في وجودها، حتى السبعينيات من القرن العشرين. ومن ثم، كان من الملائم أن يطلق الفلاكيون على هذه المادة "المادة المظلمة". وتنتشر تلك المادة المظلمة، خلال حالة كروية تحيط بالمناطق الرئيسية من المجرة (انظر الشكل 6-6).



الشكل 6.6

### المادة المظلمة: بعض التعليقات الفلسفية

سوف نناقش فيما يلى النتائج التى ترتبت على وجود المادة المظلمة والفكر السائد فى الوقت الحاضر عن الشكل الذى يمكن أن تتخذه، وذلك طوال بقية الكتاب، ولكن أنها سوف تكون فكرة جيدة أن نتمهل قليلاً عند هذه النقطة، ونضع اكتشافها وفقاً لعلاقاتها الصحيحة وأهميتها النسبية. وللورقة الأولى، ربما يبدو أن المادة المظلمة، ما هي إلا مجرد قطعة صغيرة إضافية، فى أحجية الصور المقطوعة، التى علينا أن نركبها، حتى نتمكن من فهم كوننا، وهى تتساوى فى الأهمية مع أجرام فضائية عديدة فى الكون. وسوف تكون هذه وجهة نظر معقولة، إذا كانت المادة المظلمة تشكل مجرد جزء صغير من الكون، وفي هذه الحال، نستطيع أن نعتبر وجودها مثل حاشية، لما هو أكثر أهمية (وأكثر سهولة فى رصده) ألا وهى المادة المضيئة.

بيد أن وجهة النظر هذه قد عززت بانحيازنا المدرك، بأن ما يمكننا رؤيته يجب أن يكون أكثر أهمية، مما لا نستطيع رؤيته، ومن ثم، أصبح غامضاً ومثيراً للاهتمام.

والواقع أن الشكل الغالب من المادة في الكون، ليس مضيفاً ولكنه مظلم، ولا نكون مبالغين إذا قلنا إنه أكثر من تسعين بالمائة من المادة في الكون مظلمة، وإن المادة المضيئة - والتي يمكننا رؤيتها بالفعل - لن تكون لها من الأهمية أكثر من حطام سفينة فوق سطح نهر صغير. ولعل الأذرع البراقة للجراثيم تعمل - ببساطة - كعلامات سلبية، وشهود بكم، لقوى تعمل في مستوى غير متزن لنا. ويبعدونا كلما عرفنا المزيد عن كوننا، ندرك أن المعرفة التي حصلنا عليها بشق الأنفس عن الكون المرئي، هي أكثر قليلاً من خطوة أولى على الطريق، لفهم الأشياء على حقيقتها. ومعظم النظريات الحديثة التي تمت مناقشتها في الفصلين الحادى عشر والثانى عشر، كانت قد تبنت وجهة النظر هذه، ولكن إلى الآن اقتصر منحى التفكير الجديد هذا، على عدد محدود من الخبراء.

وفي الفصل الأول، رسمينا خريطة تتضمن تطور أفكارنا عن الكون، من علم الكون لدى الإغريق الذي كان ينبع على مركبة كوكب الأرض، إلى كوبيرنيكوس الذي كان ينادي بمركبة الشمس في الكون. ورأينا كيف أن خلع الأرض عن العرش، بإزاحتها عن مركز الكون، إلى القيام بدور، مثل أي كوكب آخر، كان له أبلغ الأثر في تدمير عالم القرون الوسطى الذي كان ينعم بالاستقرار والهدوء.

استمر خلع كوكب الأرض عن مقام السلطة والنفوذ، بالعمل الذي قام به شابيل وهابل. فقد أظهر (شابيل) أن الشمس لم تكن حتى في مركز مجرة الطريق اللبناني، بل تربض في مكان ما. بالأذرع الحلزونية للمجرة. وعلى أثر ذلك، أظهر هابل أن مجرة الطريق اللبناني ذاتها، كانت مجرد واحدة من عدد لا متناه من المجرات، في كون متعدد. وكما أصبح كون هابل ماؤلوفاً في خلال الستين عاماً الماضية، فإن اكتشاف المادة المظلمة قادنا إلى تغيرات بعيدة الغور، في الطريقة التي ندركه بها. ولعل هذا الكون

المألف بذاته، أكثر قليلاً من مجرد جزء ثانوى، من التشغيل النشط الحقيقى للأشياء، حتى إنه ربما يكون نوع المادة، التى تكونت منها منظومتنا الشمسية، كوكبنا وأجسامنا، هي فى حد ذاته جزء بسيط نسبياً من الكون، الذى تشكل - بالكثرة الغالبة - من مادة مختلفة تماماً. ومن الصعوبة تخيل نهاية أكثر كابة من ملحمة كوبيرنيكوس، خاصة إذا أردت أن تصدق فى قرارة نفسك، بأن كوكب الأرض وكل سكانه من البشر، يحتلون موقعًا متميزةً فى الكون.

### العنقىد المجرية: المزيد من المادة المظلمة

تعد منحنيات الوران، إحدى الدلالات المهمة، لوجود المادة المظلمة، ولكنها ليست الوحيدة فى هذا المجال. ثمة المزيد من المادة المظلمة هناك، أكثر من تلك الموجودة فى الحالات المجرية، وتلك حقيقة يمكن سبر غورها، بالتفكير فى العناقىد المجرية.

ومما يستثير بالاهتمام، فيما يتعلق بالمادة المظلمة، أن هناك العديد من العناقىد المجرية، التى تشتمل على آلاف المجرات. وفي هذه العناقىد، تتحرك المجرات فى مسارات معقدة. وفي الواقع يمكنك أن تفك فى العنقود المجرى، وكأنه يشبه نقطة ماء معلقة فى الفضاء. وكل من هذه المنظومات تتشكل من مكونات (مثل المجرات والجزيئات)، لها الحرية فى التحرك هنا وهناك. وبإضافة إلى هذا، هناك قوة فى كل منظومة (الجاذبية إحداثها والتوتر السطحى<sup>(١)</sup> أيضًا) وهى التى تمنع المكونات من التطابير.

في حالة نقطة الماء المعلقة، نعرف بأننا إذا رفعنا درجة الحرارة، فإن سرعة الجزيئات سوف تزداد، حتى - في نهاية الأمر - يمكنها أن تتغلب على قوى التوتر

---

(١) قوى التجاذب المؤثر فى الجزيئات الواقعة على سطح السائل، وتؤدى إلى وجود شبه غشاء رقيق، ومن ثم الخاصية الشعرية. (المترجم)

السطحى. وعندما يحدث هذا، نقول بأن نقطة الماء تغلى. وفي الواقع، يمكنك أن تتتبأ ما إذا كانت نقطة الماء سوف تغلى أم لا، وذلك بقياس سرعة تحرك الجزيئات الفردية.

وينفس الطريقة تماماً، يمكن للفلكيين قياس سرعات المجرات. في عنقود مجرى قصى ويعرفون مدى قدرة تلك المجرات، على التغلب على قوة الجاذبية، التي يمارسها الأعضاء الآخرون بالعنقود. وبالطبع، فإن قوة الجاذبية، تعتمد على كمية المادة (المضيئة والمظلمة معاً) التي تكمن في المجرات في العنقود المجرى. وعندما يتم القيام بإجراء هذه الأنواع من القياسات للسرعات، تبرز حقيقة مذهلة من غير ريب، إذ يتضح أنه تقريباً في كل حالة، تكون سرعات المجرات الفردية مرتفعة إلى الحد الذي يسمح لها بالهروب من العنقود المجرى، وفي الحقيقة، فإن العناقيد المجرية "تغلى"، وتكون تلك العبارة صحيحة يقيناً، إذا افترضنا أن قوة الجاذبية الوحيدة الموجودة، هي التي تمارسها المادة الضئيلة، بيد أنها أيضاً حقيقة حتى لو افترضنا أن كل مجرة في العنقود مثل مجرة الطريق اللبني، محاطة بهالة من المادة المظلمة، التي تحتوى على تسعين بالمائة من مادة المجرة.

وثمة طريقتان محتملتان لشرح هذه النتيجة. أولها أن نأخذها بشكلها الظاهري، ونقول بأن العنقود المجرى "يغلى"، أى يضطرب بالفعل، بيد أن هذا حدث في الوقت الذي كنا ننظر إليه، أثناء قيام سلسلة من العمليات المروعة داخله. ويشبه هذا، مشاهدة نقطة من الماء فوق مقلاة معدنية ساخنة، قبل أن تتبخر تماماً. سوف تكون هذه المحادلة تقسيراً معقولاً للسرعات في عدد قليل من العناقيد المجرية، ولكن عندما ترى نفس النموذج يتكرر في كل مكان، سوف تبدأ التعجب.

ما احتمال أن نقوم بالرصد، في الوقت الذي تكون فيه نصف مجرات الكون، مدمجة في عناقيد بلغ من شدة ضعفها، أنها لا تستطيع أن تبقى متصلة، ومن ثم كانت تضطرب بسلسلة من العمليات الكونية المروعة، التي تجعلها تتفك وتتطاير؟

والبديل هو أن نفترض أن المجرات كانت دائماً متجمعة في عناقيد مجرية، كما هي في الوقت الحاضر، وأن القوى التي تمسك بالعناقيد معاً، أكثر شدة مما نتوقعه

اعتماداً فقط على كمية المادة في المجرات، والطريقة الوحيدة التي يمكن أن يحدث بها هذا، إذا كان هناك فيض من المادة المظلمة تفوق الحالات المجرية. ومثل تلك المادة يمكنها أن تخفي في الفضاءات الفارغة، بين المجرات في العنقود. إذا كانت هذه هي الحالة، فإن تلك المادة المظلمة الزائدة، سوف تمارس قوة تجاذبية مروعة، على المجرات، عندئذ سوف تحجز في العنقود، على الرغم من سرعاتها الهائلة، هذا هو التفسير الحديث لتشكل العنقود المجري، وهو مقبول في الوقت الحاضر، من معظم الفلكيين.

وبينما - عندئذ - أن المادة المظلمة بربت في الكون، في أكثر من مكان واحد به: فقد خرجت إلى حيز الوجود، حول المجرات الفردية، بيد أنها ظهرت أيضاً بين المجرات في العناقيد المجرية، وفي لغة ومصطلحات علماء الكون، نقول إن المادة المظلمة تبدت على مستويات عديدة. وبالطبع سوف نجادل، بأن المادة المظلمة تكشفت على كل المستويات في الكون، وأننا أينما وجهنا نظرنا لرؤية المادة المضيئة، لابد أن نتوقع أن نجد المادة المظلمة أيضاً.

وبالانتهاء من هذه النقطة، دعنا نتحول إلى السؤال: كيف أن وجود - ما أوضحتناه من قبل - من نوع غير متوقع من المادة، يمكنه أن يتوصل إلى حل للمشاكل التي صادفتنا، في محاولتنا سبر غور بنية الكون المروعة.



الفصل السابع

# كيف يمكن للمادة المظلمة أن تجد حلًّا لمشكلة بنية الكون

وَالآن، علِيْنَا أَنْ تَتَأْمِلْ تَخْمِيْنًا فِي زَمَنٍ كَانَتْ فِيهِ الْهُمَمَاتُ الزَّاحِفَةُ وَالظَّالِمَةُ الْمُرْعِيَةُ  
الَّتِي تَمْلَأُ هُوَةَ الْكَوْنِ السُّجْيَّقَةِ.

(ویلیام شکسپیر)

مسرحة "هنري الخامس" - الفصل الرابع - المشهد الأول

أدى اكتشاف المادة المظلمة إلى إماتة اللثام عن أننا لا نرى معظم مادة الكون. ومن البديهي فقط أن نسأل عن تأثير ذلك على مشكلة شرح البنية الرحبة للكون. وربما يبدو غريباً أن يعلق علماء الكون أمالمهم وتطلعاتهم حول فهم طبيعة الكون، على مثل هذه المادة الخامضة، وأعني بها المادة المظلمة، بيد أن هذا هو ما يحدث تماماً في الوقت الحاضر.

وليس ذلك - ببساطة - حالة تعلق بأعمال واهية، حيث ننتهز فرصة جهلنا بطبيعة المادة المظلمة، لتعزو لها، كل الخصائص التي تحتاجها لحل المشاكل التي نواجهها، وفي الحقيقة، سوف نرى أننا في واقع الأمر، لسنا في حاجة لمعرفة تفاصيل كيفية سلوك المادة، لكن، نتعرف على الطريقة التي سوف نتمكن بها من ايجاد حل مشكلة

تكوين المجرة. ومع الاعتراف بوجود المادة المظلمة في الكون، يبدو أننا حصلنا على آخر قطعة كنا نحتاجها لنتم بها أحجية الصور المقطوعة ونستكمل صورة الطريقة التي تطور بها الكون، ليصبح على وضعه الحالي.

والفكرة الرئيسية لدور المادة المظلمة في الكون، من السهل إدراكتها، كما رأينا، فإن الصعوبة الجوهرية في تصور كيفية تطور الكون، لا بد أن تكون لها علاقة ما، بالحقيقة التي مفادها أنه إذا كان الكون بأسره مكوناً من مادة عادية، لما أمكن لل مجرة أن تبدأ التشكل إلا في وقت متاخر إلى حد كبير، وذلك بعد أن برد الكون إلى الدرجة التي أمكن فيها للذرات أن توجد، وتسمح للإشعاع بفك الاقتران. وقتنى، كان تعدد الكون قد أدى إلى نشر المادة على نحو رقيق للغاية، إلى الحد أن الجاذبية بمفردها لن تكون قوية بما يكفي لجذب كتل من المادة معاً، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. وفي الفصل الرابع كوننا صورة ذهنية. وناقشتنا كل الطرق التي قد تفكر فيها، لنعطي العملية دفعه البداية، ولكن يبدو أنها تتناقض مع بعض الحقائق والأرصاد التي ثبتت صحتها.

وإذا قبلنا فكرة أن معظم الكون ليس في صورة مادة مائلة، فإن هذه الصعوبة المذكورة أنشأ، سوف تفقد بعضاً من قوتها، وعلى الرغم من أن ضغط الإشعاع الذى يتفاعل مع البروتونات والإلكترونات فى بلازما الكون الأولى، ربما يمنع تكثيل المادة العادية، إلى ما بعد تكون النزارات، وليس ثم سبب على الإطلاق، يحول دون حدوث مثل هذا، للمادة المظلمة. افترض - لمجرد المناقشة - أن لدينا مرشحاً للمادة المظلمة، توقف عن التفاعل مع الإشعاع فى وقت مبكر للغاية، من حدوث الانفجار الأعظم، وانقل مثلاً فى اللحظة الأولى، ويمكن أن يظهر هذا الموقف إلى الوجود، إذا كان التفاعل بين جسيمات المادة المظلمة مع الإشعاعات، اعتمد على الطاقة التى تتبع عن الاصطدامات بينهما، ومن ثم تتضاعل قوتها، عندما تنخفض درجة الحرارة، عن مستوى معين. وفي مثل هذه الحالة، يمكن للمادة المظلمة أن تبدأ التجمع فى شكل كتل، تحت تأثير الجاذبية، قبل زمن طويل، من تكوين النزارات، ولن يمنع ضغط الإشعاع هذا النوع من التكثيل، ذلك أن فرضتنا مفاده أن الإشعاع لا يمكنه أن يمارس ضغطاً على المادة المظلمة، كما يفعل مع المادة العادية.

ولو حدث هذا، عندئذ عندما تكون الذرات وتصبح المادة العاديّة حرة في أن تبدأ التكّل، ستجد نفسها في كون فيه تركيزات مروعة من الكتل، موجودة بالفعل، وسوف تكون أجزاء من المادة العاديّة منجذبة بقوة إلى الأماكن، التي تكّدست فيها من قبل المادة المظلمة، وللتوصيّف سوف تتحرّك بسرعة إلى هذه الواقع. وتتشبّه هذه العملية، صبّ ماء على سطح يمتدّ بالحفر العميق، إذ سرعان ما يندفع الماء إلى هذه الحفر، وسرعة فيضان الماء لن يكون له - تقريباً - أي علاقة بما تؤثّر فيه أي كمية صغيرة من الماء على كمية أخرى، وهكذا تستمرّ المواجهة، فما إن تتحرّك المادة العاديّة، من التقييدات التي فرضها عليها ضغط الإشعاع، فإنّها سوف تسقط في "الحفر" التي أوجّدتها بالفعل المادة المظلمة، ومن ثم، فإنّ المجرات والبنيّة الكونيّة الأخرى، سوف تتشكل - بسرعة هائلة - بعد فك اقتران الإشعاع، وكل المواجهات حول "المدى الزمني" الذي سبب لنا مشاكل وصعوبات عدّة في الفصل الرابع، سوف تصبح غير ذي علاقة بالموضوع.

وتكمّن روعة هذه الفكرة في أنها تأخذ مشكلتين - عدم كفاية المدى الزمني لتشكيل المجرات وجود المادة المظلمة - وتضعهما معاً، لتصل إلى حل للمشكلة المركبة العويصة التي تتعلّق ببنية الكون.

ووفق افتراضنا، فإنّ المادة المظلمة لها مدى زمني أطول من المادة العاديّة، لأنّها فكت اقترانها في وقت أبكر بعد الانفجار الأعظم. كما كان لديها وقت طويل للغاية، لكنّ تكّلّ معًا، قبل أن تتحرّك المادة العاديّة، وتتفعل نفس الشيء. والحقيقة بأنّ المادة العاديّة - عندئذ - تسقط في حفرة تجاذبية - كانت قد تكونت بهذه الطريقة ، تساعدها في تفسير لماذا نجد المجرات محاطة بهذه الظاهرة من المادة المظلمة. إنّ هذا الافتراض يقتل عصفورين بحجر واحد.

بيد أنّنا لابد أن نأخذ في اعتبارنا، بأنه عند هذه النقطة، لا نملك إلا فكرة ربما تتحقّق شيئاً ما، ولكنها لا ترقى إلى مرتبة النظرية الراسخة البنيان.

لكى تعبّر الفجوة ما بين الفكرة والنظرية، علينا أن نجيب عن سؤالين مهمين ولكنهما معدان (١) كيف يمكن للمادة المظلمة أن تسبّر غور بنية الكون (٢) ما المادة المظلمة؟

## المادة المظلمة الساخنة والباردة

يمكّنا أن نبدأ بتفحص هذين السؤالين، بالتفكير ملياً حول الطريقة، التي باستطاعة المادة المظلمة أن تتفصل بها عن السحابة الساخنة المتمددة، من المادة التي شكلت الكون المبكر، وبالمثل مع مناقشة فك اقتران المادة العادية، بعد تكون الذرات كما أوضحتنا في الفصل الثالث، سوف نطلق على فصل المادة المظلمة "فك الاقتران" أيضاً، وتحوّيل مثل هذا، الذي يؤدى إلى تكوين الذرات، لا يحتاج إلى حدوث فك الاقتران كل ما يجب حدوثه، هو أن قوة التفاعل بين الجسيمات، التي تشكّل المادة المظلمة، تنخفض تحت نقطة معينة، بحيث يكون بقية الكون قادرًا على ممارسة ضغط معقول عليها، بعد هذا، سوف تستمر المادة المظلمة في طريقها، غير مكتنثة لأى شيء آخر، يحدث حولها.

ويتضح أنه من وجهة نظر، خلق بنية الكون الذي رصدت بشكل علمي ومنظم، فإن أكثر الصفات المميزة أهمية، لعملية فك التقارن للمادة المظلمة، هو سرعة الجسيمات، عندما يتم تحريرها من كل قيودها، وإذا كان فك التقارن قد حدث في وقت مبكر للغاية، بعد الانفجار الأعظم، لجأ المادة المظلمة بجسيماتها التي تتحرك بسرعة مذهلة، تقترب من سرعة الضوء، وإذا كان هذا ما حدث، نقول بأن المادة المظلمة ساخنة، أما إذا حدث فك التقارن، عندما كانت الجسيمات تتحرك ببطء - وتحديداً أقل من سرعة الضوء - نقول بأن المادة المظلمة باردة<sup>(١)</sup>.

---

(١) لاحظ أن التعبيرين "ساخن" و"بارد" يعززان إلى سرعة الجسيمات، عندما يفك اقترانها، وليس لدرجة حرارة الكون في ذلك الوقت، ومن حيث المبدأ، يمكن لجسم خفيف أن يكون (ساخناً)، حتى لو جاء متأخراً بعد الانفجار الأعظم، بينما قد يكون الجسم الثقيل (بارداً) حتى لو جاء مبكراً بعد الانفجار الأعظم. (المؤلف)

من بين أنواع المادة المظلمة التي يضعها علماء الكون في اعتبارهم، "النيوترينوات" (انظر الفصل العاشر)، التي تعد أفضل مثال للمادة المظلمة، وكل الجسيمات التي سوف نناقشها في الفصل التاسع، باردة، ونوع من المادة المظلمة - الأوتار الكونية التي سوف تتم مناقشتها في الفصل الثاني عشر - لا ينطبق على هذا النظام من التصنيف، لأنها لا تكون من جسيمات على الإطلاق. وفي بقية هذا الفصل سوف نبحث في كيفية عمل المادة المظلمة الساخنة والباردة، في كون يتعدد، على أن نرجو التساؤل عن ماهية المادة المظلمة إلى ما بعد.

وأوضح أن المادة المظلمة الساخنة، إذا كانت تعمل بمفردها، فهي بالتأكيد لا يمكنها تفسير ما نلاحظه في الكون، وأنه لابد من تعديل على نطاق واسع لسيناريو المادة المظلمة الباردة، إذا ما أريد أن يبقى كمرشح للنظرية النهائية، إنها تلك الظروف والعوامل غير الكافية ولا المقبولة، التي سادت في وقت معين، بالإضافة إلى الريبة في نوع الجسيمات، سوف تكون المادة المظلمة الباردة، والتي أدت - في نهاية الأمر - إلى دفع العلماء النظريين إلى التفكير ملياً في الأوتار الكونية.

### التدفق الحر وانقضاء المادة المظلمة الساخنة

عندما يتحدث علماء الكون عن المادة المظلمة الساخنة، يكون ما يشغل بهم (كما رأينا توً) جسيم يسمى "النيوترينو". وسوف تشغلي صفاتاته المميزة بشكل أكثر تفصيلاً، كما تقدمنا في البحث. وللحظة الراهنة سوف نلاحظ ببساطة أن "النيوترينو" جسيم يبعث أثناء التفاعلات النووية، وبالتالي، يمكن رؤيته في مختبراتنا حالياً. وكلة النيوترينو، إما أن تكون صفرًا أو ضئيلة للغاية، وعادة تتطلق النيوترينوات بسرعة الضوء أو قريباً منها.

وال الفكر السادس في الوقت الحاضر بهذا الصدد، أنه عندما كان عمر الكون ثانية واحدة، لم تكن جسيمات النيوترينوات تتفاعل - بدرجة كافية - مع المادة العادية،

بحيث تتأثر بضغط الإشعاع. ومن ذلك الحين، زادت كمية النيوترونات وبردت ذاتياً، مكونة صورة مرأةية لإشعاع الموجات الدقيقة الكوني.

وإحدى طرق التفكير حول العملية التي أدت إلى فك تقارن النيوترونات، مفادها أنها تحدث عندما يندفع النيوترون خلال المادة، دون التفاعل معها. وثمة عاملان يؤثران على هذا الاحتمال المرجح: كثافة المادة (الذى يخبرنا عن عدد المرات التي تقترب فيها النيوترونات من الجسيمات الأخرى)، ومدى احتمالية اقتراب نيوترون من جسيم آخر، والتفاعل معه. وبعد أن أصبح عمر الكن ثانية واحدة، كانت هذه الاحتمالية الموحدة، منخفضة إلى الحد، أنتا نقول إن النيوترونات. قد فك تقارنها.

ولنفترض جدلاً أن نفس هذه العملية قد حدثت لأى نوع من المادة المظلمة الساخنة.

ولنكمي القصة، بينما كانت سحابة النيوترون تتمدد، تحركت خلال مناطق من الكثافة العادية، دون وقوع الكثير من التفاعلات. بيد أنها لو صادفت منطقة من الكثافة العالية - التي أطلقت عليها من قبل تركيز كتلة - فإنها سوف تتفاعل وتمزق التركيز إرباً. سوف يحدث هذا، لأن الاحتمالية الأولى التي ذكرت آنفاً، والتي تتعلق بمصادفة جسيم آخر، سوف تكون أكبر في حالة تركيز الكتلة، من أي مكان غير ذلك. وعلى حد قول الفلكي (جاك بيرنز) من ولاية أريزونا، أن هذا سوف يؤدي إلى تفكك تركيزات الكتلة - مثل قذيفة مدفع، منطلقة بسرعة عالية، ويكون بمقبورها تدمير جدار غير محكم البناء، دون أن يبيطئ هذا التصادم من سرعتها بدرجة كافية. وسوف تستمر هذه العملية إلى أن يبرد التمدد سحابة النيوترونات إلى الحد الذي تتحرك فيه النيوترونات بسرعات منخفضة، تصل - مثلاً - إلى أقل من عشر سرعة الضوء. وعند هذا المستوى من الطاقة لا تعد النيوترونات قادرة على ممارسة ضغط، حتى على التركيزات بالغة الكثافة، وسوف تتوقف عن تأدية أي دور في الانهيار التجاذبى. وما بين الوقت من فك التقارن وخفض السرعة، يقال إن النيوترونات في حالة "تدفق حرّ".

عندئذ، يمكن للنيوتروينوات الثقيلة أن تفك تركيزات الكتلة، لوقت ما بعد فك التقارن، وبينما يحدث هذا، لا تستطيع النيوتروينوات أن ترتحل أكثر من مسافة محدودة، هي بالتأكيد لا تزيد على سرعة الضوء في نفس المدى الزمني. وبمعنى آخر، إذا بدأ النيوتروينو مساره في تركيز مادة ضخم للغاية، فإنه لن يستطيع أن يتخاله بالكامل في الوقت المتأخر. بيد أنه إذا بدأ في تركيز صغير، سيتمكن من اختراقه تماماً، ويؤدي نوراً مثل قذيفة المدفع في الجدار غير محكم البناء. وتكون النتيجة أن التدفق الحر للنيوتروينوات سوف يفك التركيزات الكتالية الصغيرة، بيد أنه سوف يترك التركيزات الضخمة - إلى حد ما - لا تنس.

ومثل هذا التقويض الانتقائي لتركيزات معينة في الكون المبكر، الذي حدث قبل زمن طويل من فك تقارن الإشعاع وبدء الانهيار التجانبي بشكل عظيم الشأن، كان يعني بالتأكيد أن النيوتروينوات قد دمرت كل نواة محيبة بها، وهي التي يمكن أن تتكتّل لتشكل مجرات حجمها أقل من حد معين. وبمقدورنا تقدير هذا الحجم. إذ يمكن التوصل إليه بحساب المسافة التي ارتحلتها النيوتروينوات خلال تدفقها الحر. وانفسح أنها ذات كميات مروعة، تقريرياً في حجم العناقيد المجرية الفائقة. ومن ثم، فعندما بدأ الانهيار التجانبي، كانت مراكز لكتلة - الأصغر والأسرع نمواً - في حجم العناقيد المجرية الفائقة.

عندئذ، فإن وجود التدفق الحر للنيوتروينوات، يخبرنا أن نظريات المادة المظلمة الساخنة، يجب أن تتبعاً بتتابع هذه الأحداث التالية:

أولاً، أن المادة المظلمة الساخنة عليها أن تجمع المادة العادية في كتل في حجم العناقيد المجرية الفائقة، وحينئذ، فإن هذه الكتل الهائلة تتفكك إلى كتل في حجم العناقيد المجرية، ثم تتفكك تلك الكتل وبالتالي إلى كتل أصغر في حجم المجرات. وهذا النظام من التركيب المنظم لأجزاء متراقبطة، يطلق عليه عادة سيناريو من أعلى إلى أسفل، لتشكيل بنية في الكون وليس ثمة غموض في إمكان حدوث تفكك للعنقيد المجرية الفائقة إلى مرات: وكما رأينا في الفصل الرابع، فإن التأثيرات العادية

الجانبية، كافية لتفكيك أي نسق من المادة المنتشرة في أرجاء الكون، وتحويلها إلى كتل صغيرة خفيفة لا شكل لها، وتكون المشكلة في المدى الزمني التي تجري فيه هذه الأحداث، فالمادة المظلمة الساخنة تتربّى بكون، تكون فيه عناقيد المجرات قديمة العهد، إلا أن المجرات ذاتها تكون في بداية مراحل التطور والنمو. وهذا عكس ما نلاحظه تماماً. وعلى سبيل المثال، فإن مجرتنا "الطريق اللبناني" تحتوى على نجوم عمرها أربعة عشر بليون سنة على الأقل، أي بالتقريب مثل عمر الكون. وبمعنى آخر، ثمة نجوم في مجرة "الطريق اللبناني" تشكلت في وقت سابق على نماذج المادة المظلمة الساخنة، التي تقترح كيفية تشكيل مجرة "الطريق اللبناني" ذاتها<sup>(١)</sup>.

وتشمل صعوبات أخرى تواجهنا إذا اعتبرنا أن النيوترينو الثقيل، أحد المرشحين كمصدر للمادة المظلمة، وسوف نناقش البعض من هذه الصعوبات في الفصل التاسع، أما في الوقت الراهن، فسوف نتفحص بشكل دقيق، الحقيقة بأن المادة المظلمة تتضمن مثل هذه المسافات الطويلة من التدفق الحر (وبالتالي تلك البنى الأولية الهائلة في الكون)، والتي تخلي عنها معظم علماء الكون.

### المادة المظلمة الباردة والتحيز

تتفادى المادة المظلمة الباردة هذه الصعوبة: بأن تتحرك الجسيمات بغاية البطء، عندما يفك اقترانها، حتى إنه لا يمكنها أن ترتحل بعيداً خلال مرحلة التدفق الحر، وبيناء على هذا، حتى تركيزات المادة الصغيرة، يمكنها أن تبقى على قيد الحياة، ومن ثم، يكون لدينا موقف مفاده أن المجموعات الصغيرة من المادة، تتجمع معًا في بادئ الأمر، وهذه المتكتسات الصغيرة، تتجمع لتشكل ما نلاحظه من بنية كونية على مستوى هائل، وهذا ما يطلق عليه تصور "من أسفل إلى أعلى" لتشكيل الكون.

(١) لمناقشة كيفية تحديد اعمار اجرام فضائية كالنجوم والاكوان، ارجع إلى كتابي "تأملات على ارتفاع عشرة الاف قدم". (المؤلف)

إلى جانب ذلك، فإن نتائج الإحصائيات والحسابات والتقديرات التي تمت على نماذج المادة المظلمة الباردة، أظهرت أن كل نموذج يقدم عدداً من النجاحات الأخرى. إنه يتمنى - على سبيل المثال - أن المجرات تتشكل على مستوى كلٍ مقيَد إلى حد ما. وأوضحت هذه الإحصائيات والحسابات والتقديرات، أن المادة المظلمة يجب أن تتشكل مجرات يبلغ حجمها من نحو واحد على ألف إلى حوالي واحد على عشرة آلاف مرة، من حجم مجرة "الطريق اللبني"، لا أكبر، ولا أصغر، وفي الواقع، فإن معظم المجرات المعروفة لها كتلٌ في حدود هذا المدى تقريباً، وقد سبب هذا التنظيم - دائمًا - حيرة كثيرون. لأن تلك الحقيقة (بالتناغم مع تفاصيل عديدة أخرى من منظومة تصنيف المجرات) يمكن تفسيره بسهولة، بافتراض المادة المظلمة الباردة. مما يعد انتصاراً باهراً في علم الكون.

ولكن لسوء الحظ، فإن نتائج مسح الإزاحة نحو الأحمر، واكتشاف الفراغات والافتئل، شكلت اعتراضات خطيرة للمادة المظلمة الباردة، باعتبارها المكون الرئيسي لبنية الكون، حتى إن (مارك ديفيد) من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وهو واحد من أشد المؤيدين لنظرية المادة المظلمة الباردة، كتب في أحد مصنفاته "لا يمكن قبول نموذج المادة المظلمة الباردة الآن، لأنها لا يمكن أن تنتج فراغات هائلة مثل تلك التي اكتشفت في كوكبة (العقاء)، وتكمِّل المشكلة في أن المسافة الصغيرة لتدفق المادة المظلمة الباردة، تعني أن الكون لابد أن يكون قد تشكل من أجرام فضائية صغيرة في حجم المجرة، ومن الصعوبة رؤية كيف أن التجمعات العشوائية للأجرام الفضائية الصغيرة، يمكن أن تشتمل على فراغات هائلة، من النوع الذي وجده المراقبون.

بيد أن الأفكار البارعة لا تفني بسهولة، بدأ (ديفيد) ومعاونوه في بيركلي، في التفكير بعمق، حول العلاقة بين المادة المظلمة والمضيئة. وأدركوا أنه عندما فك التقارن، أصبحت المادة المضيئة تمثل إلى الانجذاب إلى أكبر تركيزات المادة المظلمة المحاطة بها، أي إن المادة المضيئة لن تتشتت على نسق واحد في الفضاء، بل تمثل إلى التجمع حيث كانت كميات مروعة من المادة المظلمة، قد وجدت بالفعل. وإذا تطلعنا إلى الكون، فلن نشاهد المناطق التي توجد فيها كل المادة المظلمة، ولكن فقط تلك الواقع التي

جذبت فيها كمية كافية من المادة المضيئة، لتشكل مجرة أو عنقوداً مجرأً، وبلغا العصر، فإن نظرتنا إلى الكون بالضرورة تكون "منحازة"، ذلك أننا نرى المادة المضيئة لا غير. وجاءت مجموعة بيركلي، أنه من الممكن واقعاً، أن تكون المادة المظلمة منتشرة بشكل أكثر اتساقاً، من المادة المضيئة، ومن ثم، فإن الفراغات الهائلة التي نراها، ربما تحتوى بالفعل على مادة مظلمة داخلها.

ولعلنا بعقد مقارنة مبنية على التشابه الجزئي، سوف يساعدنا على إيضاح وجهة النظر هذه المتحيزة عن الكون، والتي تستلزم وجود المادة المظلمة الباردة، كأساس لها، تعلم أن قاع المحيط يزخر بالتلال الصغيرة والجبال. هب أن تلك التضاريس من المرتفعات، تنتشر باتجاهات مختلفة، أكثر أو أقل اتساقاً على قاع المحيط، وأن قاع المحيط يتميز بوجود تفجعات من الارتفاعات والانخفاضات الرقيقة والمنتظمة، كما يظهر في (الشكل ٧-١).




الشكل 7.1

وإذا كان بمقدورك رؤية قاع المحيط بالكامل، فسوف تقول إن المادة فيه موزعة - بشكل أو آخر - عشوائياً، ولن تكون هناك إشارات من ذلك الشيء، الذي أطلقنا عليه البنى ذات المدى الواسع، ومع هذا، فلنفترض جدلاً، بأنك لا تستطيع سوى رؤية الأرض التي تقع أعلى مستوى المحيط، ومن ثم، كما هو موضح، سوف ترى مياه المحيط "تنفك" بواسطة سلسلة من الجزر، بيد أن هذه الجزر، سوف تمثل إلى التجمع على شكل عنقود في الواقع التي توجد فيها الأجزاء العالية من تفجعات المرتفعات والانخفاضات الرقيقة المنتظمة<sup>(١)</sup> وإذا نظرت إلى الجزر فحسب، يمكنك الاستنتاج بأن

(١) في الواقع أن هذه هي الطريقة التي تشكلت بها جزر هاواي، من براكين أعماق المياه. (المؤلف)

التلال تحت سطح المحيط، توجد في عناقيد، وأن بنية القاع عبارة عن مناطق تركيز شديد من التلال التي تتوزع مع فراغات ضخمة. وتلك الفراغات يمكن رؤيتها كامتدادات هائلة من المياه المنبسطة، دون أى جزء.

وينفس هذه الطريقة تماماً - كما يجادل الباحثون - لا تتبع الفراغات والفتائل التي نراها في السماء، ذلك التوزيع الحقيقي للمادة في الكون، وإنما فقط القمم والنقاط العالية. وأعملوا هذه الفكرة لكي تصاغ بالطريقة التالية. قاموا أولاً بحساب التوزيع الذي توقعوا أن توجد به المادة المظلمة الباردة، وحصلوا على نموذج قريب مما هو موضح في (الشكل ٧-٢). ثم أخذوا فقط قمم ذلك التوزيع - إنها تلك الأجزاء التي تعلو الخط المنقط - وقالوا بأن هذه هي الواقع التي نرى فيها المادة المضيئة التي تجمعت في شكل مجرات.



الشكل ٧.٢

واستخدم (ديفييد) وزملاؤه نفس هذه الفكرة، لوضع مخطط بياني للتوزيعات المجرات، يشبه إلى حد كبير، ما يرصد بالفعل في السماء، وسواء كان ذلك قد قيل عنه إنه وجد حلّاً لشكلة بنية الكون، فهذا أمر آخر. وهذا النموذج الذي استند على فكرة التحين، مازال يتعرض للانتقادات، حيث لم يفسر وجود فراغات هائلة ذات جواف حادة. على الرغم من أن الاكتشاف مجرات صغيرة في فراغ كوكبة (العقاء)، كان هبة من السماء للباحثين، ذلك أنه أعمقهم من الحاجة إلى إخراج كلّ المادة المضيئة من الفراغات التي اكتشفوها، والرأي عندي أنه - في الوقت الحاضر - لا يمكن استبعاد المادة المظلمة الباردة بما تتضمنه من تحيز، كتفسير لشكلة بنية الكون.

ومازال المؤيدون لها، يبذلون الجهد والكثير من الوقت، لتفادي الانتقادات الحادة، وهم يقومون بمحاولة "ترقيع" التصدعات في النظرية، وسوف تنتابني الدهشة، إذا كانت سوف تعطينا القول الفصل لمشاكلنا، وعلق (مارك ديفيد) بنفسه، في أجتماع عقد مؤخراً، بقوله "أعتقد أن هذا ليس حلاً نهائياً". ومع هذا، تظل أحد أفضل البراهين، لتفسير ما اكتشفناه في السماء.

## وماذا الآن؟

يبعدون إلينا، أن المادة المظلمة تؤدي دوراً مهماً، في تشكيل بنية على مستوى هائل في الكون، ذلك أنه يمكنها أن تفك اقترانها في وقت مبكر، وتكون تركيزات كثيرة، تقوم المادة المضيئة بالانجداب إليها لاحقاً. إذا صرحت بذلك، عندئذ سوف تثار بعض التساؤلات الواضحة. أولها - الذي سوف تعالجه في الفصل التالي - هو كم من المادة المظلمة يريض في الكون. والثاني، وقد أشرنا إليه آنفًا، هو التساؤل عن طبيعة المادة المظلمة. ويبعدوا واصحاً أن كل ما نحتاج إليه. لنتجكونا ببنية ذات مستوى مرتفع - وجود مادة مكونة من جسيمات ثقيلة (حتى تتمكن من ممارسة قوة تجاذبية)، تتحرك ببطء، عندما يفك اقترانها. ويغض النظر عن هذه المتطلبات "المتواضعة"، فإن علم الكون لا يضع قيوداً، على الشكل الذي يمكن أن تتخذه جسيمات المادة المظلمة. وهذا شيء جيد، لأنه يعني أننا لم نقيد أفكارنا الكونية بإحكام إلى مرشح معين، ليكون جسيماً للمادة المظلمة. وفي نفس الوقت، يحد ذلك الافتقار لتعيين مواصفات المرشح، قدرتنا لتحديد طبيعة المادة المظلمة، وفي الواقع، سوف نرى أن أفضل ما نستطيع عمله، القول بأننا لا نعرف ما الذي يشكل ما يصل إلى تسعمائة من بنية الكون، بيد أننا نرد بالتأكيد، أنها ليست شيئاً رأيناها - أبداً - من قبل.

## الفصل الثامن

### المادة المظلمة والكتلة المفقودة: ماذا يجب أن يكون مقدارها؟

ـ هوذا الزارع قد خرج ليزدع..

ـ وفيما هو يزدع سقط بعضٌ على الطريق،

ـ فنجات الطير وأكلت:

ـ وسقط آخر على الأماكن المُحْجَرَة،

ـ حيث لم تكن له تربة كثيرة..

ـ وسقط آخر على الشوك

ـ فطلع الشوك وختقه:

ـ وسقط آخر على الأرض الجيدة

ـ فلأعطي شمراً..

(إنجيل متى - الإصلاح ١٣ : عدد ٩-٣)

(الكتاب المقدس)

ربما تفك، وفق ما يتراوح لك ظاهرياً، أن اكتشاف شيء ما كالمادة المظلمة، سوف يقلب المجتمع الفلكي رأساً على عقب، وسيسبب أشكالاً عددة من الشكوك والجادلات بين "الأتراك الشباب"<sup>(١)</sup> الحريصين على تطوير علم جديد و"المحافظين القدامى"<sup>(٢)</sup> الذين يحاولون الدفاع عن وجهات النظر التقليدية، وفي الحقيقة، لم يُنكر فقط مثل هذا الجدال، وبالطبع، فإن اكتشاف المادة المظلمة يبدو واحداً من أكثر أسرار العلم الحديث، المحتفظ بها في طي الكتمان. وعدم الاكتئاث الذي استقبل به أول التصريرات عن هذا الاكتشاف، تعزو إلى حقيقة أن معظم علماء الفلك، قد اعتنوا لفترة زمنية طويلة، أن مثل هذه المادة يجب أن توجد في مكان ما، من الكون، إنهم حتى أطلقوا اسماً على تلك المادة - "الكتلة المفقودة" - وذلك قبل التوصل إلى إماتة اللثام عن أي جزء منفرد من دليل، يبني عن وجود المادة المظلمة.

إن الصورة الذهنية المألوفة للعلماء، أنهم مجموعة من متصلبي الرأي لدرجة كبيرة، أفراد لا يصدقون إلا بالمشاهدة الفعلية، والذين لا يتقبلون أى أمر كحقيقة أو واقع، إلا بعد أن تثبت صحته، بما لا يقبل الشك، في المختبر. والحاصل فعلاً، أن الاعتبارات "الرقيقة" مثل الجمال والرونق والبساطة، تؤدي بدوراً أكبر بكثير - في الطريقة التي يفكر بها العلماء - مما يعتقد الناس. وإذا لم تكن الفكرة جذابة - متألقة ومقيولة في أعماق الوجدان عندما يتم تفسيرها - فإنه قد يقع على عبء المؤيدين لها التوصل إلى دليل مقنع للغاية، قبل أن يتقبلها المجتمع العلمي السائد.

وبالفعل، طورت اختباراً سهلاً لتحديد ذلك الوقت الصعب الذي سوف يعاني منه المتحدث، إذا ما شعر في ترويج أفكاره - أو أفكارها - للمجتمع العلمي على نطاق واسع. وعندما تقترب فكرة معينة، مثلًا خلال محاضرة، فإنتي أنظر إلى جمهور الحاضرين. فإذا ما رأيت أنهم يبتسمون ويؤمنون ببرؤوسهم، وهم يتبعون المحاضرة، عندئذ أدرك أن هناك إحران تقدم في فهمهم بون أي صعوبة. وإلا، فلتختذر، إذ إن قبول فكرة المادة المظلمة من الاتجاه العلمي السائد، يتبع تماماً هذا النموذج.

(١) اتحاد لمجموعات عديدة لإصلاح الإدارة في الإمبراطورية العثمانية. (المترجم)

(٢) عناصر النخبة من المخضرين في المرس الإمبراطوري لتابليون. (المترجم)

ولذا قبلت هذه الفكرة بسهولة، فإن هذا يعني - غالباً - أن الناس يريدون تقبلها، وأنها فكرة مهد لها الطريق، والكون المتمدد الذي اكتشفه (هابل) يؤدى بارتياح - كما سوف نرى في التو - إلى الشعور بأن كوناً معظمها من مادة غير مرئية، أكثر إمتداعاً وطبيعياً، من كون كل شيء فيه مضيئاً ومرئياً. ومن ثم، عندما اكتشفت المادة المظلمة، بدأت الإيماءات والابتسamas، وقال الجميع "بالطبع، إذ كيف يمكن أن تكون غير ذلك؟" وكان يبيو طبيعياً للغاية، أن أحداً لم يزعج نفسه بإطلاع الصحفيين عليه.

### رمح (أرخيتاس) في كون متعدد

أتذكر مجادلة (أرخيتاس) - التي تمت مناقشتها في مقدمة هذا الكتاب - عن الكون اللانهائي؟ حسناً، كانت المشكلة الوحيدة في استدلالاته، أنه أخطأ في تحديد اتجاه الرمح. لقد أراد أن يسير حامل رمحه إلى حافة الكون، ويقذف برمحه أفقياً. وماذا كان يدور بذهنه (وما الذي نعتقده عندما نقرأ مجادلاته) هو شيء ما، يشبه الوضع الموضح إلى اليسار في (الشكل ٨-١)، فقد ألقى بالرمح بطريقة تجعل قوة الجاذبية تعمل في اتجاه متعاكس مع اتجاه الرمية.



الشكل 8.1

وفي كون هابل - على الرغم من ذلك - فإن حامل الرمح سوف يواجه موقفاً يماثل ما هو موضع إلى اليمين في (الشكل ٨-١). سيلقى بالرمح إلى الخارج، وستعمل قوة الجاذبية في نفس اتجاه الرمية، أى إنها سوف تعمل بطريقة معينة، تؤدي إلى إبطاء سرعة الرمح، وقد تجذبه إلى الوراء، حيث الكون المعروف، وإذا عاش (أرخيتاس) إلى يومنا هذا، فإنه - دون شك - سوف يدرك أن أفضل وسيلة لاختبار حجم الكون، تتضمن قذف الرمح رأسياً، تاركاً إياه يحاول الانطلاق بعيداً عن الأرض، بينما تعمل قوة الجاذبية جاهدة، على جذبه إلى الخلف من جديد.

ورمح (أرخيتاس) الذي يناسب عصرنا، هو "كوازير" مثل ذلك الذي يطلق عليه QSO1208 + 1011، وبعد - حتى الآن - أبعد جرم فضائي تم رصده في الكون. لقد قذف حامل الرمح، برمجه بحيث يتحرك بعيداً عنا (وكذلك عن كثلة الكون المعروف) بسرعة تقترب من سرعة الضوء<sup>(١)</sup>. والسؤال الذي يثار حول QSO1208 + 1011 هو نفس التساؤل الذي أراد (أرخيتاس) أن يستوضحه عن رمحه. هل يواصل انطلاقه إلى أعلى، أم يتحول عن مساره إلى اتجاه معاكس ويعود إلى نقطة انطلاقه، في وقت ما في المستقبل؟

ولو تصورنا حامل الرمح يقف على سطح الأرض، بدلاً من حافة الكون، سوف تكون الإجابة عن السؤال أكثر بساطة. نعلم حجم المادة التي يشتمل عليها كوكب الأرض، ومن ثم، فإننا نعرف تماماً مدى شدة القوة التجاذبية التي سوف تبذلها على الرمح. وسواء استطاع الرمح أن يهرب إلى الفضاء أو أن يعود إلى الأرض، فإن هذا يعتمد على شيء واحد فقط، هو مدى سرعة انطلاق الرمح في الفضاء، فإذا كانت أكثر من سبعة أميال<sup>(٢)</sup> في الثانية، سوف يتمكن الرمح من الهروب من جاذبية الأرض. وبخلاف ذلك، سوف يرتد من جديد، وهذا كل ما في الأمر. وعلى الرغم من أن

(١) سرعة الضوء في الفراغ . . . ٣٠٠ كيلومتر في الثانية. (المترجم)

(٢) الميل يساوى ١٦٠٩ كيلومتر. (المترجم)

(أرخيتاس) سيلاقى الأمرىن فى تخيل رمح ينطلق بهذه السرعة، فإن "حامى الرمح" فى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، لن يجد صعوبة على الإطلاق، وفي تحقيق تلك السرعة.

وفي الكوازرات النائية، فإن الصعوبة التى تواجهنا هى العكس تماماً، من هروب الرمح من كوكب الأرض. ففى حالة الرمح، نعرف كتلة الأرض، وعلينا أن نحسب السرعة المطلوبة للهروب. أما فى حالة الكوازز، فإننا نعرف السرعة، ولكننا لا نعرف حجم الكتلة التى تجذبها إلى الوراء.

وبالتفكير ملياً فى مصير الكوازز الذى يبعد عنا بمسافة مروعة، فإن المرء سوف يدرك - تواً - أن القوة الوحيدة التى يمكنها ممارسة ضغطاً لتطيّن من سرعته، هى القوة التجاذبية، لبقية الكتلة فى الكون، وتعمل كل كتلة من كتل الكون المتوازية مع الكتلة الكلية للأرض - على الرمح المنطلق من سطح كوكب الأرض. وتحدد كلتا الكتلتين، مقدار سرعة الهروب التى يجب أن تتوفر لأى شىء. ومن ثم، عندما نتسائل عما إذا كان الكوازز سوف يتحول - فى أى وقت - عن مساره إلى الاتجاه المعاكس، فإننا فى حقيقة الأمر، نسأل عن ماهية الكتلة الكلية للكون، أو بالأحرى، نسأل: ما وزن الكون؟

ولما كانت المادة المظلمة - مثل مثيلتها المادة المضيئة - يمكنها أن تبذل قوة تجاذبية، فهى أيضاً سوف تبذل قوة على ذلك الكوازز النائى.

وهذه النقطة البالغة الواضح والمدركة بسهولة، يجب أن تطرح للمناقشة، لأننا عندما نقوم بوزن الكون، فإن علينا أن نضع كلاً من المادة المظلمة، والمادة المضيئة فى كفتي ميزان، إذا ما أردنا الحصول على إجابة جديرة بالثقة ويمكن الاعتماد عليها.

وتبعد القوة المبنولة على كوازز قصى، بوحد من أهم الأسئلة، التى يمكننا طرحها عن كون هابيل: هل يستمر التمدد إلى الأبد، أم أنه سوف يتوقف فى زمان غير محدد فى المستقبل، ويعكس اتجاهه؟ وهذا السؤال يفرض نفسه بقوة ويستدعى الانتباه بشدة، بمجرد رسوخ حقيقة الكون المتعدد.

وهنالك فقط ثلث إجابات محتملة لهذا السؤال، يتعلّق كل منها بنوع مختلف من الكون:

(١) ربما لا توجد ثمة مادة كافية في الكون، لتعكس اتجاه التمدد. في هذه الحالة، فإن الكوازرات التي تتوجه إلى الخارج وكذلك المجرات، سوف تبطئ بمرور الوقت، ولكنها لن تتوقف أبداً. وعندئذ نقول بأن الكون "مفتوح".

(٢) ربما تكون هناك كتلة كافية لتبطئ وتوقف ثم تعكس اتجاه حركة الأجرام الفضائية الأكثر بعداً في الكون. وأن التمدد الكوني الذي نلاحظه في الوقت الحاضر، سوف يتحول إلى تقلص كوني، الذي يشير إليه بعض علماء الفلك (وكانهم يتذرون) بالانكماس الأعظم. وفي هذه الحالة، فإننا نقول بأن الكون "مغلق".

(٣) ربما تكون كتلة الكون مروعة، بحيث تكون القوة التجاذبية، كافية بالكاد، لتبطئ وتوقف هذه الأجرام الفضائية الأكثر بعداً في الكون، بعد مرور زمن غير محدد.

عندئذ، سوف يبطئ تمدد الكون إلى الأبد، ويتوقف عند زمن لا متناه، بيد أنه لن يعكس اتجاهه أبداً. ويقال عن مثل هذا الكون "مسطح". وكما سوف نرى، فإنه من بين هذه الاحتمالات الثلاثة، فإن الكون المسطح هو الأكثر بعثاً للاهتمام. وإلى هنا، قد ناقشنا تمدد الكون، وعلاقته بالقوى التجاذبية، التي تبطئ من سرعة المجرات القصبة. وهذا أسلوب في التعبير يسهل علينا فهمه، لأنه مشابه للخبرة التي نكتسبها في حياتنا اليومية. ولكنها ليست اللغة التي يمكن لعالم الفيزياء الفلكية استخدامها. وفي الأدب العلمي، عادة ما تستخدم مفردات اللغة التي وردت مصطلحاتها في النظرية النسبيّة العامة لأينشتين. وبمعنى آخر، فإننا - حتى هذه النقطة - قد استخدمنا لغة نيوتن، لأنها مألوفة أكثر. ولأن، أريد أن أستطرد بإيجاز لأعرف بلغة أينشتين، إذ إنها مشوقة ومثيرة للاهتمام في حد ذاتها، كما أنها تجعل بعض الموضوعات الفلكية، أكثر سهولة في فهمها.

## الكون المفتوح والمغلق في النظرية النسبية العامة لأينشتين

إن أول شيء يجب أن نعرفه عن النظرية النسبية العامة لأينشتين، هو أنها - على مستوى المفاهيم - لا تتطلب مجهدًا خارقًا لاستيعابها. إن الفكرة الشائعة عن النظرية النسبية أنها شيء يتمتع به بأسلوب غامض، ثلة من العلماء الملحين. وهم الذين يمكنهم التعامل معها، وهذه مجرد خرافات لا ترقى إلى مستوى الحقيقة، كما أنه ليس صحيحاً أن مجموعة من نحو اثنتي عشر شخصاً فقط في العالم كله، يمكنهم فهم هذه النظرية. لعل هذه الانطباعات كانت مقبولة ظاهرياً في العشرينيات من القرن العشرين، أما اليوم، فإنها تعد مجرد أفكار سانحة. إن المفاهيم الأساسية للنسبية، تدرس بشكل تقليدي لطلاب العلوم والفنون في المناهج التمهيدية للفلك والفيزياء، ولا يمكن لأى طالب أن يسجل في مقرر الفيزياء المقدم في إحدى الكليات الجامعية، دون أن يكون متمنياً تماماً من مبادئها. وحتى التواحى الرياضية البحتة في النظرية النسبية العامة، يتم تدريسها - في كل عام - لمن الناس الحاصلين على شهادات جامعية، وأنتمي أنه في نهاية هذا الاستطراد، سوف يكون واضحًا أن فهم النظرية النسبية، في مقدور أي شخص يرغب في إعمال فكرة - أو فكرها - في مفاهيمها الأساسية.

وندعونا نبدأ بأحد أكثر المفاهيم المروعة، وهي التي تتعلق بالزمكان، رباعي الأبعاد. مثل الرجل الذي انتابتذه الدهشة عندما اكتشف أنه يتحدث ثرثراً طوال حياته، إن معظم الناس يفاجئون بأنهم كانوا يستخدمون هذا المفهوم طوال الوقت.

حاول أن تتذكر آخر مرة، قلت فيها شيئاً ما مثل "سأكون في شيكاغو يوم الثلاثاء القادم"، إن هذه العبارة تتضمن في ثناياها، معلومات يمكن تصنيفها تحت عنوانين رئيسيين، "متى" و"أين".

كم عدد الأرقام التي تحتاجها لتحديد هذه الـ "متى" و"أين"؟ أولاً، يجب عليك أن تحدد موقع مدينة شيكاغو. وهذا يتطلب توفر ثلاثة أرقام. إذ يمكنك - على سبيل المثال - استخدام خط العرض وخط الطول والارتفاع لتحديد نقطة في الفضاء، نطلق عليها

(شيكاغو). وعموماً، فائت في حاجة إلى ثلاثة أرقام، لكي تذكر على وجه التحديد أي نقطة في فضائنا العادي ثلاثي الأبعاد، أنت أيضاً في حاجة إلى رقم واحد لتعيين بالضبط الوقت الذي تتضمنه عبارتك، ربما يكون ذلك الرقم هو الوقت في يوم الثلاثاء، الذي سوف تهبط فيه طائرتك. ومن ثم، لنتمكن من إعطاء معنى العبارة على نحو صحيح، ثمة أربعة أرقام تحتاجها، ثلاثة منها تتعلق بالموقع المكانى وواحد زمنى، ويجمعهم معاً، فإن هذه الأرقام الأربع، تشكل وصفاً رباعياً للأبعاد.

وفي حياتنا اليومية، عادة لا نفكر في الزمن، كبعد رابع، ذلك لأننا نفترض أن نهر الزمن هو نفسه في "نيروبي"<sup>(١)</sup> أو في النجم "ألفا قنطروس"<sup>(٢)</sup>، كما هو في مدينة (شيكاغو). ولأغراض ممارسة الحياة اليومية، وهذا الافتراض حقيقياً إلى حد ما، وبالتأكيد هو حقيقي ضمن الحدود التي نستخدم فيها الزمن خلال حياتنا اليومية. لا تبين الساعات توقيتاً مختلفاً، عندما نرتحل من مكان إلى آخر، كما أنها لا تتغير عندما نركب طائرة أو سيارة<sup>(٣)</sup>.

بيد أننا عندما نتحرك بسرعة تقترب من سرعة الضوء، أو عندما نكون قريين من كتل بالغة الصخامة، فإن توقعاتنا اليومية عن استقلال الزمان والمكان، لا تعد تصف الكون بدقة. وفي هذه البيئات غير المعتادة، فإن البعد الرابع - الزمن - يصبح معتقداً ومتشاركاً مع الأبعاد الثلاثة الأخرى. تماماً كما لو أنك لا تستطيع السفر من (شيكاغو) إلى (نيويورك)، بمجرد تغيير خط العرض وخط الطول فقط (بل يجب عليك أيضاً أن تغير الارتفاع)، ومن ثم، فعندما تقارن الحركة بين مركبتين فضائيتين صاروخيتين تتطلقان بسرعة هائلة، سوف تجد تغيراً ليس فقط في الأبعاد المكانية، بل أيضاً في البعد الرابع وهو الزمن.

(١) عاصمة كينيا بأفريقيا. (المترجم)

(٢) نجم في كوكبة قنطروس يبعد عن الأرض بحوالي 4,2 سنة ضوئية. (المترجم)

(٣) إن التغيرات التي تتعلق بالمناطق الزمنية، مجرد اتفاقيات دولية قام بها البشر، وهي لا تدخل في إطار ما نناقش هنا. (المؤلف)

وسوف تتحرك الساعات في مركبتي الفضاء بمعدلات متباينة<sup>(١)</sup>، ويشرح هذا الترابط لماذا نتحدث في الفيزياء النيوتونية عن "الزمان والمكان"، ولكن في الفيزياء النسبية الحديثة نقول "الزمكان".

نحن الآن مستعدون لمناقشة مفهوم آخر للنسبية، ذلك الذي يتعلق بمصطلح "طى الزمكان". وهذه هي أكثر الأفكار أهمية والتي يجب إدراكها، لكن نفهم بنية الكون ذات الامتداد المروع، ولكن بادئ ذي بدء، أرجو أن تلاحظ أن هناك نظريتين منفصلتين للنسبية: الخاصة والعامة. وكلاهما مستمد من مبدأ أساسى واحد، ألا وهو مبدأ النسبية. ومفاده أن "قوانين الطبيعة كما يدركها أى مراقب، متماثلة".

إذا كان المراقبون يتحركون بسرعات ثابتة، فإن اتباع النتائج الرياضية لمبدأ النسبية، يقودنا إلى النظرية الخاصة للنسبية. وهذه النظرية - التي نشرها أينشتين في العام ١٩٠٥ - تشتمل على معظم التأثيرات المألوفة وغير المتوقعة للنسبية، وأعني بها الساعات سريعة الحركة التي تبطئ في توقيتها، والأشياء التي يزداد ثقلها عندما يرتفع معدل تسارعها، وهلم جرا.

وقد تم اختبار هذه النظرية جيداً بطرق عده. وفي الواقع، فإن معجلات الجسيمات العملاقة تسرع البروتونات إلى ما يقرب من سرعة الضوء، هي أمثلة عملية لأجهزة صممت وفقاً لمبادئ نظرية النسبية الخاصة. واستمرار تشغيل معجلات الجسيمات بكفاءة، يقدم تاكيداً يومياً على صحة النظرية.

إذا عقنا تعريفنا للمراقب، ليتضمن حتى هؤلاء المراقبين الذين يتحركون بتسارع، عندئذ يؤدي بنا المبدأ إلى النظرية النسبية العامة، وهي نظرية تكتنفها الكثير من الصعوبات الكثيرة، من وجهة النظر الرياضية. وكان أينشتين قد نشرها في العام ١٩١٥. وتعد نظرية النسبية العامة، هي أفضل نظرية حالياً عن الجانبية، وكذلك فإنها تنشئ

---

(١) لكي تكون أكثر دقة، سوف تتغير الساعات، عندما تنطلق مركبتي الفضاء بأى سرعة، ولكن عندما تقتربان من سرعة الضوء، فإن التغير في معدلات الساعات، سيصبح مهماً. تجد مناقشة كاملة أكثر عن النظرية النسبية العامة في كتابي "الأفق غير المترفع" "The unexpected Vista" (المؤلف)

مفهوم طى الزمكان، وإذا تفاضينا عن الرياضيات، فابتلى سأحاول الآن أن أوضح لك كيف أن التعجيل يرتبط بالجاذبية، من خلال مبدأ النسبية، وبعدها سوف أقترح طريقة بسيطة، لتكون صورة ذهنية للكون، كما تراها عيني أينشتين.

ربما مررت بتجربة الولوج إلى مصعد يقف في الور الأرضى لبني مرتفع، وعندما يتحرك إلى أعلى، تشعر بنفسك وأنت تدفع من أسفل حتى تصل إلى الطابق المطلوب. وثمة احتمالات، بذلك قد اجتازت عكس هذه التجربة، عندما تهبط بالمصعد من أعلى طابق، إذ سوف تشعر بنفسك وأنت على وشك التطاو، عندما يبدأ المصعد في الهبوط من أعلى، وهذه المشاعر ليست مجرد وهم، وإذا كنت تقف على ميزان صغير داخل المصعد، فسوف ترى "وزنك" - بالفعل - يزداد في رحلة الصعود وينخفض عند الهبوط.

وهذا التغير الظاهري في وزنك داخل المصعد المتحرك، يرتبط مع تسارع وتباطؤ حجرة المصعد. (وتعرف أن ذلك حقيقى لأنك تشعر بالتغيير فقط عندما يتحرك المصعد أو يتوقف). وهذا - باختصار - هو السبب فى أن النظرية النسبية العامة هي نظرية عن الجاذبية. ويخبرنا مبدأ النسبية، أن كل مراقب يتحرك بتسارع أم لا، لابد أن يرى نفس قوانين الفيزياء، تعمل فى إطاره - أو إطاراتها - المرجعى<sup>(١)</sup>. ولو فكرت فى تجربتك فى الوقوف على كفة الميزان الصغير ومراقبة قراءة الأرقام فى المقياس، ويخبرك المبدأ بأنه ليس ثمة طريقة لتحديد مما إذا كانت قراءة الميزان، ترجع إلى الحقيقة بذلك تقف على جسم يخضع لقوة الجاذبية، مثل الأرض، أو أنك فوق جسم يتسارع فى أعماق الفضاء بين النجوم. وفي كلا الموقفين، سوف يظهر الميزان الثقل (وحدة قياس قوة الجاذبية). وباختصار، فإن المبدأ يوضح بأنه ليس ثمة تجربة يمكن القيام بها، بحيث تخبرنا بما إذا كان فى مركبة فضائية متتسارعة، أو فوق سطح أحد الكواكب.

وهذه العلاقة بين التسارع وأثار الجاذبية، هي حجر الزاوية لنظرية النسبية العامة. ولا شك أن الجوانب الرياضية لهذه النظرية باللغة الصعوبة، بيد أن النتائج


---

(١) وإذا أردت إجراء هذه التجربة، فابتلى أقترح أن تختار الوقت الذى يكون حولك عدد قليل من الناس، لقد قمت بالتجربة فى بناءة برج سينز فى شيكاغو، وهى من أعلى المباني فى العالم، وحصلت على نظارات غريبة من الذين كانوا معى فى حجرة المصعد. (المؤلف)

الحقيقة عندما نبدأ من هذه العلاقة وننبعها إلى خاتامها المنطقى، فمن السهل تصورها ذهنياً، خاصة مع الاستعانة بضرب الأمثلة المبنية على التشابه الجزئي.

تخيل لوحة من المطاط المرن، مرسومة على هيئة شبكة قضبان متصلبة<sup>(١)</sup>، كما هو موضح إلى اليسار، في (الشكل ٨-٢). ثم تصور إلقاء محمول كبير للكريات الصلبة، فوق لوحة المطاط المرن. سوف تكون النتيجة تشويهاً لها، كما هو موضح على اليمين في (الشكل ٨-٢). وإذا دحرجت بلية زجاجية عبر هذه اللوحة المشوهة، ستتجد أن مسارها، سوف ينحرف عندما ترتطم بالوهة<sup>(٢)</sup> كما هو مبين في نفس الشكل. وكما هي الحال في المصعد، ليس ثمة طريقة، تعرف بها عما إذا كانت البلية الزجاجية قد انحرفت وغيرت مسارها، لأن لوحة المطاط شوهرت أو أن قوة تجاذبية، تعمل بين البلية الزجاجية ومحمل الكريات. ويمكنني آخر لن يكون هناك فرق ما دام الأمر يتعلق بحركة البلية الزجاجية، بين كون تحرّف فيه محمل الكريات بتشويه اللوح المطاطي، وأن هذا التشويه - بيوره - يحرّف البلية الزجاجية. والاختلاف بين هاتين الطريقتين في النظر إلى حركة البلية الزجاجية - في الأساس - هو الفرق بين نيوتن وأينشتين.

#### *Dark Matter and Missing Mass: How Much Should There Be?*



الشكل 8.2


(١) مجموعة من المحاور للإحداثيات يمكن عن طريقها تحديد الموقع والحركة. (المترجم)

(٢) جزء منخفض عما حوله. (المترجم)

في كون أينشتين لا تعمل القوى، وما يحدث هو أن وجود المادة يطوي بنية الزمكان، كما أن محمل الكريات شوّذ اللوح المطاطي، ونعزى الحركات التي اعتدنا أن تكون ملزمة لتأثير القرى، إلى تشوّهات في بنية الزمكان، أحدها وجود المادة، وليس كون أينشتين ذلك الذي يناقض كون نيوتن، بل على الأصح، أن نفس الحقائق الملاحظة، قد تم تفسيرها بشكل مختلف.

وعلى سبيل المثال، يمكننا إعادة صياغة السؤال عن الكون المفتوح والكون المغلق، الذي تمت مناقشته آنفاً في إطار لغة ومصطلحات نشاط النسبية العامة، تخيل تعاظم كتلة محمل الكريات، في مثالنا، وفي نهاية الأمر، سوف نجد أمامنا موقفاً، يزداد فيه عمق التشوه أكثر وأكثر، بتأثير ثقل محمل الكريات، إلى أن يصل إلى مرحلة ينفلق فيها على نفسه.

والآن، تخيل ما الذي يمكن أن يحدث للبلية الزجاجية، في داخل تلك الوحدة الكروية الشكل، المستقلة والكاملة بذاتها، والتي أحدها الكتلة الضخمة لمحمل الكريات. وربما تستطيع أن تدفع البلية الزجاجية إلى خارج الواقع، مزوداً إياها بقليل من السرعة، وفي هذه الحالة، سوف تتدحرج لدرجة معينة، إلا أعلى جدران الفقاعة ثم سرعان ما تسقط إلى أسفل (انظر الشكل ٨-٣ إلى اليسار).



الشكل 8.3

ومن ناحية أخرى، تخيل أنك تدفع بقوة البلية من القاع، بسرعة كبيرة للغاية. وفي هذه الحالة ربما تنطلق على طول الطريق حول الفتحة المكونة والملتفة حول نفسها. ولكن بصرف النظر عن مدى سرعة البلية، فإنه عاجلاً أو آجلاً، سوف ترتد إلى أسفل من جديد، إلى حيث بدأ انطلاقها، ويماثل هذا التشبيه، ما أطلقنا عليه "الكون المغلق"، وبمعنى آخر، إذا كانت الكتلة كبيرة بقدر كافٍ، يمكنك أن تبني وجهة النظر النيوتينية، وتقول بأنها تمارس قوة تجاذبية كافية، لجذب البلية إلى أسفل أو قد تأخذ وجهة نظر أينشتين، وتقول بأن الكتلة كبيرة بقدر كافٍ، بحيث تطوى الفضاء على نفسه (أى "تغلقه"). وفي كلتا الحالتين، سوف تصل في النهاية إلى نفس الترتيبة.

وإذا كانت كتلة محمل الكريات كبيرة بقدر كافٍ، سوف ينتج ما الذي أطلقنا عليه "كون مسطح". ويعيناً عن محمل الكريات، سوف تسترجع شبكة القضبان.المتصالبة - إلى حد ما - شكله العادى غير المشوه. وكما في (الشكل ٨-٢) إلى اليمين، سوف تكون شبكة القضبان المتصالبة، سطحاً مستوياً ومنبسطاً، يمكن أن تدرج عليه البلية الزجاجية (وهذا هو أصل الاصطلاح "الكون المسطح"). وإذا كانت الكتلة أقل من المقدار المطلوب، لإنتاج هذا "التسطيح"، يكون الكون في هذه الحالة، مفتوحاً. ولا يمكن التعبر عن هذا بالرسم على ورقة ذات بعدين اثنين (إذ إننا - برغم كل شيء - نتعامل مع أربعة أبعاد). إننى أفكر في الكون المفتوح على أنه يشابه تقريباً، سطح سرج<sup>(١)</sup>، وما إن يبدأ محمل الكريات في التدرج حتى يستمر، ولن يعود أبداً إلى الخلف.

وكما ترى، فإن التشابهات عديدة بين الطرق التقليدية والنسبية للنظر إلى الحركة، وهذا الأمر لا يثير الدهشة، إذ إن كلّيّهما يصف نفس القوة التجاذبية. وإذا توخيت الدقة، فليس هناك سوى أمثلة قليلة يمكن بها بالفعل قياس الاختلافات بين طريقتي النظر إلى الجاذبية. عموماً، تتطابق النسبية على مستويات المسافات المروعة وعلى الكتل البالغة الضخامة، ولكن تعطى نفس النتائج كما في الجاذبية النيوتينية، تقريباً

---

(١) يستخدم لوضع حمل على حيوان (غالباً حسان). (المترجم)

لكل المواقف، حيث يمكن بالفعل إجراء القياسات (ويعنى آخر، لكل الظواهر التى تتضمن فى ثياتها مسافات كونية أقل من عدة ملايين سنة ضوئية).

وتقودنا هذه الحقيقة إلى أحد أكثر المواقف إثارة للدهشة، فى تاريخ العلم، إن النظرية النسبية العامة، على خلاف النظرية النسبية الخاصة، قد اختبرت بشكل بالغ الدقة فى موقفين لا غير<sup>(١)</sup>. وعلى الرغم من الحقيقة، بأن نظرية النسبية العامة، من أكثر النظريات - على الإطلاق - ثورية، وقد قبلها العلماء على أساس تقاد تكون جمالية فنية. وتم قبولها بسرور، لأنها تتضمن مقداراً من الجمال والذوق الرفيع، ومن ثم، يجب أن تكون صحيحة. وهذا القبول من العلماء، دليل مقنع وداعي، إذ إن الرأى عندى، أن النتائج العلمية عادة يتم التوصل إليها بعمليات أكثر تعقيداً، من مجرد تقييم بسيط للحقائق التجريبية.

وعلى أية حال، فمن الواضح أنه أىما كانت اللغة التى نستخدمها لوصف التساؤل عن الكون المفتوح والكون المغلق، وتعتمد الإجابة على كمية واحدة: الكتلة الكلية للكون. وعن هذه الكمية يمكننا أن نوجه سؤالين متباهين: ما مقدار الكتلة هناك، وكم يجب أن يكون مقدار هذه الكتلة؟ دعنا نتفحص هذين السؤالين باختصار.

### ما مقدار المادة التى نراها؟

إجمالى كتلة المادة فى الكون، عادة يعطى فى شكل مصطلح هو "الكثافة الحرجة للكون"<sup>(٢)</sup> ويرمز لها بالحرفين  $C\Omega$ . وتلك هي كثافة المادة التى تلزم لتشكيل كون

(١) كان اختبارى النظرية النسبية العامة، عبارة عن اتحانه الضوء وال WAVES الراديوية، عندما يدوران حول الشمس، وكذلك بعض التأثيرات الطفيفة المحددة فى مدار كوكب عطارد، وثمة اختبار ثالث، يتضمن قياس الانزياح نحو الأحمر للضوء، عندما يتتساعد من بين الجاذبية للكوكب الأرض، بيد أن هذا الاختبار يتحقق من مبدأ النسبية، أكثر من تفاصيل النظرية النسبية العامة. (المؤلف)

(٢) القيمة التى يمكن فيها الكون فى حالة توازن ومتوقفاً عن تمدده. (المترجم)

مسطح، والكثافة الفعلية التي يتم رصدها، إما تكون - إذن - أقل أو أكبر من هذه القيمة. وفي الحالة الأسبق يكون الكون مفتوحاً أما في الحالة الأخيرة، يكون الكون مغلقاً. وقيمة الكثافة الحركة ليست كبيرة للغاية، إذ تعادل نحو بروتون واحد في كل متر مكعب من الفضاء. وقد لا يبدو ذلك مقداراً وافراً، إذا زوّدت بالرقم الهائل لعدد الذرات في متر مكعب من تربة الأرض، بيد أن عليك أن تتذكر بأن هناك قدرًا مروعًا من الفضاء الخالي، بعيدًا في الكون، بين المجرات.

إن تقدير كمية المادة المضيئة في الكون، أمر بالغ السهولة. إننا نعرف مدى لمعان النجم المتوسط، ومن ثم، يمكننا الحصول على تقدير لأعداد النجوم في مجرة نائية. وحينئذ نستطيع أن نحصل على حجم الكتلة على حجم الفضاء، نحصل على متوسط كثافة المادة في التي وجدناها. وبقسمة الكتلة على حجم الفضاء، سوف نجد أن كثافة المادة المضيئة هي ذلك الحجم. وعندما نقوم بتنفيذ هذه العملية، سوف نجد أن كثافة المادة المضيئة هي تقريرًا واحد إلى اثنين بالمائة من الكثافة الحرجية، وهي أقل بكثير مما نحتاجه لكي "تفلق" الكون. ومن ناحية أخرى، فإنها قريبة إلى حد كبير من القيمة الحرجية، مما يجعلك تتوقف عن البحث وتنتابك الشكوك وتمنع التفكير في الأمر. وعلى أية حال، فيمكن لهذا الكسر - من حيث المبدأ - أن يكون واحداً على بليون أو واحداً على تريليون<sup>(١)</sup>، ويمكن أيضاً أن يكون قد حدث، إن كانت هناك مادة مضيئة يبلغ مقدارها مليون مرة قدر ما يتم الاحتياج إليه، لتفلق الكون. ولكن ما السبب، في أنه من بين كل الكتل التي يمكن للكون تشكيلها، تكون تلك الكتلة المقابلة من المادة المضيئة، قريبة إلى هذا الحد من القيمة الحرجية؟

يمكن للمرء أن يجادل دائماً، بأن هذه حادثة كونية، وهذه الأشياء تقع بمحض الصادفة، ثم تتطور لتصبح كما هي عليه الآن. ولكن من الصعوبة قبول ذلك التفسير، وأظن أن آخرين لهم نفس الرأي. ويدفعنا هذا إلى القول، بأن الكون بالفعل. له كتلة

---

(١) ألف مليون، والتريليون = مليون مليون. (المترجم)

حرجة، بيد أننا - بطريقة ما - نفشل في أن نراها كلها. و كنتيجة لهذا الافتراض، بدأ الفلكيون يتحدثون عن "الكتلة المفقودة"، ويعنون بها تلك المادة التي تؤدي إلى التباين بين ما تم رصده، والكتافات الحرجية، ولم يستهونى قط هذا المصطلح، ذلك أنه يحمل بين طياته إشارة دينية، فعندما نقول بأن شيئاً ما "مفقود" ففي ذلك تلميح ضمني، بأن هذا الشيء من المفترض أن يكون هناك. وليس لدينا أى دليل بأن أى كتلة "مفقودة" ولكن مجرد شعور حسى قوى، بأنه ربما تكون ثمة المزيد من المادة مخفية بعيداً هناك. وهذا النزوع إلى الإيمان في كون أكبر حجماً مما توضحه المادة الضئيلة، هو ما كنت أتحدث عنه آنفًا، عندما قلت بأن المسرح قد أعد لوجود المادة المظلمة، بذلك الإيمان الشائع بالكتلة المفقودة، ولعظيم رضائى (ولا بد أن أعترف، دهشتى)، فإن مصطلح "الكتلة المفقودة" قد أزيل - في السنوات الأخيرة - من المعجم الفلكى. وتم استبدال به المصطلح الأكثر دقة وحيادية "المادة المظلمة".

ولنستطرد مع القصة، إن وجود الهالات المجرية ذات الكتل التي تزيد بعشر مرات عن المادة الضئيلة في مجرة ما، تدفع بتقدير الكثافة إلى مدى من عشر إلى عشرين بمالئة من القيمة الحرجية. ولو جال بخاطرنا، أننا قد اقتربنا إلى حد كبير من المادة الضئيلة فقط، فإننا بالتأكيد أكثر قرباً الآن.

والمادة المظلمة في العناقيد المجرية والعناقيد المجرية الفائقة، قد اكتشفت حديثاً جداً، لتحدث إجماعاً في الآراء يعم بين الفلكيين، بالنسبة لمساهمتها في الكتلة الكلية للكون. (وثمة مجادلة مفعمة بالحيوية عن هذا الموضوع، مازالت مستمرة حتى الآن). ويبين أن النقطة الجوهرية، هي أنه عند تضمين المادة المظلمة، فإن الكثافة الكلية لكتلة الكون، مازالت لا تزيد عن ثلاثين بمالئة، من القيمة الحرجية.

واستمرار قيمة هذه الكتلة في الارتفاع لتصل إلى القيمة الحرجية مع مرور الوقت، سوف يتم مناقشتها في الفصل الثالث عشر. أما الآن، فسوف أقتبس، ببساطة، ملاحظة أبداها عالم الفيزياء الفلكية (ستيفن هوكنج). فقد سأله أحد زملائه عن مقدار

المادة المظلمة التي رصدت. أجاب (هوكنج) "منذ عشرين عاماً كان لديك اثنان بالمائة. واليوم لديك ثلاثة بالمائة. فلماذا لا تخرج وتنظر من جديد؟".

## كم يجب أن تكون عليه كثافة الكون؟

### دور التضخم

ظهرت إلى الوجود فكرة الكثافة المفقودة، لأن كثافة المادة التي تم رصدها في الكون قريبة من قيمتها الحرجية. وعلى الرغم من ذلك، فحتى أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، لم يكن هناك سبب نظري ثابت، لافتراض بأن الكون - بالفعل - له كثافة حرجية، وفي العام ١٩٨١، نشر (ألان جوث) - كان وقتئذ في جامعة (ستانفورد)، أما الآن فهو في MIT معهد (ماساتشوستس) للتقنية<sup>(١)</sup> - أول بحث يتضمن وجهة نظره التي صاغها في شكل نظرية، عرفت فيما بعد باسم "الكون المتضخم". ومنذ ذلك الوقت، أجرى على النظرية عدد من التعميلات التقنية، بيد أن النقاط الرئيسية، لم تتغير. ولأجل بحثنا في هذا الكتاب، فإن الملمح الأساسي للكون المتضخم، أنه أرسى المرة الأولى ثمة افتراض نظري قوى، بأن كثافة الكون، لابد أن لها بالتأكيد قيمتها الحرجية. واشتق هذا التنبؤ من النظريات التي تصف تجميد القوة الشديدة بعد الانفجار الأعظم بـ ١٠-٣٥ ثوانٍ. ومن بين العمليات الأخرى التي حدثت في ذلك الوقت، كانت عملية تعدد سريع للكون، الذي أطلق عليه فيما بعد "التضخم"، ويقودنا وجود ذلك التضخم إلى التنبؤ بأن الكون لابد أن يكون مسطحاً.

والعملية التي تؤدي إلى تجميد القوة الشديدة، ما هي إلا مثال على "تغير الطور"<sup>(٢)</sup>، إذ إنها تتشابه في كثير من النواحي مع عملية تجميد الماء، إذ عندما يتجمد

(١) Massachusetts Institute of Technology. (المترجم)

(٢) الطور، جزء متجانس من مادة ما، يوجد في منظومة فيزيائية غير مت詹س، ويمكن فصله عن هذه المنظومة آلياً. (المترجم)


الماء إلى ثلج، يحدث له تمدد، وسوف تتهشم زجاجة الحليب، إذا تركت في الخارج ليلة واحدة خلال فصل الشتاء - وعندما نقول بأن الكون يتمدد بنفس الطريقة، عندما يغير الطور، فإن هذا يجب ألا يتثير الدهشة البالغة.

وما هو مدهش بحق، هو ذلك المدى المروع لضخامة التمدد الكوني، فلقد ازداد حجم الكون بعامل لا يقل عن  $10^{10}$  ! وهذا الرقم عظيم القدر، إلى الحد أنه يمكن بلا معنى للغالبية العظمى من الناس، ومنهم مؤلف هذا الكتاب. ودعنى أصيغ لك هذا الأمر بالطريقة التالية: لو أن طولك ازداد فجأة بعامل في ضخامة ذلك الرقم، فإذن سوف تمتد من أول الكون إلى آخره دون وجود أي فراغ، وحتى لو زادت أبعاد بروتون واحد داخل ذرة مفردة في جسمك، بمقدار  $10^{10}$  ، فإنه سوف يصبح أضخم من الكون بأسره. وعند  $10^{-25}$  ثوانٍ، تحول حجم الكون من شيء نصف قطر توسيعه<sup>(1)</sup> أصغر كثيراً من أصغر جسم أولي، إلى شيء في حجم ثمرة "كريب فروت" لا عجب إذن أن تعبير "التضخم" مرتبط بهذه العملية الكونية. وعندما قرأت للمرة الأولى عن الكون المتضخم، وجدت صعوبة في تصوّر معدل ذلك التضخم. وتساءلت: أليس مثل هذا النمو السريع في الكون، ينافي انتقادات أينشتين للسفر أسرع من الضوء؟ ولو أن جسماً مادياً ارتحل من جانب ثمرة الكريب فروت إلى الأخرى في مدة  $10^{-25}$  ثوانٍ، فإن سرعتها سوف تتجاوز سرعة الضوء بمقدار كبير، والإجابة عن هذا التعارض، يمكن أن توجد في مثال عجين الخبز بالفصل الثالث.

وخلال فترة التضخم فإن الفضاء نفسه الذي يتمدد، مثل عجين الخبز، ولا يتحرك أى جسم مادي - ولا حتى حبات الرزيب - بسرعة عالية في داخل الفضاء. ومن ثم فإن القيد ضد السفر أسرع من الضوء، تنطبق فقط على الحركة داخل الفضاء، وليس حركة الفضاء نفسه. وبينما على ذلك، ليس ثمة تعارض هنا، حتى لو بدا هذا للوهلة الأولى. ويمكن وصف نتائج التمدد السريع للكون - بشكل أفضل - بالرجوع إلى رأى أينشتين عن الجاذبية. قبل أن يبلغ عمر الكون  $10^{-25}$  ثوانٍ، يفترض أنه كان ثمة شكل

(1) دائرة نصف قطرها من احناء (رياضيات). (المترجم)

ما من توزيع المادة (وسوف نرى في التو بإن بنيتها الدقيقة لا تحدث فرقاً). وبسبب هذه المادة، فإن الزمكان، يجب أن يكون له شكل مميز. ولأجل المجادلة، افترض ذلك السطح المتماوج في يسار (الشكل ٨-٤)، والذي يمثل هيئة الكون كشكل محدد، قبل أن يبدأ حدوث التضخم.



الشكل 8.4

ويمكنك أن تخيل التضخم كامتداد مستمر من اللوحة، إلى أن يتجاوز حجمه الكون بأسره. ناهيك عن مدى التفاف السطح الأصلي، إذ عندما يتمدد إلى هذا الحد البعيد، فإن أي جزء من السطح سوف يماثل ذلك السطح المرسوم إلى يمين (الشكل ٨-٤)، وبمعنى آخر، فإنه بعد حدوث التضخم سوف يكون الكون مسطحاً، بغض النظر عن كيفية بيئته. وهذا التسطيح ليس مجرد حادثة عابرة، ولكنها نتيجة ضرورية لفيزياء التجمد، التي حدثت بعد  $10^{-35}$  ثوانٍ من ميلاد الكون بالانفجار الأعظم.

وعندما صدم (جث) الأوساط العلمية بهذه النظرية، أؤكد لك بأنه كان هناك العديد من الابتسamas والإيماءات! وهذا الحل لمشكلة المادة المفقودة (أو باستخدام مصطلح علماء الكون "مشكلة التسطيح")، مثال كامل للأنفة والجمال، اللتين ذكرتهما آنفاً. إن الكون مسطح، لأنه لا يمكن أن يكون غير ذلك. إن تسطيح الكون، هو الحالة الوحيدة التي تتtagم مع القوانين الأساسية، التي تحكم في التفاعلات بين الجسيمات الأولية. وبصرف النظر عن كيفية بداية الكون، سوف ينتهي به الأمان أن يكون مسطحاً. وهذه بحق فكرة رائعة.

والشيء المدهش الوحيد في التضخم، هو إلى أي مدى - على وجه الدقة - يزيده من الكون أن يكون مسطحاً. إن كتلة الكون التي تم رصدها، يجب أن تتعادل الكتلة الحرجية بدقة تبلغ جزءاً من  $10^{-50}$  وهذا يعني أن معدل التجاوز الذي تسمح به النظرية لخطأ ما في الإحصاء لا يتعدى بروتونا واحداً لكل سنة ضوئية مكعبة، أي ما يعادل تقريباً أميباً واحدة بالنسبة لجرة كاملة تحتوى على ملايين النجوم، ولا ريب أن مثل هذه الدقة المتناهية من المرجح أن تظل خارج نطاق القدرة الإنسانية لتحقيقها، بيد أنها - من جانب آخر - تؤكّد بما لا يدع مجالاً للشك، أن التنبؤ قطعى لا لبس فيه.

ومن ثم، فمع قدوم الكون المتضخم، أصبح لدينا - للمرة الأولى - اعتقاد نظري قوى، داعم ومؤيد للكون المسطح. وفي الواقع، فإن بعض الباحثين في هذا المجال يتحدثون بالفعل عن مدى "الحاجة" للتسطيح، وحقيقة أننا توصلنا حتى الآن إلى ثلاثة في المائة من الكتلة الحرجية للكون، وتوقعنا أن نصل إلى مائة بالمائة باستخدام أحد مقاييس الثقة<sup>(١)</sup>، يجعل مشكلة اكتشاف الهوية الذاتية للمادة المظلمة، ذات أهمية بالغة. سوف أناقش في التو بعض الأفكار التي تبحث في هذا اللغو الكوني.

---

(١) مؤشر لمعرفة مدى الثقة في شيء ما بوضع أهداف يمكن تحقيقها. (المترجم)

## الفصل التاسع

### مكونات مرشحة للمادة المظلمة

(اجمع الشكوك المعتادة).

سطر مشهور من الفيلم السينمائي (казابلانكا)

من الواضح أن المادة المظلمة تؤدي دوراً بالغ الأهمية في كل من تطور الكون وبنيته، ولكن ما طبيعة مكوناتها؟ هل يمكن أن نقتصر بالفعل، بأننا نفهم الكون المحيط بنا، مع العلم بأن أكثر مكوناته انتشاراً - أي المادة المظلمة - غير معروفة لنا؟

حسن، إنه من الأسهل إذن التصريح بالمكونات التي لا توجد في المادة المظلمة، بدلاً من الإدلاء بالمكونات التي توجد فيها بالفعل. إن طريقة استبعاد السلبيات، على الرغم من أنها لم تكن قط عملاً براً، فإنها عادة تكون جد مفيدة. وبالتالي، سوف نبدأ اعتباراتنا عن هوية المادة المظلمة، باستبعاد أكثر المكونات المرشحة وضوحاً. وفي نهاية الأمر، سوف نقرر بأنه أيًّا كانت طبيعة المادة المظلمة، فإنها شيء - على الأرجح - لم يتم مشاهدته قط على كوكب الأرض.

#### المادة الباريونية<sup>(١)</sup>

إن نوى الذرات التي تشكل كل المواد التي نصادفها في حياتنا اليومية، مكونة أساساً من بروتونات ونيوترونات. وهذه الجسيمات دون الذرية، أعضاء في فئة يطلق

(١) تتنتمي إلى عائلة الجسيمات المركبة المحتوية على ثلاثة كواركات مثل البروتونات والنيوترونات. (المترجم)

عليها الفيزيائيون "الباريونات" (الجسيمات الثقيلة). وبالتالي، فإنك تسمع الفيزيائيين دائمًا يشيرون إلى "المادة الباريونية" وما يقصدونه هو مادة من نوع معتمد، تكون نوى ذراتها مكونة من البروتونات والنيوترونات. ما دامت أن المادة الباريونية هي مادة عادية وتحيط بنا من كل جانب، فإنه من الطبيعي أن نجري عليها أبحاثنا باديًّا ذي بدء، في مناقشتنا حول المادة المظلمة. وهي الأكثر اعتمادًا، من بين كل "الشكوك العتادة"، وليس ثمة وسيلة نستطيع بها أن نستبعد - تماماً - إمكانية أن المادة المظلمة باريونية، على الرغم من أنه لأسباب سوف نشرحها تواً، فإن هذا ليس مرجحاً.

إن المادة المظلمة الباريونية، يمكن أن تتخذ أشكالاً متعددة، إذ يمكن أن تكون غازاً مكوناً في معظمها من ذرات وجزيئات هيدروجين، وقد تكون جمع من أجرام فضائية في حجم كوكب المشترى<sup>(١)</sup> تتخذ لها مداراً في الهالة المجرية. وقد تكون أقزام بنية (أى نجوم صغيرة التي لا يكاد يصدر عنها أى إشعاع) أو حتى ثقوب سوداء، وكثيراً من هذه الأجرام الفضائية يمكن أن توجد بسهولة في مجرة الطريق البني، دون أن تتمكن من رصدها وتتبعها. ويمكن لهذه الأجرام الفضائية أن تكون بالتأكيد الإجابة الأدنى أهمية للسؤال عن هوية المادة المظلمة.

إن أقوى دليل ضد الشكل الباريوني للمادة المظلمة، يقع في المعوقات التي واجهت الكون، بتشكيل النوى الخفيفة بعد ثلث دقائق من الانفجار الأعظم (انظر الفصل الثالث). سوف تتذكر أنه في ذلك الوقت، كانت درجة الحرارة منخفضة إلى الحد، أنه إذا اتحد بروتون ونيوترون معاً لتكوين نواة، فإن الاصطدامات اللاحقة لن تكون قوية بما يكفي لتمزيقها إبرياً، وكمية النوى الخفيفة - مثل الهيليوم - <sup>٤</sup><sup>(٢)</sup> والديوتريوم<sup>(٣)</sup> - في الكون في الوقت الحاضر، توظف كواحدة من الأدلة الرئيسية، التي تؤكد عن طريق البرهان، صحة نظرية الانفجار الأعظم كبداية للكون.

(١) يبلغ قطره حوالي ١٤٢,٨٠٠ كيلومتر عند خط استواءه. (المترجم)

(٢) أحد نظائر الهيليوم وتتكون نواته من بروتونين ونيوترونين. (المترجم)

(٣) نظير الهيدروجين له بروتون واحد ونيوترون واحد في النواة. (المترجم)

ويعتقد معدل إنتاج النوى الخفيفة عند حد الثلاث دقائق بعد الانفجار الأعظم، على عاملين: درجة حرارة وكثافة المادة. وإذا تحدد درجة الحرارة مدى سرعة تحرك الجسيمات عندما تتصادم، ومن ثم ما إذا كانت النوى حديثة التكوين، ستظل متماسكة. كما سوف تخبرنا أيضاً هل سيترك البروتون بسرعة كافية، عندما يقترب من إحدى النوى، ليتغلب على قوة التناور الكهربائي، التي تنشأ بين جسيمين لهما شحنة موجبةان. إذا تمكن البروتون من هذا، فالاصطدام بينه وبين النواة الخفيفة، سوف ينتج عنه نواة أكبر. أما إذا فشل البروتون، فإنه سوف يدفع بعيداً، ولن يحدث أي تغيير في النواة الخفيفة. وتكون درجة الحرارة بمثابة الدليل لما يحدث عندما يقع الاصطدام.

وتحدد كثافة المادة مدى تكرار حدوث هذه الاصطدامات. ولو تكدرست المادة للغاية، عند حد الثلاث دقائق بعد الانفجار الأعظم، فسوف تستمر الاصطدامات طوال الوقت، ومن ناحية أخرى، إذا كانت الجسيمات متاثرة نسبياً، سوف تقع الاصطدامات بمعدل أكثر ندرة، في الحالة الأولى، ستنتج نوى كثيرة، أما في الحالة الثانية فسيكون عددها أقل. وبناء على ذلك، فإن كثافة الجسيمات التي يمكنها أن تنتج نوى عند الاصطدام - وهذا ما أطلقنا عليه "المادة الباريونية" - ولا شك أنها أدت دوراً مهماً في تحديد كمية النوى الخفيفة التي كانت موجودة، بعد أن أصبح عمر الكون ثالث دقائق.

ورأينا في الفصل الثالث، أن الوفرة التي لوحظت في كمية النوى الخفيفة، كانت جد قريبة مما تنبأ به نظريات الانفجار الأعظم. ولا ريب أن هذا يمثل دليلاً على صحة النظرية، بيد أنه يظهر أيضاً أن هناك تفاوتاً مسماحاً صغيراً، لغير الأشياء. وإذا قمنا بزيادة الكثافة، بالإضافة لكمية هائلة من المادة المظلمة في شكل باريونات، سوف ينتج عن ذلك ارتفاع معدل إنتاج النوى، وسوف تزيد القيم المتوقعة لمدى وفرة الهيليوم، لتجاوز كل الحدود، التي تم تحديدها بالرصد. ولو أن الكون يتشكل من أجرام فضائية في حجم كوكب المشترى تتrox لها مداراً في الحالات المجرية، فلا شك أن تكون النوى التي كونت هذه الأجسام الفضائية، قد أتت من مكان ما، وأن فترة تخلق النوى، في الثلاث دقائق الأولى من عمر الكون هي المصدر الوحيد.

وانتصح أن نواة الديوتريوم (بروتون واحد ونيترون واحد) تقدم لنا مؤشرًا رائعاً عن كثافات المادة، في المراحل الأولى بعد الانفجار الأعظم. إن الديوتريوم صورة ثقيلة لنواة الهيدروجين المعتمد، وأحد مكونات ما يطلق عليه "ماء الثقيل". وبالنسبة ل نطاق هذا الكتاب، فإن أكثر صفات الديوتريوم المميزة، هي أنه لم ينتج في النجوم، على الرغم من أنه يمكن أن يحترق في الأفران النجمية النووية، منذ أن تخلق أثناء الانفجار الأعظم<sup>(١)</sup>. وهذا يعني أننا إذا وجدنا نواة ديوتريوم، فإننا نستطيع أن تتأكد، أنها جاءت إلينا مباشرة، من المراحل المبكرة من الانفجار الأعظم.

وليس الديوتريوم في حاجة لأن ينتشر بين النجوم، إذ إن مياه المحيط أيضًا مصدر جيد له. وهذا التوفير من الديوتريوم يتتيح الفرصة لظهور ما أطلق عليه (أرنو بنزياس) – الحائز على جائزة نوبل – "دراسة الفلك باستخدام مجرفة". إنك تتطلع إلى المواد في كوكب الأرض، وتحدد مقدار الديوتريوم الموجود فيها، ثم تقدر استدلالياً هذه الأعداد للكون بأسره.

وعندما يتم تنفيذ هذه العملية، سوف نجد أن هناك – تقريباً – نواة ديوتريوم واحدة بالنسبة لكل عشرة آلاف نواة من الهيدروجين العادي، في الكون. وهذا يعني أنه بعد انتهاء تخليق النوى عند الثلاث دقائق من عمر الكون، لم يكن من الممكن وجود كمية أقل من هذه النوى. وبالتالي، فإن ذلك يضع تحديداً لكمية المادة الباريونية في الكون. وعند الانتهاء من إجراء الإحصاءات والحسابات بالكامل، نجد أن الوفرة – التي تم رصدها – للديوتريوم، تتطلب أن تكون المادة الباريونية في الكون، أقل من عشرين إلى ثلاثين بالمائة، من كثافة المادة الحرجية، التي قمنا بتعريفها في الفصل الثامن. وبنفس هذه التحديات يمكن استنتاجها من دراسة النوى الأخرى، ولأسباب فنية، يظهر أن أفضل (أى أقل) التحديات للمادة، يمكن التوصل إليها، بالنظر إلى الكميات

---

(١) حتى أكون أكثر دقة، فإن الديوتريوم تخلق في النجوم، ولكن ما إن تتكون نواته حتى تصطدم في الحال تقريباً، بجسم آخر وتتحول إلى نواة أثقل. (المؤلف)

الوافرة من الليثيوم-7<sup>(١)</sup>، الذي اتضح أنه الأصعب قياساً، ومن ثم، يكون الأقل في التعرف عليه. إن القياسات على ليثيوم-7، والتي اقتربناها تواً، سوف تظهر أن الحد قد يكون أقرب إلى عشرين بلمائة منه إلى ثلاثين بلمائة.

وهذه النتيجة بالغة الأهمية ومؤكدة، بمعنى أنه يمكننا أن نبحث في إنتاج الديوتريوم من واقع اصطدامات البروتونات والنيترونات في مختبراتنا، ومن ثم، هناك ارتياح قليل عما حدث فيما يتعلق بالجانب الفيزيائي النموي من المشكلة. الشيء الوحيد الذي ما زال موضع شك، هو كثافة المادة الباريونية، ومن أجل ذلك لدينا رقم تجربى واحد - وفرة الديوتريوم والليثيوم التي تم رصدها - لربط الأشياء معاً. وبالتالي، فالنتيجة تكون ثابتة ومستقرة، مثل النتائج الأخرى التي نحصل عليها في علم الكون.

عندئذ، يمكننا القول - بشيء من الثقة - إن الكمية الكلية للمادة الباريونية في أرجاء الكون، لا يمكن أن تتجاوز نحو ثلاثين بلمائة من الكتلة الحرجية. وسوف تتذكر أنتى أوضحت، في الفصل الثامن، أنها تعادل - تقريباً - كمية المادة المظلمة التي تم دعمها بالأدلة، والوثائق، حتى هذه اللحظة. وبيناء على ذلك، فثمة احتمال ضئيل للغاية، أن تكون كل المادة المظلمة باريونية. ومع هذا، فيجب أن أقول هنا إننى أعتقد بأن وجهة النظر هذه، ليست نهاية المطاف.

خلال العقدين الأخيرين، كانت كمية المادة المظلمة التي أمكن توثيقها مستندياً، قد ازدادت بثبات، وفي نفس الوقت، انخفضت برتبة تلك التحديدات التي فرضت على الكتلة الباريونية، من واقع الدراسات عن النوع الخفيف، وقتنى، كانت القيمتان تقريباً متساويتين، بيد أن الأمر لا يحتاج إلا دفعة واحدة، من أحد الجانبين حتى يصبحا مغايرين من حيث القوة والتاثير، عن بعضهما.

---

(١) أحد نظائر الليثيوم وتحتوى ذرته على ثلاثة بروتونات وأربعة نيوترونات وثلاثة إلكترونات لذلك فهو "يونف" واللف المغزلى له عدد صحيح. (الترجم)

وما إن تزيد كمية المادة المظلمة عن التحديدات الموضوعة على المادة الباريونية، تكون مجبرين على التفكير في الأشكال الأخرى التي يمكن للمادة المظلمة أن تتخذها. ولو أردنا أن نتناول الأمر بحذر، فإن شيئاً من الفطنة البسيطة، تفرض علينا أنه ربما حان الوقت، لنبحث بإمعان، فيما وراء المادة الباريونية، عن "مرشح" أكثر ملائمة وترجحياً دعانا نكون ميالين قليلاً إلى خوض المخاطر والمجازفات، ونتذكر كيف أن الكون المتضخم قدم لنا العون في ترسیخ افتراض - لأول مرة - في صالح تسطيح الكون. وفي الوقت الحاضر، هناك سبب نظري بالإضافة إلى آخر جمالي وفني، للاعتقاد بأن الكون - على نحو صحيح ودقيق - له كتلة حرجة. وإذا كان هذا حقيقياً، عندئذ فإن على الأقل سبعين بالمائة من هذه الكتلة، يجب ألا تكون باريونية. وشعورى الشخصى بأنه من المرجح للغاية أن تكون للكون كتلة حرجة، وأن معظم أو كل المادة المظلمة ليست باريونية، يbid أن هذا لا يعنو أن يكون رأياً شخصياً، وربما تختار أن تختلف معى، ولكن آخذًا في الحسبان، سوء التقدير الذى ينشأ عن المجادلات على كل جوانب المشكلة، فإنتى لن أناقشك.

وثمة سبب ثان، للقول بأن المادة المظلمة ليست باريونية، قد ذكرت في الفصل الرابع. وكما تذكر، فإن الكون الذى يتشكل بالكامل من المادة الباريونية، والذى يوجد فيه بنى هائلة الحجم وعلى نطاق واسع، سيكون إشعاعه الخلفى من الموجات الدقيقة متغيراً. ما دام الإشعاع الخلفى لكوننا، متsons إلى حد كبير، وبالتالي، فإن بعض المادة المظلمة يجب أن تكون غير باريونية.

وأخيراً، يمكنك أن تجادل ضد المادة المظلمة الباريونية، فإذا كانت الحالات المجرية من المادة الباريونية، فـأى أشكال يمكن أن تتخذها المادة؟ يمكن أن تكون غاراً، أو ربما تكون شيئاً قد تماسك معـاً كيميائياً، مثل "كرات الثلج" من الهيدروجين المجمد، أو حبيبات غبار تتراوح في الحجم، من المجهري إلى حجم كوكب. وختاماً، لعلها نوع من الأجرام الفضائية تتماسك معـاً بالجانبية، مثل الأشياء التي في حجم كوكب المشتري

(أى "كواكب" مكونة أساساً من الهيدروجين والهيليوم) أو نجوم ميتة ("أرمدة خامدة" احترقت منذ زمن موغل في القدم، وتوقفت عن إشعاع أى ضوء).

ومرشح آخر راسخ الجنور منذ زمن طويل، هو الثقوب السوداء، التي تتكون في نهاية حياة النجم، ويمكن تصنيفها أيضاً كرماد.

ولذا كانت حالة المادة المظلمة المجرية عبارة عن غاز، فيجب أن تكون حرارتها مروعة لقوى الضغط لكي تتمكن من مقاومة قوى الشد إلى الداخل، بفعل الجاذبية. وفي مثل درجات الحرارة هذه، سوف يطلق الغاز الأشعة السينية، التي يمكن اكتشافها بسهولة، بمنظومات الأقمار الصناعية الحديثة. وما دامت الأشعة السينية غير مرئية، فالهالة المجرية إذن لا يمكن أن تكون غازاً.

ولن تستمر كرات الثلج المجمدة في الفضاء؛ إذ لا بد أن تجتاز عملية فيزيائية يطلق عليها "التسامي"، أى التحول المباشر من الحالة الصلبة للمادة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة. والتسامي هو ما يحدث طوال الوقت للجليد الجاف<sup>(١)</sup>، إن السحب المتلاطم وال WAVES العارمة، التي يعيش ظهورها المخرجون سواء في السينما أو المسرح، غالباً تنتج عن طريق السماح لـأكواخ من الجليد الجاف بالتحول إلى غاز ثاني أكسيد الكربون، وتسامي جليد المياه، هو الذي يجفف الملابس المعلقة على الحبل، عندما تكون الحرارة، تحت درجة التجمد. ما دام هناك إمكانية لحدوث التسامي، فلا يمكن أن تكون الهالة المجرية عبارة عن كرات ثلجية، كما أنها ليست مكونة من حبيبات الغبار أو الصخور، لأنه إذا كانت هناك مادة ثقيلة كافية موجودة، لتشكيل مثل هذه الأجرام الفضائية عندما تكونت المجرات، فإن نفس هذه المادة يجب أن تكون مدمجة في النجوم البالغة القدر. ويبلغ عمر هذه النجوم (التي يطلق عليها الفلكيون "الجمهرة الثانية") ما بين أربعة عشر وثمانية عشر بليون عام، وهي فقيرة للغاية في العناصر

---

(١) ثاني أكسيد الكربون الصلب ويستخدم مادة مبردة. (المترجم)

الثقيلة. وتساءل كيف يمكن أن تكون هناك عناصر ثقيلة في الهالات المجرية، على شكل حبيبات غبار وصخور، ولا شيء من هذه العناصر الثقيلة في النجوم؟

أما الأجرام الفضائية التي في حجم كوكب المشتري، فثمة صعوبة أكبر إلى حد ما، في استبعادها كأحد المرشحين للمادة المظلمة. لقد تكون كوكب المشتري بعملية كونية مشابهة لتلك التي شكلت الشمس، تكاثف لسحابة غاز تحت تأثير الجاذبية. والعقبة التي تواجه تكون الهالة المجرية من تلك الأجرام الفضائية، هو شرح كيف كان ممكناً، لبلاديين الأجرام الفضائية التي في حجم كوكب المشتري أن تتشكل، ولكن - في الحقيقة - دون تكون أي نجوم صغيرة، وال فكرة الأساسية هي أن كوكب المشتري يقترب كثيراً من أن يكون نجماً. ولو كان قد أضاف إلى كتلته مادة قليلة أكثر لاشتعلت النيران التووية في داخله، ول أصبح نجماً حتى لو كان صغير الحجم. وتساءل: لماذا لا نرى أي آثار للنجوم الخافتة، التي تكون أكبر - بنسبة بسيطة - من الكواكب الضخمة؟ وماذا يمكن أن يكون السبب في ذلك التباين الحاد في حجم الأجرام الفضائية بالهالة المجرية؟ ونقص تلك الآلة، هي بمثابة مجادلة قوية ضد هذا النوع المعين من المادة المظلمة. كما أنها تعمل أيضاً كنقاش ضد فرضية الأقزام البنية. ما دامت الأقزام البنية في الجانب الآخر تماماً من كوكب المشتري، عند الفاصل ما بين النجم والكوكب.

وأخيراً، فإن إمكانية "الأرمدة النجمية"، يمكن أن تستبعد بلاحظة أنه عندما يموت النجم، يصاحب موته - في معظم الأحيان - قذف كميات هائلة من المادة إلى الفضاء بين النجوم. وليس ثمة دليل على أن تلك المادة المقذوفة، موجودة في الهالة المجرية، ولهذا يمكن أن يتخذ هذا الأمر، دليلاً على أن الهالة ليست مكونة من رفات النجوم القديمة، إما كأرمدة خامدة أو كثقوب سوداء نجمية.

وكل هذه المجادلات، من تخليق النوى والبني المروعة ذات الاتساعات الهائلة وصرف النظر عن الأشكال المتباعدة من المادة البارونية، تشتترك كلها في خطأ شائع: لا أحد يمكن أن يستبعد تماماً احتمالية أن تكون كل المادة المظلمة في الكون باريونية. ومن ناحية

أخرى، أنها تجعل الأمر صعباً بالفعل، للهروب من المصائد الخفية، فيكون كله من المواد البارونية، وقد ابتكر الباحثون المبدعون (ومنهم أكثرهم في هذا المجال) مخططات معقدة يمكن بها تجنب كل المصائد الخفية التي يتم التوصل لها. وتحمل هذه المخططات أثراً ضئيلاً مثل نفحة هواء عابرة، من "أفلاك التنوير"<sup>(١)</sup>، وهو جهاز استخدمه فلكيتو العصور الوسطى، لتعديل نظرية بطليموس عن الكون، لتوافق مع الأرصاد الفعلية. وربما استطاعوا تفادى كارثة لمدة معينة، إلا أنهم لم يقووا إلى علم جديد. وعادة، عندما تكون الفكرة صحيحة، توضع الأمور في نصابها، كما لو أنهم قاموا بذلك بأنفسهم، فليس ثمة حاجة إلى ابتكار مخططات، للتخلص من بيانات مركبة تعيق البحث.

وعلى سبيل المثال، ربما يتمكن أحد الباحثين من "تثبيق" مخطط، يضمنه كل أشكال المادة المظلمة البارونية والتي ذكرناها آنفاً، وقد امتنجت كلها معاً، لتشكل الهالة المجرية. وربما يمكن للمرء أيضاً أن يعدل من النسب المتكافئة فيما بين الأنواع المتباينة منها، ليتجنب التضارب مع الأرصاد، ولكن ما الذي سوف تجده عندما تنتهي من بحثك؟ لا شيء يشير اهتمام أي شخص.

والسبب في هذا بسيط. وكما بيّنت في مناقشة النظرية النسبية العامة، بأن النظرية الناجحة في العلوم، يجب أن تميز برونقها وسحرها بالإضافة إلى قابليتها للتطبيق العملي. ونوع النظرية التي تخيلتها منذ برهة قصيرة لا تتtagم مع ذلك الاختبار المزدوج. وربما يمكن العمل بها، بيد أنها بغية لغاية ومتنهكة للقانون الطبيعي. وكما قال الفيزيائي (إنريكي فيرمي)<sup>(٢)</sup> إنها لا تعد حتى الآن خاطئة. إن هذا النوع من الأشياء يلجم إلية العلماء فقط كملاذ آخرين، بعد أن يتحقق في العمل، كل شيء آخر، أمكنهم التفكير فيه. إذن، فلن يكون الأمر مثيراً للدهشة، عندما نعلم بأن معظم الباحثين في الوقت الحاضر، هجروا فكرة أن المادة البارونية هي مقوم أساسى للكون، ووجهوا اهتمامهم إلى مكان آخر.

(١) فيـ فلك بطليموس هو دائرة صغيرة يتحرك مركزها على محيط دائرة أكبر مركزها الأرض. (المترجم)

(٢) فيزيائى إيطالى أمريكي (١٩٠١ - ١٩٥٤) حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام ١٩٣٨. (المترجم)

## ماذا عن النيوتروينات؟

وما إن تخليت عن فكرة المادة الباريونية، حتى تجد أن المرشح التالي للمادة المظلمة هو النيوترونو. ولا أقصد أن النيوترون جسيم مأكوف لنا، بمعنى أنتا عرفناه من خلال تجربتنا الحياتية اليومية، بيد أنه جسيم عرفه الفيزيائين منذ عقود من الزمن. ويتبع النيوترون في العديد من المفاعلات النووية، التي تتضمن تلك المتأججة في الشمس. والمشاركة في العمليات الكونية أثناء فترة تخلق النوى خلال الانفجار الأعظم.

ولاعطائك فكرة تقريبية عن عدد النيوتروينات في الكون، يمكننا استخدام "قاعدة الحدس"<sup>(١)</sup>: لو أن نيوترون واحد موجود في الوقت الحاضر، نتج عن كل تفاعل نووي حدث في أي وقت مضى. تظهر الإحصائيات أنه ربما كان ما يقرب من بليون نيوترون أنتج أثناء الانفجار الأعظم لكل بروتون، ونيوترون أو إلكترون، وكل حجم في الفضاء بمقاييس أبعاد جسمك، يحتوى على نحو عشرة ملايين من تلك النيوتروينات الغابرة، وهذا لا يدخل في حساباته، تلك النيوتروينات التي أنتجت مؤخرًا في النجوم.

ومن الواضح أن أي جسيم منتشر بهذا الشكل، يكون له - من حيث المبدأ - تأثير جوهري على بنية الكون، إذا كانت له كتلة.

وقد افترض وجود النيوترون في الثلاثينيات من القرن العشرين، وفي النظريات التقليدية، أن النيوترون جسيم يتفاعل بضعف شديد، مع أنواع المادة الأخرى. ولأنه ليس له كتلة، فإنه يرتحل بسرعة الضوء. ولزيادة المعلومات عن النيوترون لخدمة أغراضنا في هذا الكتاب، فإن معنى أن كتلته صفر، أنه لا يمارس أي قوة تجاذبية. وبالتالي، فإذا كانت النظرية التقليدية صحيحة، فليس ثمة أهمية لعدد النيوتروينات التي يمكن أن تحوم حولنا في الكون، إذ إنها لن تستطيع التأثير في الظواهر الكونية،

---

(١) قاعدة في الحكم على الأشياء، أو تقييمها، بالاستناد على ما يجول بالفكير وليس على أساس الفحص العلمي. (المترجم)

- مثل التقلص التجانبي في المجرات أو البنى الأخرى، مما يوحى بأن النيوترينو – على الرغم من الانتقادات الشديدة في النظرية التقليدية – ربما تكون له كتلة ضئيلة للغاية غير صفرية<sup>(١)</sup>.

في هذه الحالة إذن، فإن ضرب حتى كتلة ضئيلة بالعدد الهائل للنيوتريโนات في الكون، يمكن أن يكون حاصلها كتلة كلية للنيوترينو، تكون كبيرة إلى حد أنها تجلب كثافة الكتلة إلى قيمتها الحرجية. وسيناريو الكون الذي تسيطر عليه النيوترينوات، يمكن أن يأخذ الشكل التالي: إن النيوترينو هو أحد الجسيمات الذي تضعف تفاعله مع المادة كلما انخفضت درجة الحرارة. وهذا يعني أن النيوترينوات، سوف تتوقف عن ممارسة قوة (على المادة التي تم فك تقارنها) عن المادة العادية، قبل زمن طويل من قيام الإشعاع العادي بنفس هذا الدور. ووفق أفكارنا الحالية، فإن ذلك حدث بعد نحو ثانية واحدة من الانفجار الأعظم. وبعد هذا، تمددت النيوترينوات ويردت، وهكذا أنشأت نوعاً من صورة مرآة لإشعاع الموجات الدقيقة الخلفية للكون.

واحدى الطرق التي يمكن بها تفسير عملية فك تقارن النيوترينو، القول بأنه يحدث عندما يرتحل النيوترينو، خلال المادة، حيث إنه من غير المحتمل أن يتفاعل مع تلك المادة. وثمة عاملان يؤثران على تلك الاحتمالية: كثافة المادة (التي تخبرنا كم مرة تقترب النيوترينوات من الجسيمات الأخرى) وكذلك احتمالية أن يقترب النيوترينو من جسيم آخر، وحدث تفاعل بينهما. وعندما كان عمر الكون ثانية واحدة، كانت درجة الحرارة منخفضة إلى الحد أن سقطت هذه الاحتمالية الأخيرة، وشكلت النيوترينوات سحابة متدة وباردة، لم تعد تتفاعل مع المادة العادية. ولو كانت النيوترينوات كتلة ضئيلة، عندئذ يمكن لها أن تكتل بقوة معاً تحت تأثير الجاذبية بعد هذه الفترة الزمنية،

---

(١) تتطوى على قيمة أخرى – مهما كانت ضئيلة – غير الصفر. (المترجم)

وتشكل تركيزات جاهزة مسبقاً في كل أرجاء الكون، حيث تتشكل عندها المجرات فيما بعد، وبناء على ذلك، سوف يبدو لنا أن *النيوترينو الثقيل*<sup>(١)</sup> – إذا كان موجوداً – مرشح مثالي لكونات المادة المظلمة.

ومع هذا، إذا كانت للنيوترينوات كتلة ضئيلة، سوف ترتحل بسرعة قريبة من سرعة الضوء، عندما يفك تقارنها. وهذا يعني أنها سوف تكون ذلك النوع من المادة المظلمة التي أطلقنا عليها صفة "ساخنة". ومن ثم سوف تقودنا إلى نظرية للكون يطلق عليها "من أعلى إلى أسفل"، وكل المجادلات التي ثارت ضد المادة المظلمة الساخنة في الفصل السابع، يمكن أن تستدعي لتعترض عليها.

وبإضافة إلى هذا، فثمة مجادلات أكثر تفصيلاً التي يمكن إثارتها ضد النيوترينوات الثقيلة، كمرشحات للمادة المظلمة. وهذه المجادلات، وأخريات شبيهة بها، قد دفعت بمعظم علماء الكون، إلى الابتعاد عن فكرة اعتبار أن النيوترينوات الثقيلة، مرشحات للمادة المظلمة. ويبعدوا هذا مقنعاً للغاية، ولكن يتابهم الضعف إذا وجهوا بالسبب الأكثر أهمية، لرفض هذا الافتراض.

ولذا نظرنا إلى الأمر باقتصى بساطة ممكنته، نجد أنه ليس ثمة دليل جلى لا مجال للشك فيه، أن النيوترينو ليست له أى كتلة أخرى، إلا الصفرية. وقد يبدو لك أن الأمر غريب، أن بعد كل هذا الجهد الذي بذل على فكرة لم يتم التتحقق من صحتها أولاً في المختبرات، بيد أن قصة *النيوترينو الثقيل*، أكثر تعقيداً من هذا. وفي الواقع، يعد ذلك صورة إيضاحية جيدة والتي أمكنني الحصول عليها للطريقة التي تعمل بها آلية البحث العلمي، لاستبعاد النتائج غير الصائبة. إذن، قبل أن نستمر في بحثنا، أود أن أستطرد قليلاً وأخبرك بما يحلو لي أن أطلق عليه "طفرة النيوترينو الثقيل".

---

(١) أي الذي له كتلة حتى لو كانت ضئيلة للغاية. (المترجم)

## الفصل العاشر

### طفرة النيوتريينو الثقيل

(مهما حاولت أن تطلى الفارننج<sup>(١)</sup> بالذهب، فإنه سوف يبقى فارننجاً كما هو).

من مسرحية "هم س بيتافور أو الفتاة التي أحببت البحر" (١٨٧٨)

وضع موسيقى المسرحية سوليفان وجيلبرت

تقليدياً، يعقد اجتماع الربيع للجمعية الفيزيائية الأمريكية (جمعية الفيزيائيين الخبراء) في واشنطن دي.سي. ومع بعض التطورات غير المتوقعة للأرصاد الجوية، فإن هذا الاجتماع يقام دائماً بعد أسبوع من إزهار الكرز، حيث يحيل المدينة إلى مشهد رائع يصلح كصورة خلابة فوق بطاقة بريديّة. وكان لاجتماع عام ١٩٨٠، أهمية خاصة بالنسبة لي، إذ إنني أصطحبت معى للاجتماع أبني الأكبر - الذي أصبح فيما بعد مديرًا لمدرسة ثانوية - لكي يطلع على عالم العلوم. كان في ذلك الوقت مرتبطة بيحدى الجامعات، ويفكر جدياً في أن يصبح فيزيائياً، ومن ثم، كان أمراً منطقياً أن أجعله يحضر هذا الاجتماع. والآن أتعجب بما إذا ما رأه هناك، لم يؤثر على قراره فيصبح اقتصاديًّا بدلاً من فيزيائي! ويفكر الفيزيائيون في هذا الاجتماع تحديداً، على أنه "اجتماع النيوتريينو الثقيل". والحدث الكبير هو ذلك التصرير الذي أعلنته جماعة

---

(١) عملة معنوية قيمتها نحو ربع بنس يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر الميلادي وكانت من الفضة. (المترجم)

الباحثين التجربيين من جامعة كاليفورنيا في إيرفين، أن لديهم قياسات تدل على أن النيوترينو - الجسيم الذي اعتقاد معظم الفيزيائيين بأن كثلاً صفر - بالفعل يزن شيئاً<sup>(١)</sup> ما. كانت هذه الآراء مثيرة لسبيبين: أولاً، أن الباحث الذي أعلن التصريح هو "فريديريك رينز"، الذي كان أحد مكتشفى جسيم النيوترينو في عام ١٩٥٦. وثانياً، لو كان النيوترينو بالفعل بالثقل الذي أعلنته جماعة الباحثين التجربيين، عندئذ يكون هو الجسيم الذي "يغلق" الكون؛ أي الكثلاً المفقودة التي طالما جد العلماء في البحث عنها طويلاً. وما أن اقترب موعد التصريح، حتى اتضح أن الإشاعات التي تسربت من الاجتماع، حققت نتائج. لقد كان مستحيلًا على أي فرد يريد أن يستمع لبحث (رينز) أن يجد مكاناً في الحجرة المخصصة لهذا، ومن ثم كان هناك تأخير بسبب انتقال الجلسة لقاعة مخصصة للاحتفالات أكبر حجماً، وحيث إنه لم يتسع الوقت لإحضار آلة عرض الشرائح المنزلقة، فقد اضطر (رينز) لإبلاغ الصحفيين الحاضرين شفهياً باسماء جماعته من الباحثين، وكان عليه أيضاً أن يشرح معادلاته الرياضية بالكلمات، ويكتبها في الهواء بأصابعه. وكانت التجربة التي أجراها مسألة صعبة، وتعددت الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى فشلها. بيد أنها لو كانت صحيحة، فمعنى ذلك أن واحدة من "الحقائق" التي تم قبولها على نطاق واسع في الفيزياء الحديثة، كانت خاطئة.

ولكي نفهم لماذا ازدحمت الكثرة الكبيرة من الفيزيائيين في قاعة الاحتفالات تلك، ذات يوم ربىعي رائع في واشنطن، عليك أن تعرف بعض المعلومات عن جسيم النيوترينو. لقد اقترح وجوده لأول مرة في الثلاثينيات من القرن العشرين، عندما كان الفيزيائيون يدرسون التفاعلات التي لاح فيها شيء ما ذو ناقص، فعلى سبيل المثال، كانت هناك - أحياناً - طاقة أكبر موجودة قبل التفاعل مما بعده. واقتراح النيوترينو

(١) يمكن أن تجد القصة الكاملة لتاريخ النيوترينو والصفات المميزة له في كتابي "من الذرات إلى الكواركات" (المؤلف). From Atoms To Quarks

(ويعنى الجسيم المتعادل الصغير)، كوسيلة لرأب الصدع وترميم الأشياء، ولم يتمكن العلماء من اكتشاف هذا الجسيم الافتراضي بذاته، بيد أن نشاطه تضمن التخلص من الطاقة الزائدة وحملها بعيداً، وكذلك الأشياء الأخرى التي بدت أنها مفقودة في التفاعل. وهذا الموقف يفترض أنه يشبه موقف حارس المنزل، عندما يسرق لص شيئاً ما من البيت، أثناء غياب مالكه، إنه يعرف بأن شخصاً ما كان في البيت، لأن شيئاً ما فقد، بيد أن اللص لم يره أحد.

مرت عشرون عاماً قبل أن تصبح منظومات الكشف لدينا، حساسة بما يكفي، لتجد دليلاً مباشراً أن النيوترينو موجود (وكان هذا في تجربة العام ١٩٥٦ التي ذكرت آنفاً). وفي الواقع، فإن النيوترينو جسيم مراوغ، ولو دخل أحدهااليوم في قضيب من الرصاص الصلب، فيمكن بسهولة أن يبزغ من القضيب بعد أربع سنوات من الآن، في النجم "الفا قنطورس" دون أن يحدث اضطراباً واحداً في أى نرقة، لترسم طريقاً لساره. وعلى الرغم من ذلك الإلحاح عن التفاعل مع المادة، فإن النيوتريونات تتنج ويتم قياسها بانتظام في مختبرات المعجلات. وفي الإلكترونيات الحديثة، ليست هناك صعوبة في اكتشافها، كما كان يعتقد من قبل. ومع ذلك، ثمة حقيقة مهمة عن النيوترينو، أن وجوده افترض، قبل أن يعثر عليه بالفعل.

وليس للنيوترينو شحنة كهربية، ولو كانت له شحنة لتم اكتشافه في الثلاثينيات من القرن العشرين. ولابد أنه خفيف للغاية، وإلا لظهرت دلالة على وجود كتلته، والتي يمكن رؤيتها في سلوك الجسيمات التي يتركها خلفه. بيد أن جسيماً خفيفاً - له كتلة ضئيلة - ليس مثل جسيم آخر كتلته صفر. وحتى وقت قريب جداً، إذا سألت فيزيائياً لماذا يعتقد بأن النيوترينو كتلته صفر، ربما سوف تكون إجابته "ولم لا؟". وليس ثمة دليل يبرهن على أن كتلة النيوترينو قيمتها أكبر من صفر، والصفر رقم دائري لطيف وجذاب، من السهل تذكره واستدعاؤه من الذهن. ولو كان كل شيء يعمل مع نيوترينو بلا كتلة، فلماذا تثار المتابع غير محققة النتائج؟

ولكن درب الفيزيائيون على أن يكونوا مفتاحي الذهن للأفكار الجديدة. فإذا قدم أحد الأشخاص دليلاً يؤكد صحة شيء ما، سبق أن ساد الاعتقاد بأنه غير متسق مع الحقيقة الواقع، فطى كل الفيزيائيين الآخرين تفحص هذا الدليل بعناية فائقة.


وهذا ما يحدث تماماً في حالات مثل النيوترينو الذي يفترض أن كتلته صفر، حيث لا يوجد - في حقيقة الأمر - مبرر راسخ للتمسك بالاعتقاد التقليدي السائد. وفي الواقع، ثمة وسائل متباعدة تجريبية للتحقق مما لو كان النيوترينو كثة أم لا. إحدى هذه التجارب تلمح إلى المثال الذي أورينا عن لص المنازل، إذ يمكن للشرطة أن تجد الكثير من الأدلة عن اللص، بالتحفظ الدقيق لسرح الجريمة. وينطبق هذا أيضاً على إيجاد دليل عن الكثافة الصفرية للنيوترينو، بالتحفظ الدقيق للجسيمات التي تدخل في التفاعلات التي تشارك فيها النيوترينيوات. سوف نلقى نظرة إلى بعض من هذه التفاعلات لاحقاً. وثمة وسيلة ثانية لإثبات كثة النيوترينو تتضمن عملية فيزيائية يطلق عليها "الخلط". ولتفهم هذه العملية، عليك أن تعرف حقيقة واحدة أخرى عن النيوترينيوات، وملمح واحد ليكانيكا الكم<sup>(١)</sup>.

والحقيقة هي: هناك أكثر من نوع من النيوترينو. وقد تمكّن الفيزيائيون من رؤية نوعين في المختبر، وتخبرنا النظرية أنه لا بد من وجود نوع ثالث أيضاً، ربما يكون أكثر ندرة. وتنمايز تلك النيوترينيوات الثلاثة عن بعضها، بالتفاعلات التي أدت إلى تشكيلها، وكذلك بالتفاعلات التي تباشرها عندما تتفاعل مع المادة (على الرغم من أن هذا لا يحدث غالباً). وعلى سبيل المثال، فقد أظهرنا - في (الشكل ١٠-١) اضمحلال نيوترون. إن النيوترون - وقد ترك لشأنه - سوف يتحول نفسه تلقائياً بلا سبب خارجي، إلى بروتون وإلكترون ونيوترينو. ولأنه أنتج بالارتباط مع إلكترون، فقد أطلق عليه "نيوترينو إلكترون"<sup>(٢)</sup> وإذا صادف النيوترينيو إلكترون بروتوناً، فيمكن له أن يستهلل

---

(١) نظرية فيزيائية رياضية للمادة والإشعاع الكهرومغناطيسي والتفاعل بينهما. (المترجم)

تفاعلًا، وفيه ينبع - كما هو واضح في الشكل - نيوترون وإلكترون مضاد (أي بوزيترون). وبمعنى آخر، فإن هذا النيوترينيو يرتبط دائمًا بالإلكترون، سواء عند إنتاجه أو تدميره.



وترتبط الأنواع المختلفة من النيوترينيوات باللبتونات<sup>(١)</sup> الأخرى. ونحن نعلم أنه بالإضافة إلى الإلكترون (الذى يعد لبتونا هو الآخر)، ثمة نوعان آخران من اللبتونات يطلق عليهما "ميون وتاو الميزونات"<sup>(٢)</sup>. ونعتقد بأن هناك ثلاثة أنواع من النيوترينيوات في الكون، يرتبط كل واحد منها بأحد هذه اللبتونات.

في هذا الموقف، تقترح قوانين ميكانيكا الكم احتمالية مثيرة لاهتمام. فكر مليًا – بادي ذى بدء – في هذه المقارنة المبنية على التشابه الجزئي: افترض جدلاً أن أمامك

(١) سوف يدرك القراء أن هذا الجسيم في الشكل هو في الواقع نيوترینو مضاد، والصفة الفارقة بين النيوترينيو والنيوترينيو المضاد، ليست ذات أهمية لغرضتنا في هذا الكتاب. (المؤلف)


(٢) اللبتونات: جسيمات أولية ذات كتل صغيرة مثل الإلكترون. (المترجم)

(٣) الميون: جسيم أولي له شحنة سالبة وهو المثلث الثقيل للإلكترون.  
والتاو: جسيم يحمل شحنة سالبة يدخل في التفاعلات الكهرومغناطيسية والقوة الضعيفة.  
الميزونات: جسيم من الجسيمات الأساسية ذات كتل سكونية مختلفة، منها ما هو ذو شحنة كهربية موجبة ومنها ما هو ذو شحنة كهربية سالبة وما هو في حالة تعادل. (المترجم)

امتداداً لثلاثة ممرات محددة في طريق رئيسي عام، الذي يمكن أن تدخل إليه السيارات من خلال ممر محدد واحد. فإذا كنت تقف بالقرب من بداية هذا الطريق الرئيسي العام، سوف تقول بأن كل السيارات تشتراك في الصفة المميزة بأن تكون عند ممر الدخول، وبأنه لا يوجد إلا نوع واحد من السيارات. ومع هذا، عندما يمر الوقت، سوف تبدأ حركة المرور العادية، في دفع السيارات إلى المررين الخاليين. ستتحرك سيارة واحدة لنتمر، وسوف تسرع أخرى لتحرك في الممر المحدد الثالثة. وسوف وفي نهاية الأمر، ستتوزع السيارات بالتساوي في كل الممرات المحددة الثلاثة. وسوف يقول شخص ما، يقف على بعد عدة أميال من منحدر المدخل الذي يربط الممرات الثلاثة، بأنه كان يوجد هناك ثلاثة أنواع من السيارات، كل نوع يمر في واحد من الممرات الثلاثة.

وتحت ظروف معينة، يمكن أن يسلك شعاع من النيوترينيوات، بنفس طريقة خط السيارات المتحرك القائم. ومجموعة من النيوترينيوات المصمحة بمقدورها أن تتشكل شعاعاً من نيوترونات الإلكترونون الخاصة. ومع تقدم هذا الشعاع عبر الفضاء، يمكن للنيوترينيوات أن تبدأ في التغير إلى الأنواع الأخرى منها، تماماً كما بدأت السيارات في تغيير مواقعها فوق الممرات. وفي نهاية الأمر، سوف تتحصل على شعاع مكون من أعداد متساوية من الأنواع الثلاثة، تماماً كما أن السيارات تشغله - أخيراً - كل الممرات في الطريق الرئيسي. ووفقًا لميكانيكا الكم، فهذا الخلط المعين بين أنواع النيوترينيوات، يمكن أن يحدث فقط، إذا كانت كتل النيوترينيوات متباينة، أي لو أن نيوترونـوـ الإلكترونـوـ له كتلة مختلفة عن نيوـتـريـنيـوـ المـلـيـونـ، الذـىـ بـدـورـهـ تكون كتلته مختلفة عن نـيـوـتـريـنيـوـ التـاـوـ. ومع هذا، لو كانت الصورة التقليدية صحيحة، وكل النيوترينيوات الثلاثة كتلتها صفر، عندئذ فلا مجال لحدث الخلط، وسوف يكون لدينا طريق سريع به ثلاثة ممرات محددة، حيث لا يمكن لأى سيارة أن تغير الممر الذي تسير فيه. ومن ثم، فإن دليل الخلط بين أنواع النيوترينيوات، هو أيضًا دليل على الكتلة اللاصفرية للنيوترينيـوـ، وإذا حدث الخلط بالفعل، عندئذ - على أقصى تقدير - فإن

واحداً من أنواع النيوترينوات يمكن أن تكون له كتلة صفرية. ويجب أن يكون الأعضاء الآخرين في مجموعة الخلط، لها كتل أخرى غير الصفر. ويشرح ذلك الفكرة الأساسية التجريبية، التي تم الإعلان عنها في اجتماع واشنطن. وقد تم وضع مخطط التركيب والبنية الفيزيائية لها في الشكل (١٠-٢) . والنيوترينوات التي خلقت بالتفاعلات النووية في مفاعل بحثي، تدفقت في كل الاتجاهات، ولم يستطع أى شيء إيقافها، وما عدا أقدام من الإسمونت مقارنة بسنة ضوئية من الرصاص؟. وبين فترة وأخرى متباude، يبدأ أحد النيوترينوات تفاعلاً في مكشاف<sup>(١)</sup> يقع (في حالتنا هذه) على بعد نحو ستة وثلاثين قدمًا<sup>(٢)</sup> من مركز المفاعل. والجسيمات الناتجة عن هذا التفاعل يتم تتبعها ودراستها، ويستنتج منها وجود النيوترينو.



الشكل ١٠.٢

كل العمليات التي تجري في المفاعل النووي، شبيهة باضمحلال النيوترون والتي أوضحتها من قبل في الشكل (١٠-١) إن تلك العمليات لا تنتج إلا نيوترинوات الإلكترون فقط. وبالمثل، فإن كل العمليات التي تجري في المكشاف شبيهة بما هو

(١) عداد جسمات أولية في مراكز الابحاث خاصة معجلات الجسيمات دون الذرية. (المترجم)

(٢) القدم يساوى ٣٠ سنتيمترا. (المترجم)

موضح إلى اليمين في الشكل (١-١٠)، وهي لا تبدأ إلا بنيوترينوات الإلكترون فقط من المفاعل، ولا يمكن “رؤية” إلا نيوترينوات الإلكترون في المكشاف.

ولو كانت وجهة النظر هذه - المقبولة - صحيحة، وأن كل النيوترينوات بلا كتلة، عندئذ، لن تكون هناك أية صعوبات تواجهنا. إذ إن كل نيوترينيو إلكترون ينتج في المفاعل، سوف يظل كما هو “نيوترينيو إلكترون”， عندما يمر عبر المكشاف وتلوح له الفرصة لكي يبدأ تفاعلات. بيد أنه لو كان بعض النيوترينوات كتلة ما، عندئذ سوف يحدث الخلط بين المفاعل والمكشاف. ولنتحدث مجازياً، سوف تغير بعض النيوترينوات مماراتها المحددة. ويعنى هذا وبالتالي، تناقص عدد الجسيمات التي يتم اكتشافها، لأنه على الرغم من أن العدد الكلى للنيوترينوات - التي تتدفق عبر المكشاف - لن تتغير، فإن العدد الذي يبدأ التفاعلات - أي عدد نيوترينوات الإلكترون التي تم مراقبتها - سوف يتناقص. وفي مثالنا عن الطريق الرئيسي العام، فهذا مساوا في المعنى للتصرير بأن عدد السيارات التي تسير في المر الأول، سوف يتناقص عندما يمتئي المران الآخران بالسيارات. وما وجدته مجموعة “إيرفن” في تجربتهم، أن عدد النيوترينوات الناتجة، والتي أمكن تتبعها على بعد ستة وثلاثين قدماً من مركز المفاعل، كان أقل من العدد الذي أوضحته إحصائياتهم، عن النيوترينوات التي تقادر المفاعل. وقد فسروا هذا دليلاً لتلك الطريقة من الخلط بين أنواع النيوترينيو، التي كنا نناقشوها، وهذا ما يطلق عليه “تنبذب<sup>(١)</sup> النيوترينيو”， في المصطلحات الفيزيائية. ما دامت التنبذبات من النيوترينيو، فقد اتخذ هذا دليلاً على أن النيوترينوات ليست بلا كتلة، كما اعتند من قبل.

لقد كان هذا اقتراحًا بالغ الأهمية. إننا نعرف أنه في التاريخ المبكر للانفجار الأعظم، كان هناك العديد من التفاعلات النووية، وأنتج الكثرة الكبيرة منها جسيمات النيوترينوات، كمنتج فرعي، تماماً كما فعل أضمحلال النيوترون. ولهذا السبب، يفترض

---

(١) تغير نوعي في طاقة منظومة آلية أو كهربائية أو ذرية. (المترجم)


أن هناك أعداداً هائلة من النيوترينيوات هناك، ربما يصل عددها إلى مائة مليون لكل جسيم عادي ثقيل. وإذا كان لكل نيوتروينو كتلة - حتى لو كانت ضئيلة للغاية - فإنها سوف توفر مادة كافية لغلق الكون. وبينما على ذلك، ففي عصرنا الحديث، عندما يحزن الفيزيائيون المحافظون، من أن نتائج تجارب "إيرفن"، يجب أن يتعامل معها بارتياح، حتى يتم التأكد من صحتها ودققتها من المختبرات الأخرى، التي يبذل فيها علماء الكون، قصارى جهدهم، لتفسير مشكلة المجرات وجود المادة المظلمة، عن طريق "كتلة" النيوترينيو التي تم التوصل إليها حديثاً. وكانت معظم المجادلات ضد النيوترينيو كمكون وحيد للمادة المظلمة (انظر الفصل التاسع) قد احتمل خلال ذلك الحماس والاندفاع الذي تلى اجتماع واشنطن.

ومن المهم أن نتذكر أنه على الرغم مما يوحى به اكتشاف التذبذبات في حزمة النيوترينيو، بأن له كتلة، فإنه لا يخبرنا ما هي هذه الكتلة. وتتنسب السرعة التي تغير بها النيوترينيوات مساراتها في الحزمة، إلى الاختلاف في الكتلة بين النيوترينيوات المتباينة. ويقدر تشابه هذا الاختلاف، ستكون التذبذبات متماثلة، بصرف النظر عما إذا كان النيوترينيو كتلة تساوى جزءاً من مليون من الإلكترون، أو كتلة فيل!

ويخبرنا ذلك، لماذا كان لتصريح من معهد الفيزياء التجريبية والنظرية في موسكو (روسيا الاتحادية) - الذي صدر بعد اجتماع واشنطن بعده أشهر - مثل هذا الدور البالغ الأهمية في قصة النيوترينيو. إذ ظلت جماعة من العلماء هناك تعمل بتأنٍ لأكثر من عقد لتحديد كتلة النيوترينيو، مستخدمين مقاييس متناهية الدقة، للتعرف على ما أزاحه النيوترينيو من التفاعلات التي شارك فيها، وهذا ما أطلقت عليه آنفاً "تقنية لص المنازل".

وكان المخطط ما يلى: عندما يضمحل النيوتريون، كما هو موضع في الشكل (10-1)، فإن الطاقة تحملها بعيداً الثلاثة جسيمات الناتجة. وإذا أخذت الإلكترون فقط بعين الاعتبار، فيمكن أن يكون له المدى الكامل للطاقات، على طول الطريق من الصفر

(عندما يحمل البروتون والنيوترون كل الطاقة) إلى الطاقة القصوى الممكنة في العملية (عندما يحمل الإلكترون كل الطاقة)، عندئذ سوف يتم تصويره كمنحنى مثل ذلك الموجود إلى اليسار في الشكل، (١٠-٢) وفي معظم الحالات، سوف تقاسم - تقريباً - الجسيمات الثلاثة الطاقة. وأحياناً فقط يحمل الإلكترون معظم الطاقة، وذلك الجزء من المنحنى، حيث يحدث هذا الأمر، موضوعاً في إطار مربع داخل الشكل.



الشكل 10.3

إلكترون  
ليس به طاقة

والآن، إذا تأملنا عن كثب في الموقع الذي به إطار المربع، يمكننا أن نتعلم شيئاً عن كتلة النيوترون، ذلك أن هذه الكتلة هي أحد الأشياء التي تحدد الطاقة القصوى التي يمكن للإلكترون أن يحملها. ويحدد الطاقة الكلية المتوفرة في التفاعل، الاختلاف في الكتلة بين النيوترون الأولي، وكتل الجسيمات الثلاثة النهائية. وهذا الاختلاف في الكتلة تبعاً للمعادلة ( $\text{ط} = \text{k} \times \text{s}^2$ )<sup>(١)</sup>، يخبرنا كم تبلغ كمية الطاقة التي يمكن للجسيمات حملها فيما بينها. وإذا كان النيوترون كتلة، فإن مقدار الطاقة المتاحة للجسيمات الأخرى، سوف تتحفظ بما يعادل هذه الكتلة. وبالتالي، فإذا كانت للنيوترون كتلة، فإن عدد الإلكترونات في موقع الإطار المربع، سوف يتتساقط أسرع مما

(١) الطاقة تساوى حاصل ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء. (المترجم)

لو لم تكن للنيوترينيو كتلة، وهذا موضح إلى اليمين في الشكل (٣-١٠) وبملاحظة إلى أي مدى ينخفض عدد الإلكترونات، مع زيادة طاقة الإلكترون، يمكنك أن تعرف ليس فقط مما إذا كانت للنيوترينيو كتلة غير صفرية، بل أيضًا تستطيع أن تحدد ماهية هذه الكتلة.

و قبل أن أخبرك بما أعلنته المجموعة الروسية، يجب أن أتحدث عن الوحدات التي تقاد بها كتلة النيوترينيو. الإلكترون فولت (رمزه eV) وحدة لقياس الطاقة، وهي كمية طاقة الحركة التي يكتسبها الإلكترونوحيد غير مرتبطة عند تسريعه، بواسطة جهد كهربائي ساكن قيمته فولت واحد في الفراغ. وعلى سبيل المثال، عند تسريع الإلكترون من أحدقطبي بطارية سيارتك إلى القطب الآخر، يتطلب اثنى عشر الإلكترون فولت من الطاقة، ما دامت الكتلة والطاقة متكافتين، فمن الممكن قياس الكتل بالإلكترون فولت، وهو تطبيق بسيط لمعادلة الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء.

وعلى سبيل المثال، فإن كتلة الإلكترون حوالي ٥٥٠،٠٠٠ إلكترون فولت، بينما أن كتلة البروتون ٩٣٩ مليون الكترون فولت (MeV) وتبلغ كتل النيوترينيوات - التي نحن بصددتها - في حدود تتراوح ما بين صفر و ٥٠ إلكترون فولت، أي نحو ١٠٠،٠٠٠ مرة أخف من الإلكترون ذاته.

وما أعلنه الروس هو: وفقاً لبياناتهم، كتلة النيوترينيو هي أقل من ٤٦ إلكترون فولت (eV)، ولكنها أكبر من ١٤ إلكترون فولت (eV) وكانت النقطة ذات الدلالة، أن هذه الكتلة لا يمكن أن تكون صفرًا. ودعم دليل "إيرفين" عن التذبذبات، هذا التصريح الروسي المعلن بأن النيوترينيوات ربما كانت هي المكون الرئيسي للمادة المظلمة. بيد أن الفيزيائيين مجموعة من المشاكسين المحبين للجدال، وعادة ما ينتظرون إلى أي اكتشاف جديد مثل كتلة النيوترينيو اللاصفرية كهدف يصوّبون نحوه انتقاداتهم. وليس كتقدير علمي، وأول شيء يحتمل أن يسأل عنه التجاربيون هو "ما الذي يمكن أن يخدعك لتفكّر أنك حققت إنجازاً ما، بينما أنت - في الواقع - لم تتحقق شيئاً؟". وإننى على يقين، بأن أي مجموعة من العلماء، لن تأخذ هذا السؤال بجدية أكثر من الفيزيائيين

التجريبيين: ولن يعمل أى منهم بقوة وطاقة كبيرتين، ليدحض النتائج التى توصلوا إليها، ولا أحد سوف يخضع نتائج الآخرين إلى مثل هذا الهجوم المضاد، وبالطبع لا يتم هذا بشكل شخصى، فمعظم الفيزيائيين يتعاونون معاً، مثل أى مجموعة أخرى من المهنيين الخبراء. وينظر إلى الصراع - ببساطة - على أنه أكثر الطرق كفاءة لتقديم العلم. ولن يقبل شىء إلا إذا خضع لنقد جماعى مضمن. ولن يمكنك فهم الخطوة التالية فى قصة النيوترينو برمتها، إذا لم تحتفظ فى ذهنك بالخصائص المميزة للمجتمع الفيزيائى.

لقد أثارت التجربتان اللتان، أعلن عنهما فى العامين ١٩٨٠ و ١٩٨١، الاهتمام البالغ بين العلماء، خاصة أنهما توصلتا إلى نفس النتائج من خلال وسائلتين متباينتين. وبالتأكيد أن كلاً منها يتضمن بعض الارتباطات. ففى تجربة "إيرفن" على سبيل المثال اعتمدت النتائج على الإفاداة بأن عدداً أقل من النيوترينوات قد تم تتبعها، مما كان يتوقع المرء. وماذا لو حدث خطأ ما فى إحصاء عدد النيوترينوات التى ترك المفاعل؟ وعلاوة على ذلك، إن النيوترينوات ليست الجسيمات الوحيدة التى تأتى من الجزء المركزى من المفاعل، إذ ربما تختلط بها بعض النيوترونات، مما يفسد نقاط الشعاع. والنهج التقليدى للتعامل مع هذا النوع من المشاكل، هو استخدام المنظومات الإلكترونية لانتقاء الجسيمات التى تريدها، ولكن عند التعامل مع جسم مراوغ كالنيوترينو، فإنه يتطلب القلق عن مدى أرجحية أنك ضمنت أو استبعدت بطريقة منهاجية، بعض الأحداث الخاطئة فى هذه العملية. والطريقة الوحيدة للتغلب على هذه الشكوك، هو إعادة إجراء التجربة (ويفضل أن يكون فى مفاعل مختلف)، فى موقع يكون فيه الكاشف قابلاً للتحريك، ومن ثم يمكن قياس الشعاع أولاً فى موضع معين، ثم فى موضع آخر، أبعد ولكن فى نفس الاتجاه. وبهذه الطريقة، سوف تمحى أى أخطاء من ذلك النوع الذى ذكرناه آنفًا، وهكذا يمكن قياس التذبذب، بين الموضعين بدقة بالغة.

أما فيما يتعلق بعدم قيام مجموعة "إيرفن" بإجراء التجربة بهذه الطريقة، فإن هذا لا يوجب توجيه النقد للعلماء الذين قاموا بها، إذ إنهم أدوا عملهم تبعاً للإجراءات المعترف بها، كما أنهم أوضحوا بأنفسهم الحاجة إلى القيام بتجربة قياس الموضعين، ولكن لكي تحرك كاشف نيوترينو، يزن العديد من الأطنان، من مكان إلى آخر داخل الجنبات المزدحمة بالأجهزة في مفاعل رئيسي، أمراً تكتنفه الصعوبات الكثيرة. والواقع، فإن بعض الجماعات التي تقوم بهذا النوع من العمل، تجد أنه أكثر سهولة تشبييد كاشفين ضخمين، بدلاً من محاولة تحريك كاشف واحد. وعلى أية حال، فإن نتائج أبحاث "إيرفن" لا يمكن قبولها، إلا بعد إثبات صحتها بهذه الطريقة تحديداً.

وقياسات موسكو أيضاً تعاني من مشاكل متصلة. ولقد تحدثت بطريقة خالية من الرسميات، عن قياس أضمحلال النيوترون، وثمة حقيقة واضحة في هذا المجال، مفادها أنه لا توجد تجمعات ضخمة من النيوترونات الحرة في الطبيعة.

ومن الناحية العملية، فإن التجربة الروسية قد أجريت، بقياس ذرة "الтриتيوم" التي تشتمل نواتها على بروتون واحد ونيوترونين. والтриتيوم نظير للهيدروجين، ومن ثم يمكنه أن يشكل رابطة كيميائية مع أي مادة يوجد فيها الهيدروجين بطريقة طبيعية. وكان триتيوم الذي تم قياسه مرتبطاً بجزءٍ ضئيلٍ معدٍ يطلق عليه "فالين"<sup>(١)</sup>.

ولكن أظهر هذا المخطط نوعاً جديداً من المشاكل. إذ عندما يض محل النيوترون داخل نواة триتيوم داخل جزءٍ ضخمٍ، فإنه يمكن للطاقة الانتقال إلى الجزء بالإضافة إلى الجسيمات التي تنتقل إلى الخارج. وبعد الأضمحلال - على سبيل المثال - قد يتذبذب الجزء مثل الورز المهزّ. وهذا الانتقال للطاقة سوف يخفض من الطاقة القصوى التي يمكن للإلكترون اكتسابها، وهذا العجز في مقدار الطاقة، يمكن أن يبيّن - على غير الحقيقة - مثل كثافة النيوترينو. والطريقة الوحيدة لتصحيح هذا الارتباك

---

(١) حمض أميني يدخل في تكوين البروتينات في الجسم. (المترجم)

المحتمل (بدلاً من القيام بالحسابات النظرية) سوف يكون بإعادة التجربة بالترتيب يوم ولكن في بيئه متباعدة، إما بمادة مختلفة أو بنفس الترتيب.

وبالتالي، كان واضحًا في مطلع العام ١٩٨٢، بأنه على الرغم من النتائج الإيجابية لهاتين التجربتين، فإن الأمر يقتضي القيام بعمل شاق، قبل قبول النيوترينيو الثقيل. وربما تتعجب لماذا – في ضوء كل الشكوك – لم يتبن مجتمع العلماء النظريين، أسلوب الترقب حتى تتأكد النتائج، قبل البدء في إجراء أبحاثهم على كون تؤدي فيه النيوترينيوات الثقيلة دور المادة المظلمة. ويجب أن تكون الإجابة متناقضة مع الطريقة التي تعمل بها مجتمعات العلماء النظريين في الفيزياء والفيزياء الفلكية.

إن النظرية هي لعبة الشباب. وبالطبع هناك استثناءات جديرة باللاحظة، ولكن لأن المستقبل الكبير المتسع للفيزيائي النظري، يحدده ما يمكن من إنجازه في العقد الأول بعد تخرجه في الجامعة، قل عندما يكون عمره بين خمس وعشرين وخمس وثلاثين سنة. وفي تلك الحقبة القصيرة من الزمن، فإن الفيزيائي الطموح يجب أن يقوم بعمل مثير يبهر الآخرين، حتى يشد اهتمام زملائه حول العالم، وأحد أفضل الطرق لتحقيق ذلك، أن يكون أول من يستثمر لأقصى استفادة ممكنة، ابتداع تجرببي جديد. فإذا كتبت واحداً من أول البحوث التي تشرح فيها ببساطة كيف يمكن حل مشكلة المجرات، بدلالة النيوترينيوات الثقيلة، فإنه سوف تحصل في التو على درجات نجاح أكاديمي، بالإضافة إلى دعوات لزيارة الجامعات الأخرى، لشرح ما قمت بإنجازه، وكذلك سوف تحصل على منح بحث ضخمة من جهات ممولة، وإذا كنت محظوظاً للغاية، فسوف تحصل على دعوة لكتابه مقال بمجلة "الأمريكي العلمي" تلخص فيه عملك، عن هذا المجال الجديد. بيد أنك لكي تناول كل هذه المكافآت، لابد أن تسارع باتخاذ مكان في ذلك المجال العلمي، ومعك قطعة بحث رئيسية. ويجب أن ينظر إليك الجميع باعتبارك رائداً.

ويفسر هذا الأمر ذلك الضغط المروع على الفيزيائيين النظريين – سواء كانوا شباباً يريدون ترسیخ سمعة أو كباراً راغبين في إدامه مكانتهم العلمية – للتحرك

بسرعة، عندما يتجلّى مجال جديد في الأفق. وبالتالي، فبمجرد طفرة التوصل إلى النيوتريينو الثقيل، شكل العلماء النظريون أكواناً جديدة كاملة، الواحد تلو الآخر، مستقدين على بعض النتائج التجريبية الأولية للغاية. وبالتعرف على الطريقة التي تعمل بها جماعة العلماء النظريين، فإن هذا السلوك يعد مفهوماً ويمكن تبريره لحد بعيد: إنه أسلوب عقلاني للنظر إلى احتمالية حدوث شيء ما.

وإذا أجريت اختياراً دقيقاً على نتائج تجربة ما، ثم اتضحت فيما بعد أنها ليست متسقة مع الحقيقة والواقع، فإنك لن تخسر شيئاً. والابحاث التي نشرتها في هذا المجال، سوف تجذب بعض الاهتمام العابر السريع الزوال، ولن يلومك أحد، أذلك اعتمدت في كتابتها على ابتداعات تجريبية خادعة وغير صحيحة. وعلى كل حال، فإن التجربة غير الصائبة ليست خطأك. ومن ناحية أخرى، إذا كانت نتائج التجربة صحيحة، فسوف تحظى بالحصول على كسب كبير.

والأمر الأكيد الوحيد، أذلك لو انتظرت حتى تنشر نتائج التجربة على نطاق واسع، فإنك سوف تخسر بالتأكيد، إذ سيفامر الآخرون ويعلنون الاكتشافات الرئيسية، وكل ما عليهم عمله هو إضافة ملاحظات هامشية إلى أبحاثهم.

وتتضمن تلك الطريقة في العمل، أنه حتى مجرد إشاعة عن ابتداع تجريبى جديد، سوف يدفع - على الأرجح - الباحثين إلى جانب جديد من ذلك المجال العلمي.

- إن هذا يفسر القبول الواسع للأفكار الجديدة في العلم، كما يشرح - في نفس الوقت - لماذا الأفكار التي تروجها الصحافة وكأنها نهائية في أحد الأعوام، سرعان ما تختفي في العام التالي، ولا يسمع بها أحد من جديد، وهذا ما كان عليه مصير النيوتريينو الثقيل.

وبينما انشغل علماء الكون في بحث نتائج النيوتريينات ذات الكتل، قريباً من طاقة ثلاثين إلكترون فولت، فإن مجموعات من الباحثين في المفاعلات حول العالم، لم يكونوا أقل اشتغالاً لإثبات صحة النتائج التي توصل إليها علماء "إيرفن".

وجاء التصريحات الجديدة الأولى نتيجة لاختبارات متعدلة لا يمكن الاعتماد عليها: وتوقف الاستمرار في إجراء التجارب وقتئذ، وعدل الباحثون بسرعة من معداتهم وتجهيزاتهم لتفحص تذبذبات النيوترونات. خلال تلك الفترة المبكرة، كان الموقف ضبابياً إلى حد ما. بدا أن بعض الباحثين يدعمون فكرة التذبذبات، بينما رفضها البعض الآخر. بيد أنه بمرور الوقت، صممت التجارب خصيصاً لهذه المهمة تحديداً، وأخذت في التقييم تحت مراقبة حاسوب مركزي، وببدأ ما كان يعد فشلاً في التحول إلى نجاح. وأخذت القيود على وجود التذبذبات في إشعاعات المفاعل، تتناقص رويداً. وأصبح واضحاً، أن النتائج الأصلية كانت ببساطة خاطئة (على الرغم من أنني لم أسمع أحداً على الإطلاق يشرح السبب في هذا)، وأنه إذا كانت تذبذبات النيوترونات موجودة بالفعل في الطبيعة، فلن يمكن مشاهدتها إلا بتجربة دقيقة للغاية وبالغة الصعوبة، وفي العام ١٩٨٤، بنفس المكان الذي أعلنت فيه أول نتائج إيجابية. قدم فيلكس بوهم (١) من كالتك تقريراً يتضمن مراجعات نقية في هذا الصدد، أوجز فيه الموقف التجاري، وقضى تماماً على فكرة تذبذبات النيوترونات.

ووضع هذا التقرير علماء الكون، في موقف مرتبك ومضطرب، إذ على الرغم من أن تجربة التذبذب لم تعط قيمة لكتلة النيوتروينو فإنها منحت مصداقية لنتائج التجربة الروسية، التي أعطت بالفعل قيمة لهذه الكتلة. ومن ثم يجب على التوقعات عن الدور المحتمل للنيوترونات الثقيلة في الكون، أن ترتكز على هذه النتائج وحدها، التي تم خضت عن تجربة وحيدة. وإلى جانب ذلك - وعلى الرغم من أنه عادة ما يعتبر من غير اللائق الإفصاح عن هذا الأمر بشكل علني - فإن علماء الغرب لا يولون أي ثقة في التجارب التي تجري في الاتحاد السوفيتي (٢)، خاصة عندما تتضمن هذه التجارب قياسات دقيقة، وتطلب معدات إلكترونية متقدمة. إذ إن الباحثين الروس ليست لديهم سجلات أداء للإنجازات الفعلية، مثل هذه التجارب العلمية، ربما يرجع السبب - على خلاف زملائهم في الغرب - أنهم مجبرون على استخدام أي من المعدات الإلكترونية التي لا تحتاجها القوات المسلحة.

(١) معهد كاليفورنيا للتقنية California Institute of Technology. (المترجم)

(٢) روسيا الاتحادية حالياً. (المترجم)

وخلال منتصف الثمانينيات من القرن العشرين، أخذ الاهتمام بالنيوترونات الثقيلة يتضاعف رويداً بين علماء الكون. أما العلماء النظريون الذين كانوا يجدون في البحث عن إنجاز كبير مفاجئ، فقد تحولوا إلى المادة المظلمة الباردة (انظر الفصل السابع) ثم إلى الأوتار الكونية (الفصل الثاني عشر). ومن وقت لآخر، كان ثمة ولاء كلامي كانب يتضمن تملقاً ومدافعة للنتائج الروسية، ولكن من الآن فصاعداً، لم يأخذ النيوترونات الثقيلة مأخذ الجد، إلا عدد قليل من الباحثين. وفي الوقت نفسه، قام العديد من المختبرات حول العالم، بإجراء عمليات مضنية، لتشييد معدات لتكرار قياسات الإلكترونات التي تترجم عن أضمحلال النيوترونات في "الтриتيوم". وفي زيوريخ، أدمج التريتيوم في مادة خاصة أساسها كربوني، ولكن لم يجده في جزءٍ، كما حدث في التجربة الروسية، وفي "لوس ألاموس".<sup>(١)</sup> قام الباحثون بقياساتهم على غاز التريتيوم.

وتميزت تقنية زيوريخ بمقدرتها على إجراء العديد من القياسات لأضمحلالات التريتيوم، وكان على الباحثين القلق على تأثيرات المادة الكربونية. أما مجموعة "لوس ألاموس"، فقد كانوا يجريون تجاربهم على تريتيوم "نقى"، وكان عليهم أن يكونوا قانعين برؤية عدد أقل من الأضمحلالات، لأن التريتيوم في حالة غازية وليس صلبة.

وفي صيف العام ١٩٨٦، أعلنت النتائج التي تم خضت عنها تلك التجارب، بينما كانت الجماعات في "زيوريخ" و"لوس ألاموس" مازالت تتجاذب حول أيهما يستخدم أفضل الوسائل في تجاربهم، واتفقا على أمرين: أولهما مفاده أن احتمالية أن تكون كتلة النيوترونيو صفرية (أو باللغة الضالة)، تتناغم مع البيانات التي أمكن الحصول عليها، وثانيهما أن كتلة النيوترونيو يجب أن تكون - على أية حال - أقل من حوالي ثمانية عشر إلكترون فولت (ثمانية وعشرين إلكtron فولت بالنسبة لتجربة "لوس ألاموس").

ويمعني آخر، فموجة التجارب الثانية، تتناقض مع نتائج التجارب الروسية، وادعائها بأن كتلة النيوترونيو يجب أن تكون أكبر من أربعة عشر إلكترون فولت. ويتوقع

---

(١) مختبر لوس ألاموس القومي - في نيومكسيكو Los Alamos National Laboratory. (المترجم)

معظم الفيزيائيين، أن القيود المحددة لكتلة النيوتروينو سوف تتدفع للانخفاض أكثر، مع القيام بتجارب إضافية. وعندما تصل هذه القيود إلى أقل من أربعة عشر بعده قليل من الإلكترون فولت، فإنها سوف تتوقف على أن تدخل في دائرة "الاهتمام الكوني"؛ إذ إنه لو كانت كتل النيوتروينات بهذا القدر من الصالة، فإنها لن تتمكن من غلق الكون. والرأي عندى أنه لو أجري اقتراعاً بين الفيزيائيين اليوم، فإن معظمهم سوف يرى أن هذه المحصلة هي العاقبة الأكثر ترجيحاً، لطفرة النيوتروينو الثقيل.

ما الذى نستخلصه من كل هذا؟ إن الاهتمام الذى تعاظم فجأة، وبدأ فى ذلك الربيع الجميل من بعد ظهر أحد أيام العام ١٩٨٠، قد تبدى. وبمرور عقد من الزمن لن يتذكر أحد، إلا المؤرخون، أن علماء الكون - لفترة زمنية قصيرة - انشغلوا بفكرة النيوتروينو الثقيل، كمكون رئيسي للمادة المظلمة.

إن ذلك الافتراض سريع الزوال، قد أنسهم إلى حد ما فى فهمنا للكون، ولكنه يجب أن يسهم بشكل كبير فى فهمنا للطريقة التى يعمل بها العلم.

واعتماداً على حالتك المزاجية، فإنك سوف "تنظر بحذر" أو سوف "تشير بفخر". وفي الحالة الأولى، ستفكر فى كل الجهود الضائعة وتسارع العمليات العملية، على الرغم من أن النتائج الأولية التجريبية، مازالت تصنف تبعاً لتنوعها، وهكذا استندت كل المواهب من أجل لا شيء. أما إذا اتخذت الحالة الأخيرة كرأى لك، فإنك سوف تتباهى لأنك خلال عدة سنوات قصيرة، أمكن توضيح موقف بالغ التعقيد، وذلك بجهود مشتركة المجتمع الفيزيائى الدولى. وظهر أن كتلة النيوتروينو بالغة الصالة وتکاد أن تكون صفرأً، ووضعت الطرق لاكتساب المزيد من المعرفة عن هذا الأمر، الذى يعد أحد الثوابت الأساسية للطبيعة. وسوف يكون من حقك المجادلة، أن بعض السنوات من الارتباك والتشوش، كانت ثمناً زهيداً دفع للحصول على هذه النتيجة.

وأيا كان الموقف الذى تتخذه، فإنه يبدو واضحاً - بصرف النظر عما سيكمن عليه الحل لمشكلة المادة المظلمة - أن هذا الحل لن يتضمن النيوتروينات الثقيلة فقط، بل ربما لن يشتمل على النيوتروينات على الإطلاق. لابد إذن أن نسعى إلى البحث عن احتمالات أخرى، أكثر إثارة للاهتمام.

## الفصل الحادى عشر

هل تحكم الجسيمات الكتيلية ضعيفة التفاعل فى الكون؟  
تلك المرشحات الغريبة، مكونات للمادة المظلمة

(الحصان أحادى القرن، حيوان أسطوري).

(جيمس ثارير)

"الحصان أحادى القرن في الحديقة"

إن مجموعة العوامل والظروف الحالية التي تتعلق بالمادة المظلمة، تتلخص في أننا نعرف بوجود كمية هائلة منها في الكون، واستطعنا استبعاد كل نوع عادي من الجسيمات المرشحة التي نعرفها، ويمكن إنتاجها في مختبراتنا، وفي مثل هذه الظروف، لا يمكننا أن نصل إلى أية نتيجة، ورغم ذلك فالمادة المظلمة يجب أن تكون موجودة بشكل ما. لم نشاهد بعد وأنتا غير مدركين لخصائصها على الإطلاق. وربما تشعر بمعنعة، إذا ذكرت بأنه من الطبيعي، أن يسبب هذا الموقف العصيّب حيرة بين الباحثين المتخصصين، الذين كانوا يتناقشون بجدية في اجتماعات مغلقة، ثم يتصرفون بوقار، ويحزنون بأسى على فشل أبحاثهم في التوصل إلى المكونات الأساسية للكون. وكنت أريد أن أقرّ هذا الأمر، وأحقق توقعاتك، ولكنني لا أستطيع، لأن الحقيقة هي أن علماء الكون، وجدوا أنفسهم في طريق مسدود، ومن ثم، تصرفوا كطفل وجد نفسه أمام كومة، من اللعب الجديدة في عيد الميلاد. وأكثر ما يفضله العلماء

النظريين، موقعاً يطلقون فيه العنان لخيالهم دون الخوف من أى شيء - مثل تجربة أو ملاحظة هوجاء - لتنهى لعبتهم. وعلى أية حال، استطاعوا تقديم اقتراحات فريدة، عما قد تكون عليه المادة المظلمة للكون.

والطريق الذى اتخذه لتحقيق ذلك هو كما يلى: إنهم اعتنقوا نظرية حديثة مسيرة للعصر، عن التفاعلات بين المكونات الرئيسية للمادة، ولاحظوا أن هذه النظرية إما أنها تتطلب أو تسمح بوجود جسم جديد من نوع ما. وقاموا بدراسة المتطلبات التى تتضمنها طبيعة هذا الجسم غير المكتشف بعد، وعما إذا كان بمقدوره أن يؤدي دور المادة المظلمة الباردة، كما أوضحنا فى الفصل السابع، وأعلن فى عرض جماهيرى رائى، أن المكون الرئيسي للكون قد تم اكتشافه.

ويوضح أسلوب الأداء فى هذا البحث - مثل أى شيء آخر - الجمع بين فيزياء الجسيمات وعلم الكون، ووجود كل جسم سوف تناقشه فى التو، كان قد اقترح فى الأصل لأسباب ليست لها أية علاقة، ببنية الكون، والبحث فى خصائصها كان مدفوعاً فقط، بالاحتياجات الداخلية للنظريات التى صيفت لتشرح التفاعلات بين الجسيمات الأساسية. وبعد استكمال هذه الخطوات فحسب، أدرك الباحثون أن تلك الجسيمات يمكنها أيضاً أن تؤدى دوراً كونياً. عندئذ، ما هي بعض الجسيمات التى افترض أنها تكون المادة المظلمة. ويشار إليها إجمالاً بـ WIMPs وهى لفظة أوانية<sup>(١)</sup> لتعبير: "أى "الجسم الثقيل ضعيف التفاعل". وإذا تفحصت أشهر الجسيمات التى تم اقتراحها كمكونات للمادة المظلمة، خلال السنوات القليلة الماضية، سوف أترك لك الخيار لكي تخمن إليها كان معيناً لا يصلح. ولكن قبل البدء فى ذلك التمرين فى الخيال، أود أن أؤكد على نقطة واحدة من الناحية العملية:

---

(١) كلمة مكونة من الأحرف الأولى لكلمات أخرى. (المترجم)

ليس أى من أشكال المادة التى سوف نذكرها - ولا واحدة منها - قد تم ملاحظتها فى المختبر. ربما تفكر أنها يجب أن توجد، ولعلك حتى تجادل، فى أننا إذا تعمقنا فى البحث بدرجة كافية، فإننا سوف نجدها، بيد أن عدداً من علماء العصور الوسطى، فكروا بنفس هذا المنطق، عن الحصان الأسطوري وحيد القرن.

وما دام وصف المزيد من الاحتمالات الغريبة، سوف تقودنا إلى بعض المجالات الدراسية الثانوية بعيدة عما نبحث عنه، ومن يرغب فى أن يتتجنب مخاطر هذه المغامرة غير المحسوبة النتائج، فيمكنه أن يتقدم إلى الأمام، على الملاحسن فى صفحة ١٧٦، حيث قمت بوضع قائمة، سجلت فيها الجسيمات المرشحة - كمكونات المادة المظلمة - وكذلك صفاتها المميزة.

### التماثيل الفائق

إلى هنا، يبرز العدد الأكبر من مرشحات المادة المظلمة، من مبدأ أساسى يعرف بالتماثيل الفائق، والنظريات التى تفرض مقدماً التماثيل الفائق، هي تلك التى تؤدى كل القوى الأربع، وهى النظريات الجوهرية التى تتحكم وتنظم اللحظة الأولى فى عمر الكون، وفي المصطلحات العلمية الجذلة لعلم الكون الحديث، يشار إليها أحياناً باللفظة الأولئيكية TOE للعبارة "Theory of Everything" أى نظرية لكل شيء<sup>(١)</sup>.

ولكن ما هو التماثيل الفائق؟ عندما تتحطم المادة إلى مكوناتها الأساسية، فإننا نتعرف على نوعين من الجسيمات الأولية. أولهما، الكواركات وجسيمات مثل الإلكترون (أى لبتونات)، هي التى تكون المادة الصلبة، وتصنف هذه الجسيمات كمجموعة تحت مصطلح "فرميونات"، نسبة إلى (إنريكو فيرمي) الفيزيائى الإيطالى - الأمريكى الذى تفحص بدقة - لأول مرة - صفاتها الخصوصية. وتميز هذه الجسيمات بحقيقة أنها

(١) من المفترض أنها قادرة على تفسير جميع الظواهر الفيزيائية. (المترجم)

تلف<sup>(١)</sup> حول محاور نورانها، بمعدلات تمثل كسوراً من العدد الصحيح للوحدة الأساسية للدوران. ويعنى آخر، لها لاف  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{2}{2}$  و  $\frac{3}{2}$  وهكذا، ولكنها لا تلف أبداً بمعدلات .. ١, ٢, ٣.

وقد أطلق مصطلح (بوزونات) على فئة ثانية من الجسيمات - نسبة إلى الفيزيائى الهندى (س.ن.بوز)<sup>(٢)</sup>. وتلك الجسيمات لها معدل لاف .. ١, ٢ .. وهكذا.

وعلى غير الفرميونات، فهى ليست جزءاً من بنية المادة الصلبة. وبخلاف ذلك، فإنها تمر بسرعة وخفة بين الجسيمات الأخرى، مما يؤدى إلى إنشاء القوى التى تربط المادة ببعضها (أو فى أحوال معينة، تمزقها إرباً).

ويعد الفوتون أكثر البوزونات المألوفة، وهو الجسيم الذى يرتبط بالضوء العادى. وعندما يتم تبادل الفوتونات إلى الأمام والخلف بين جسيمين مشحونين (على سبيل المثال، الإلكترون والنواة التى يدور حولها)، فإن هذا يؤدى إلى إنشاء القوة الكهربائية المألوفة، وبينما على ذلك، يمكن اعتبار أن أجزاء الذرة تتماسك معًا بالفوتونات التى يتم تبادلها بين الإلكترونات والنواة.

ونرى في الـذرة بوضوح كبير، الأدوار التي يؤديها نوعان من الجسيمات، إذ إن بنية الذرة - الهيكل الصلب الذي يكونها - يتتشكل من إلكترونات وبروتونات ونيوترونات، وكل هذه الجسيمات تنتمي إلى الفرميونات. وكذلك الكواركات، التي تكون البروتونات والنيوترونات. بيد أن هذه الجسيمات تتماسك معًا في بنائها، بالتبادل الدائم للبوزونات. تماماً مثل حفاظ الفوتونات على الإلكترونات في مدارها حول النواة، وثمة جسيمات مشابهة - يطلق عليها "جلونات"، تبقى على الجسيمات التي في نواة الذرة، تتماسكة معًا<sup>(٣)</sup>.

(١) دوران الجسيم حول نفسه. (المترجم)

(٢) ساتيندرا ناث بوز (١٨٩٤ - ١٩٧٤) عالم فيزيائى هندى متخصص فى الفيزياء الرياضية. (المترجم)

(٣) المزيد من الوصف الكامل للطريقة التي يتم بها تبادل الجسيمات، مما يؤدى إلى إنشاء قوة مشروحة فى كتابى "from Atoms to Quarks" (من الذرات إلى الكواركات). (المؤلف)

إن النقطة الأساسية في موضوع البوزنونات والفرميونات تتلخص فيما يلى: إننا لم نشاهد قط في مختبراتنا تفاعلاً تتحول فيه أحد الجسيمات إلى جسيم آخر، وبمعنى آخر، فإن الأمر يبدو وكأن ثمة "جدار" لا يخترق ينتصب بين النوعين من الجسيمات، إذ إنهمما دائمًا منقسمان حسب الوظيفة التي يؤدونها. وهذه الصفة الفارقة، لابد وأنها كانت موجودة منذ أن انفصلت الجاذبية بعيداً عن القوى الأخرى، عندما كان عمر الكون ٤٢ - ١٠ ثوانٍ، ونتج عن هذا - ولأسباب فنية متنوعة - أننا إذا أردنا صياغة نظرية التوحد النهائية، حيث تعامل الجاذبية بنفس طريقة القوى الأخرى، لابد لنا من تقديم تفاعلات فيها يمكن للفرميونات أن تتحول إلى بوزنونات، وتستطيع البوزنونات أن تتحول إلى فرميونات. وبالفعل فإن الصفة الفارقة بين الجسيمات كبنية والجسيمات ككتلة، لم تكن موجودة، عندما نشأ الكون، ولابد أنها ظهرت بعد التجمد الأول، عندما انفصلت الجاذبية عن كل القوى الأخرى (يجب أن نلاحظ أنه عندما أمكن للجسيمات أن تتحول كل واحدة إلى الأخرى، في أي نوع من التفاعلات، فكر الفيزيائيون فيها على أنها الجسيمات ذاتها، ولم يحدث لها أي تغيير، وبالطريقة نفسها، فانت الشخص عينه سواء ارتديت بدلة أنيقة أو ملابس خفيفة).

وفي ذلك العالم الذي لا توجد فيه الصفة الفارقة بين البوزنونات والفرميونات، يطلق عليه "فائق التمايز". وسوف يكون هذا العالم متاحى البساطة، إذ سوف يكون هناك نوع واحد فقط من الجسيمات، يعتبر مسؤولاً عن كل من البنية والقدرة، وأكثر الطرق الواحدة لتفهم أصول الكون، يبدو أنها تتضمن نظريات تسلم جدلاً أن كل شيء، بدأ في حالة من التمايز الفائق.

وهذه النظريات تنبأ أيضًا بأنه في البداية، عندما كان الكون في حالة تمايز فائق، كان له شركاء - يمكن القول إنها صور مرآتية - لكل الجسيمات المألوفة. وتعلم أنه في عالمنا المعاصر، ثمة بوزن يطلق عليه الفوتون، الذي يولد القوة الكهربائية. وتتنص نظريات التمايز الفائق، على أنه قبل أن تنفصل الجاذبية عن القوى الأخرى، كان هناك جسيم آخر، مطابق للفوتون في كل الوجوه، ما عدا أنه يلف بمعدل  $\frac{1}{2}$  بدلاً

من ١ وكان هذا الجسيم الآخر - الذى أطلق عليه "الفوتينو" - من الفرميونات، وفي الكون المبكر، كان يمكن لذلك الجسيم أن يتحول إلى فوتون والعكس.

وعندما انفصلت الجاذبية عن القوى الأخرى، اختفى التمايز بين البوزنونات والفرميونات، وفقدت البساطة المبكرة للكون. ومن وجة نظر الجسيمات، فإن فقدان التمايز أظهر نفسه في العملية التي أصبح فيها الفوتينو ثقيلاً للغاية. أكثر ثقلًا من البروتون. وتبنّت النظريات بأنه في الكون المعاصر، ثمة نوع من العالم المرأى مكون من شركاء، فائق التمايز، لكل الجسيمات التي نشاهدها عادة. وعلى سبيل المثال، نعرف أن هناك جسيماً يطلق عليه الإلكترون، ولكن تخبرنا النظريات أنه من الممكن أيضًا تخليق مشابه فائق التمايز للإلكترون له معدل لـ  $1/\sqrt{2}$ ، وأنه ثقيل للغاية. ويطلق على هذا الجسيم "السليلكترون". ويفترض أيضًا وجود سكواركات (الشبيهة بالكوركارات)، وكذلك "سنيوترينات" (الشبيهة بالنويوترينات)، وهكذا. وربما كان هناك أيضًا "سرجال" ونساء، على الرغم من النظريات - على حد علمي - لم تتطرق إلى هذا الأمر بعد..

وفي الوقت الحاضر، لا تتطلب النظريات، أن تكون هذه الجسيمات فائقة التمايز تتجمع في نفس الأماكن، مثل المادة العادية. كما لم تعطينا هذه النظريات أي فكرة راسخة، عن المقدار المفترض لكتلة جسيم مثل الفوتينو، على الرغم من أن التفكير السائد في الوقت الحالي، أن الفوتينو ربما يكون - على الأقل - أثقل من البروتون أربعين مرة. وفي الوقت نفسه، فإن النظريات تقضي بأنه ما دام التمايز قد تحطم، فإن التفاعل بين العالم فائق التمايز وعالمنا، يجب أن يكون ضعيفاً للغاية. ويجب أن تكون كل "السجسيمات" أكثر مرواغة بكثير من النويوترينو، ومن المستحيل اكتشافها وتتبعها مباشرة، باستخدام تقنيتنا الحالية.

وبكل هذه الخواص، فإن الجسيمات فائقة التمايز، تكون مرشحات مثاليات، كمكونات المادة المظلمة. إن تلك الجسيمات ثقيلة، إذن يمكنها ممارسة قوة تجاذبية.

وكذلك فإنها ضعيفة التفاعل، ومن ثم، فلن تتدخل في الأنشطة المحمدة في أشياء كالنجوم أو معجلات الطاقة العالية. ماذا يمكن للمرء أن يطلب أكثر من ذلك؟


### الأوتار الفائقة

إن الإدراك الحالى المسابير للعصر، عن فكرة التمايل الفائق، متضمن فيما يطلق عليه نظريات "الأوتار الفائقة"، وفي هذه النظريات تكون كل المكونات الأساسية لكل الجسيمات، عبارة عن أوتار ضئيلة للغاية من مادة شديدة الكثافة، مطمورة داخل سحابة ناعمة وخفية كالزغب، من المادة التي تكون الطبقات الخارجية للجسيمات المألوفة. إن الأوتار متناهية الصغر، لا يزيد طولها على ١٠-٣٣ سنتيمترا. ونوع الوتر الذي يفترض أنه يكون قلب المادة، يكون حجمه تقريباً - بالنسبة للبروتون - مثل العلاقة في الحجم بينك وبين مجرة صغيرة، وفي أولى نظريات الأوتار التي تمت صياغتها، كانت الفرميونات عبارة عن أنشوطة، مثل تلك الموضحة إلى اليسار في الشكل ١١، بينما تطابقت البوزنونات مع الأوتار المفتوحة، كما هو موضح إلى اليمين في نفس الشكل. وحتى الكواركات افترض أنها مكونة من أوتار، إذا تفحصتها عن قرب بما يكفى.



الشكل 11.1

ولو اعتقدنا بأن قلب المادة له نوع من البنية الوتيرية، إذن فهناك تشابه مفيد، تساعدنا على فهم كيف يجب أن تسلك المادة (خاصة المادة فانقة التمايل). عندما تقر وتر جيتار، يمكنك أن تجعله يتذبذب، كما هو موضح في الرسم الأسفل إلى اليمين، بالشكل (١١-٢) ويطلق على هذا "الشد الأساسي" في الموسيقى، وهي أكثر النغمات الموسيقية انخفاضاً، التي يمكن أن تصدر عن الوتر المهتز. ويمكنك أيضاً أن تجعل الوتر يتذبذب في أشكال أخرى، كما هو موضح في الثلاثة رسومات الأخرى وهذه الأشكال المتباينة تصدر توافق النغمات الموسيقية، والألحان والإيقاع، التي تعطى النغمات الموسيقية ثراها، وللة موسيقية معينة كيفية النغمة.



الشكل 11.2

لكي يتذبذب وتر الجيتار لابد له من طاقة، وتظهر هذه الطاقة نفسها، في طاقة اهتزاز الوتر عندما يتذبذب. وحيث إن الطاقة والكتلة متكافئتان (الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء  $E=mc^2$ )، وهذا يعني أن كلّاً من أشكال تذبذب وتر الجيتار الموضحة، يوجد بها ثمة اختلاف طفيف في الكتلة مصاحبة لها.

عندما "ينقر" الوتر الفائق، فإنه أيضاً يمكنه أن يتذبذب بنغمات متباينة. وبالنسبة لوتر الجيتار، فإن كلام من هذه التنظيمات الثابتة للنغمات، سوف تكون لها طاقة مختلفة وكتلة متباينة، عن الآخرين. وعندما نتفحص وترًا فائقًا متذبذبًا عندئذ، فإننا نرى شيئاً

ما له كثرة، وأن هذه الكتلة تختلف من وتر متذبذب، إلى آخر بيد أن هذا ما نراه بالضبط، عندما نتفحص الجسيمات المختلفة، إذ إنها أيضاً لها كثرة متباعدة. وهذا الأمر يفسر القواعد الأساسية لنظرية الأوتار الفائقة. فكل شكل من الأشكال المحتملة واللانهائية لاهتزاز الوتر الفائق، يطابق جسيماً مختلفاً، ومن ثم، فإننا تتوقع وجود عدد غير محدود، من الجسيمات المحتملة في العالم.

وتقودنا هذه الفكرة أيضاً إلى الاعتقاد أنه عندما ننقر على وتر (على سبيل المثال، بإضافة طاقة في تصادم طاقة عالية) سوف تتلاشى في النهاية النغمات التوافقية المرتفعة، تاركة فقط الشد الأساسي للتذبذب. وهذه نقطة مهمة، لأن ذلك يعني أننا عندما نبحث عن الجسيمات فائقة التماثل، فإننا سوف نجد - على الأرجح - تلك التي تتطابق مع الشد الأساسي للتذبذب، الذي يمكن تفسيره على أنه الأقل كتلة من بين الجسيمات فائقة التماثل. وحتى الآن، ربما تبدو هذه المجادلة مدعاة للارتياب ووهمية، ولكن في الواقع ليست هناك أي غرابة فيها. والآن دعني أزيد الأمر إيضاحاً. في جميع نظريات الأوتار الفائقة التي يفكر فيها بتمعن العلماء النظريون، لا تذبذب الأوتار في الثلاثة أبعاد المعتادة، ولا حتى في العالم الفيزيائي ذي الأبعاد الأربع. وبينما أن النظريات تريد إبلاغنا، أن الأوتار لابد أنها تذبذب إما في عشرة أو ستة وعشرين بعداً! (هل أنت على ثقة، بأنك لا تريد التقدم إلى الأمام رأساً إلى حيث الملخص في صفحة ١٧٦.)

لا تحاول حتى أن تتصور ثلاثة أبعاد، لا يمكن فعل ذلك. والعلماء النظريون مدفوعون لأخذ مثل هذه الأفكار بعين الاعتبار، لأنه فقط في الأبعاد الأعلى، يمكن للنظريات التي يصوغونها أن تتجنب ما يطلق عليه "الانحرافات". وعليك ألا تكرر بالتعريف الفني لهذا المصطلح: إذ إن عالم الرياضيات يستجيب لأحد الانحرافات في معادلاته، تماماً كما تستجيب أنت عندما تلتقي إخطاراً من البنك بذلك قمت بالسحب على المكشوف من حسابك الجاري. والانحرافات أشياء سيئة ومريبة، ويجب تحاشيها مهما كانت التكلفة، حتى لو وصل الأمر إلى تكديس الأبعاد بكمية كبيرة.

ويبدون إثارة القلق بشدة غير مبررة عن تعدد الأبعاد، أود أن أوضح أنه ليس ثمة سبب يدعونا إلىتوقع أن نتخلص من الانحرافات في أي بعد، وما وجده العلماء النظريون مشابهاً لما قد تجده إذا اكتشفت أنه باستطاعتك أن توازن كشف حسابك، لو استخدمت ورقة بها عشرة أسطر أو ستة وعشرين سطراً، ولكن ليس تحت أي ظروف أخرى، وربما سوف تفهم أخيراً لماذا احتاج حسابك الجارى لهذا، بيد أنك سوف تشعر دائماً بإحساس غامض في العملية كلها. وبطريقة مماثلة، فإن العلماء النظريين يفهمون الآن لماذا عشرة وستة وعشرين بعداً للأوتار تعد مختلفة، ولكنها لن يجعل النتيجة أقل إثارة للدهشة.

وبالطبع، يؤدى تعدد أبعاد الأوتار الكونية، إلى مشكلة أخرى ومع ذلك، فإننا نعيش بالفعل في عالم بأربعة أبعاد (ثلاثة مكانية "الطول والعرض والارتفاع" وواحد زمني). وللاتفاق حول هذا التباين، تفترض نظريات الأوتار الفائقية، أنه عندما انفصلت الجاذبية، اجتازت الأبعاد الإضافية عملية يطلق عليها "الدمج". وكما يوحى به الاسم، تتنبأ تلك النظريات بأن الأبعاد الإضافية "التفت على بعضها"، بحيث يبدو العالم بأربعة أبعاد فقط، إلا إذا تفحصته بمقاييس بالغ الدقة.

والتشابه القياسي الذي استخدم لتفسير الدمج، يتضمن خرطوم حديقة عاديأ. فعندما ترى خرطوماً من مسافة بعيدة، فإنه يبدو مثل الوتر أى شيئاً ذا بعد واحد. وما إن تقترب منه، حتى تدرك أن هناك بعداً إضافياً - ألا وهو عرض الخرطوم - ملتف حول بعضه، ويكون مرتيناً فقط عندما تتحققه عن قرب. وهذا هي حال الجسيم العادي، الذي يبدو بأربعة أبعاد، إلا إذا اختبرته عن قرب كاف، لتتأكد بأن الوتر في مركزه. وفي هذه الحالة سوف يظهر أنه ذو عشرة أبعاد.

ولكن ما الذي سوف نفعله بالأوتار الفائقية؟ فمن ناحية، توفر بحق نظرية لكل شيء، تتميز بالأناقة والمتعة، كما تقدم الأوتار الفائقية مخططاً، يشتمل على كل القوى

الى تظاهر على قدم المساواة، وهى تمثل تحقيقاً لحلم أينشتين الجوهرى. إنها فضلاً عن ذلك، تتميز بعض أشكالها بأن الجاذبية لا يمكن تجاهلها حتى بعد زمن (بلاتك)<sup>(١)</sup>، عندما توحدت الجاذبية مع كل القوى الأخرى، ومن ثم أمكن وصف القوى بطريقة موحدة، حتى في عالمنا المعاصر.

ومن ناحية أخرى، ليس هناك حالياً أى تنبؤ نظري، يمكن اختباره تجريبياً أو بملاحظته والوصول إلى نتائج. إن العلماء النظريين قاموا بتجارب عدّة، ومن ثم، فإنهم لم يعواوا يبحثون عن توجيهه وإرشاد الملاحظة، بل يجب أن يعتمدوا على حسهم الجمالي والفنى. وهذه الطريقة في التعامل مع العلم لم يتم تجربتها قط من قبل، وسيوف يمكن من المثير للاهتمام أن ترقب ما الذى سوف تسرّف عنه.

الكون الظل

وأحدى النتائج المثيرة لنظريات الأوتار الفائقة، أنها قد تسبب في ظهور نوع آخر من المادة المظلمة، في وقت ما في المستقبل. وأوضح (روكي كولب) (ديفيد سيكل) (مايكيل تيرنر) من جامعة شيكاغو ومختبر المعجل الوطني فيرمي، أن أحد أشكال نظرية الأوتار الفائقة، القادرة على جذب الانتباه تحديداً، من وجهة نظر الناحية الفنية والجمالية الرفيعة، تبدو فيها المعادلات الرياضية وكأنها توحى، بأنه في زمن (بلانك). انشطر الكون إلى جزأين منفصلين. أحدهما عالمنا الطبيعي، بكل ما فيه من أنواع متكاملة من الجسيمات وشركائها الفائقة التماثل وهناك أيضاً - بالإضافة إلى هذا - عالم ظل. والمادة في هذا العالم الظل، تتشابه مع عالمنا أنها أيضاً، لها جسيماتها "وجسيماتها". وفي حدود كل عالم، تتفاعل الجسيمات مع بعضها، خلال تكامل

(١) وحدة قياس زمن، وهو الوقت الذي يستغرقه القوتين ليتقل بسرعة الضوء، مسافة في الفراغ تعادل طول بلانك  $1.0 \cdot 10^{-35}$  مترًا تمت تسمية هذه الوحدة الزمنية على اسم العالم الألماني (ماكس بلانك) (١٩٤٧ - ١٨٥٨). (المترجم)

تم للقوى الأربعه<sup>(١)</sup>. ومع ذلك، فإن الجسيمات في أحد العالمين، يمكنها التفاعل مع الجسيمات في العالم الآخر، من خلال قوة الجاذبية<sup>(٢)</sup>. ويمكن أن يكون إلكتروناً وإلكترون ظل، بالقرب من بعضهما، ولكنهما لا يشعران بالقوة الكهربائية، على الرغم من أن كل منهما يحمل شحنة كهربائية خاصة به. والقوة الوحيدة بين الاثنين، هي قوة الجاذبية، الضعيفة نسبياً.

ويمدنا التأمل في الكون الظل، بطريقة بسيطة للتفكير في المادة المظلمة. لقد انشطر الكون إلى مادة عادية ومادة ظل في زمن بلانك، وتطور كل منها وفق قوانينه الذاتية. ومن المحتمل أن (هابل) الظل اكتشف أن كونه الظل كان يتمدد، ولنفترض أن بعض فلكي الظل، فكروا فيما وكأننا مرشحون كمكونات لادتهم المظلمة. وحتى ربما كان هناك قرین ظل لك في مكان ما، يقرأ رؤية ظليلة من هذا الكتاب.

### الأكسيونات .. حسان أسود آخر<sup>(٣)</sup>

وثمة جسيم كلّى ضعيف التفاعل WIMP مفصل آخر، يطلق عليه "الأكسيون". وهو مثل الفوتينو وشركائه، وقد اقترح الأكسيون، لاعتبارات خاصة بالتماثل. ومع هذا، بخلاف السجسيمات. أنها تأتي من نظريات التوحيد الكبري، التي تصف الكون عندما كان عمره ١٠-٣٥ ثوانٍ، وليس من نظريات التوحيد الكاملة، التي تعمل في زمن بلانك. ومعروف منذ زمن طويل للفيزيائيين، أن كل تفاعل بين الجسيمات الأولية يخضع لـتماثل نطلق عليه اختصاراً CPT، وهذا يعني أننا إذا نظرنا إلى فيلم لأحد التفاعلات، ثم ننظر إلى نفس التفاعل عندما (١) نفحصه في مرآة. (٢) تستبدل بكل الجسيمات جسيمات مضادة و(٣) تدبر الفيلم بطريقة عكسية، سوف تكون النتائج متطابقة. وفي

(١) القوة الشديدة والقوة الضعيفة والكهرومغنتيسية والجاذبية. (المترجم)

(٢) ويسبب هذه الخاصية يجب - على وجه التحديد - ألا تدخل المادة الظل، تحت الاسم الشامل WIMP ما دام WIMP يمكنها التفاعل مع المادة العادية خلال القوى غير الجاذبية، ومع ذلك تبقى المادة الظل "ظلمة"، بالمعنى الذي نقصده ونستخدمه في هذا الكتاب. (المترجم)

(٣) حسان يربع شوط السباق دون أن يتوقع فوزه. (المترجم)

هذا المخطط فإن  $P$  يعبر عن التماثل Parity (المرأة)، و  $C$  تمثل اقتران الشحنة Charge Conjugation و  $T$  لتعاكس الزمن Time Reversal (ادارة الفيلم بطريقة عكسية). وثمة اعتقاد معتاد، أن الكون كان متماثلاً تحت مبدأ CPT لأنـه - على الأقل - على مستوى الجسيمات الأولية، التي كانت متماثلة تحت  $C$  و  $P$  و  $T$  بطريقة مستقلة. واتضح أن هذه ليست هي الحالـة. ذلك أنـ الكون الذي تراه فيـ المرأة يـنحرـف قليـلاً، عنـ الكـونـ الذي نـشاهـدهـ بشـكـلـ مـباـشـرـ، كـماـ يـبـيـوـ الكـونـ عـنـدـمـاـ نـديـرـ الفـيلـمـ بـطـرـيـقـةـ عـكـسـيـةـ. وماـ يـحدـثـ هوـ أنـ الانـحرـافـاتـ بـيـنـ الـكـونـ الـحـقـيقـيـ وـالـمـعـكـوسـ، فـىـ كـلـ مـنـ هـذـهـ الـحـالـاتـ، تـلـغـىـ بـعـضـهاـ بـعـضـاًـ، عـنـدـمـاـ تـنـفـحـصـ الـثـلـاثـةـ انـعـكـاسـاتـ مجـتمـعـةـ.

وعلى الرغم من صحة هذا الأمر، فإنه حقيقـىـ أـيـضاًـ أنـ الـكـونـ مـتـمـاثـلـ تقـرـيـباًـ تحتـ  $CP$  تـعـملـ منـفـرـدةـ وـ  $T$  تـعـملـ منـفـرـدةـ. وـيعـنىـ ذـلـكـ أـنـ الـكـونـ تـقـرـيـباًـ مـتـمـاثـلـ، إـذـاـ نـظـرـنـاـ إـلـىـ مـرـأـةـ وـاسـتـبـدـلـنـاـ بـالـجـسـيـمـاتـ جـسـيـمـاتـ مـضـادـةـ أوـ نـظـرـنـاـ إـلـىـ بـشـكـلـ مـباـشـرـ. إـنـ كـلـمـةـ "تقـرـيـباًـ"ـ هـىـ الـتـىـ تـقـلـقـ الـفـيـزـيـائـينـ. لـمـاـ تـكـونـ الـأـشـيـاءـ قـرـبـيـةـ مـنـ الـكـمالـ، وـلـكـنـهاـ تـفـشـلـ فـىـ تـحـقـيقـ الـهـدـفـ؟ـ

وفي العام ١٩٧٧، وجد كل من (روبرتو بيبيشى) و(هيلين كوبين)، وكلـامـهـاـ فـيـ جـامـعـةـ سـتـانـفـورـدـ، طـرـيـقاـ طـبـيـعـياـ لـلـإـجـابـةـ عـنـ هـذـاـ التـسـاؤـلـ فـيـ إـطـارـ نـظـريـاتـ التـوحـيدـ الـكـبـرـىـ، وـهـوـ طـرـيـقـ اـتـضـحـ مؤـخـراـ أـنـهـ يـشـتـملـ عـلـىـ وـجـودـ جـسـيـمـ جـدـيدـ، لـمـ يـكـنـ قـدـ اـكـتـشـفـ بـعـدـ. وـكـانـ الـجـسـيـمـ الـذـىـ اـقـتـرـحـوهـ، أـطـلـقـ عـلـيـهـ اـسـمـ "اـلـاـكـسـيـونـ". وـيفـرـضـ أـنـ هـذـاـ اـلـاـكـسـيـونـ خـفـيفـ لـلـغاـيـةـ (أـقـلـ مـلـيـونـ مـرـةـ مـنـ كـتـلـةـ الـإـلـكـتروـنـ). وـأـنـهـ لـاـ يـتـفـاعـلـ إـلـاـ بـضـعـفـ بـالـغـ معـ الـمـادـةـ الـأـخـرـىـ. إـنـ الـكـتـلـةـ الـضـئـيـلـةـ وـالـتـفـاعـلـ الـضـعـيـفـ، هـمـ الـذـانـ يـفـسـرـانـ كـلـمـةـ "تقـرـيـباًـ"ـ الـتـىـ كـانـتـ تـزـعـجـ الـعـلـمـاءـ النـظـريـينـ.

وـأـظـهـرـتـ إـحـصـائـيـاتـ وـحـسـابـاتـ عـلـمـاءـ الـفـلـكـ، أـنـهـ فـيـ الـكـونـ المـتـمـددـ، يـتـوـقـعـ أـنـ تـشـكـلـ الـاـكـسـيـونـاتـ مـجـالـ إـشـعـاعـ خـلـفـيـ، شـىـءـ مـمـاثـلـ إـلـاـشـعـاعـ الـمـوجـاتـ الـدـقـيقـةـ الـخـلـفـيـةـ لـلـكـونـ الـذـىـ تـبـلـغـ درـجـةـ حرـارـتـهـ ٢٧٠ـ، ١٥ـ مـئـوـيـةـ

(انظر الفصل الثالث). إن الشنوذيات (عدم الانتظام والاضطراب في الحركة) في خلفية هذا الأكسيون، هي التي يمكن أن تؤدي دور المادة المظلمة.

## الخلاصة

لقد سجلت بأسفل هذه الصفحة مرشحات المادة المظلمة، مع وصف مختصر لصفاتها المميزة وبيان قصير يشرح لماذا اعتقد الباحثون في وجودها.

## جسيمات التمايل الفائق .. الفوتينوات، سكواركات، ... إلخ.

تبأتأ النظريات التي توحد كل قوى الطبيعة، بوجود هذه الجسيمات. إنها تشكل مصفوفة من نظائر الجسيمات المألوفة لنا، بيد أنها أثقل بكثير. وقد سميت قياساً لشركائها، فالسكوارك هو الشريك الفائق التمايل للكوارك، والفوتينو هو الشريك الفائق التمايل للفوتون وهلم جرا. ويمكن أن يكون أخف هذه الجسيمات، هي المادة المظلمة، وإذا كان الأمر كذلك، فإن كل جسيم ربما يزن - على الأقل - أربعين مرة قدر البروتون.

## المادة الظل

في بعض الرؤى، لما أطلق عليها نظريات الأوتار الفائقة، ثمة كون كامل من المادة الظل، يوجد موازياً لكوننا، ولقد افترق الكونان عندما انفصلت الجاذبية عن قوى الطبيعة الأخرى. وتتفاعل جسيمات الظل مع جسيماتنا العادية، من خلال قوة الجاذبية، التي تجعل جسيمات الظل مرشحات مثالية للمادة المظلمة.

## الأكسيونات

الأكسيون خفي للغاية (ولكن يفترض أنه جسيم شائع جداً). وهذا الجسيم - إذا كان موجوداً - سوف يحل مشكلة طويلة الأمد، في نظرية الجسيمات الأولية.

ويفترض أن له كتلة أقل مليون مرة، من كتلة الإلكترون، كما يعتقد بأنه يتخلل الكون بطريقة مماثلة، لخلفية الموجات الدقيقة. وسوف يتكون من حشد من الأكسيونات فوق مستوى الخلفية الكلية.

### هل توجد الجسيمات الكتيلية ضعيفة التفاعل في الشمس؟

عبر كل هذا الفصل، أكدت حقيقة أن كل المرشحات لمكونات المادة المظلمة، والتي ناقشناها، هي جسيمات افتراضية تماماً. وليس ثمة دليل بأن توجد واحدة منها - بالفعل - في الطبيعة. ومع هذا، سوف أكون مقصراً إذا لم أذكر مجادلة واحدة - مجرد وميض ضئيل من الأمل - التي تميل إلى دعم فكرة وجود الجسيمات الكتيلية ضعيفة التفاعل، بشكل أو آخر. وهذه المجادلة لها علاقة ببعض المشاكل التي برزت في خضم مفهومنا لأنشطة وبنية الشمس.

إننا نعتقد أن طاقة الشمس، تنجم عن تفاعلات نووية تحدث عميقاً في مركز الشمس. عندئذ - لو كانت تلك هي الحالة - فإن النظرية تخبرنا بأن هذه التفاعلات يجب أن تنشأ عنها نيوترونات، في الأساس يمكن اكتشافها وتتبعها فوق كوكب الأرض. ولو كنا نعرف درجة حرارة ومكونات مركز الشمس (كما نعتقد أننا نفعل) فإننا يمكننا التنبؤ بدقة بعدد النيوترونات التي يجب اكتشافها وتتبعها، لأنها في العشرين سنة الأخيرة كانت ثمة تجربة تجري في منجم الذهب في ولاية "جنوب داكوتا" (بالولايات المتحدة) لاكتشاف وتتبع تلك النيوترونات تحديداً، ولكن للأسف، فإن النتائج محيرة؛ إذ إن العدد الذي تم اكتشافه وتتبعه مجرد نحو ثلث مما توقعه العلماء. وهذا ما يعرف بمعضلة النيوترونو الشمسي. والصفة المميزة الثانية للشمس، التي تتعلق بوجود جسيمات WIMPs، يطلق عليها التذبذبات الشمسيّة. عندما راقب الفلكيون سطح الشمس بعينيه، وجدوها تهتز وترتج، وأن الشمس كاملة تنبض لمدة تبلغ عدة ساعات. وتشبه هذه التذبذبات موجات الزلزال، ومن ثم، يطلق الفلكيون على دراستهم "علم الزلزال الشمسي". وما دمنا اعتقדنا بأننا نعرف تكوين الشمس، يجب علينا إذن

أن يكون بمقدورنا التنبؤ بالمواصفات المميزة لوجات الزلزال الشمسي هذه. ومع ذلك فهناك تباينات طويلة الأمد بين النظرية واللاحظة في هذا المجال.

وحيثاً، لاحظ الفلكيون أنه إذا كانت المجرة بالفعل مليئة بالمادة المظلمة، في شكل جسيمات WIMPs، إذن، فإن الشمس لابد أنها امتصت – على امتداد عمرها – عدداً ليس بالقليل من هذه الجسيمات. ومن ثم، فإن جسيمات WIMPs سوف تكون جزءاً من مكونات الشمس، وهذا الجزء لم يؤخذ في الاعتبار حتى الوقت الحاضر. وعندما يتم تضمين جسيمات WIMPs في الإحصائيات والحسابات، فإنه سوف يتبع هذا شيئاً هما: أولاً، اتضح أن درجة حرارة مركز الشمس أقل مما كنا نعتقد، وبالتالي، فإن عدداً أقل من النيوترينوات قد انبعثت. وثانياً، أن الصفات المميزة لكتلة الشمس، قد تغيرت بطريقة معينة، تزيد من مدى دقة التنبؤات بالتنبذبات الشمية.

وهذه النتيجة مجرد بارقة أمل لما قد يحدث في المستقبل، فيما يتعلق بوجود الجسيمات الكثوية ضعيفة التفاعل، ولكن لا تضفي عليها أهمية بالغة. ويمكن تفسير كلام من معضلة النيوترينو والتنبذبات بشكل دقيق، بالتأثيرات التي ليس لها علاقة بالجسيمات الكثوية ضعيفة التفاعل. وعلى سبيل المثال، فإن نوع تبذبات النيوترينو التي نوقشت في الفصل العاشر، يمكنها حل معضلة النيوترينو الشمسي، حتى لو كان النيوتريeno كتلة بالغة الضخامة، كما يمكن للتغيرات العديدة في تفاصيل البنية الداخلية للشمس، أن تفسر التنبذبات. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الظواهر الشمية، التي تمثل الإشارة الوحيدة التي لدينا، أن واحداً من المرشحات الغريبة للمادة المظلمة، ربما يوجد بالفعل.

## الديناصورات والمادة المظلمة

كل هذا الحديث عن التمايز الفائق والنظريات الأساسية، يعطي للمجادلة عن طبيعة المادة المظلمة نطراً متفرداً، لا يمت بـأي صلة للطريقة التي تجري بها بالفعل المناقشات بين علماء الكون. وأكثر الأشياء التي أفضليها عن هذا المجال، هو أن كل شخص فيه، يبدو أن بمقدوره حفظ روح المرح والأمل عن عمله أو عملها.

ومنذ فترة مضت، وفى حديث مع مجموعة من علماء الكون، عن انقراض الديناصورات، شرحت لهم، أن إحدى النظريات تنص على أن الشمس، أثناء دورانها حول مجرة الطريق البالى، تتحرك - على فترات منتظمة - أعلى مستوى المجرة، وعندما تقوم بهذا، فإن الغبار الموجود فى هذا المستوى، يتوقف عن حماية كوكب الأرض، ومن ثم، فإنه يغرق فى الإشعاعات الكونية المهاكة، التى قد تتخلل الكون، كما يعتقد مؤلفو هذه النظرية. ومن آخر القاعة التى كنت ألقى فيها المحاضرة، تسائل أحد خريجى الجامعة وهو يتنفس واقفًا هل تعنى أن الديناصورات انقرضت بتاثير إشعاع الفوتينو؟.

انفجرنا جميعاً في الضحك، إذ إن التلاصق بين الحفريات المتحجرة<sup>(١)</sup> الحقيقية الضخمة والوحشة - والتي لا سبيل إلى الشك فيها - والتي توجد في المتاحف، كان ربطها بالفوتينو ذلك الجسيم الافتراضي والنظري، أمراً مضحكاً لشدة سخافته، وهذا الأسلوب الذي يتسم بالمرح، لأحد أهم الأسئلة الأساسية في علم الكون الحديث - يسعدني القول - تطابق الحالة الذهنية للعلماء الذين يعملون في هذا المجال. إذ إنها تساعد في أن تجعل هذا الموضوع الشديد التعقيد، ممتعاً للغاية.

---

(١) بقايا الحيوان والنبات المتحجرة في الأرض والتي ترجع إلى عصور موغلة في القدم. (المترجم)



## الفصل الثاني عشر

### الأوتار الكونية حل أم مخادعة؟

اصمتوا يا أولاد، وأغلقوا أنفواهكم، سوف أحكي لكم جميعاً قصة مخبطة  
اصمتوا يا أولاد، وأغلقوا أنفواهكم، سوف أحكي لكم عن الودة...!  
أغنية شعبية أيرلندية

ثمة شيء يجب أن يكون واضحاً منذ البداية. أن الأوتار الكونية، موضوع هذا الفصل، والأوتار الفائقة التي تحدث عنها في الفصل الحادى عشر، شيئاً مختلfan تماماً. والعلاقة الوحيدة التي تربط بينهما هي اسماهما فحسب.

وتعتبر الأوتار الفائقة أصغر من أصغر جسيم أولى، بيد أن الأوتار الكونية ربما تمتد من جانب إلى آخر خلال أجزاء كبيرة من الكون. وفي بعض صيغ النظريات، فإنها - في واقع الأمر - تجري عبر الكون برمته، مثل وتر عقد اللؤلؤ، وأحياناً يجتمع بي الخيال، فتحب أن أفكر في الأوتار الكونية، وكانتها إعادة التناسخ للشعبان الأسطوري الذي يلتهم ذيله<sup>(١)</sup>. وكان هذا رمز مصرى قديم، يتكون من أفعى تأكل ذيلها. وفي علم الكون الإسكندنافي القديم ثمة أفعى تحيط بالكون، خفية إلى الأبد، بيد أنها تبذل إلى ما لا نهاية تأثيرها على المواد الأرضية. وأنى فرد يود التعمق في دراسة

---

(١) يمكن هذا الرمز في شكل دائرى، ويرمز إلى الطبيعة الدورية للكون، خلق من الدمار والحياة بعد الموت، وكان هذا يوحى بالخلود في مصر القديمة. (المترجم)

بعض النقاط، سوف يكون قادراً على إدراك العلاقة بين الأساطير القديمة، والمفاهيم الجديدة في علم الكون.

## ما الأوتار؟

كما يلمح إليه الاسم، فالأوتار الكونية كبيانات طويلة للغاية، ذات بعد واحد، تمتد في الفضاء. وإذا كانت موجودة (و - كما سوف نرى - أن هذا أمر تكتنفه الريبة الشديدة) فإنها ستكون ضخمة بشكل مروع. وفوق سطح كوكب الأرض، فإن قطعة من الوتر الكوني طولية بما يكفي لتمتد من ذرة إلى أخرى، سوف تزن مليون طن!

أما القطعة من الوتر الكوني التي تكون في حجم حبة رمل، فإنها سوف تحتاج إلى أسطول من الشاحنات القلابة، تلتف ثمانى مرات حول خط الاستواء، لكي تحمل وزنها، ويسbib كلتها المروعة، فإن الوتر يمارس شدًا تجاذبياً قوياً على المادة من حوله. وبالتالي، فإنها تكون مثالية لتؤدي دور المادة المظلمة، في تشكيل البنية ذات المستوى الهائل في الكون.

وتخبرنا الكتلة الجبار، أنها لابد أن تكون قد خلقت في وقت مبكر للغاية، من عمر الكون، عندما كانت الحرارة مروعة وكان هناك فيض غامر من الطاقة متوفّر لتكوين أجرام فضائية غريبة. ويعينا، فليس ثمة عملية في كوننا المعاصر - سواء بفعل الإنسان أو الطبيعة - يمكن أن تنتج الطاقات اللازمة لتكوين وتر الكون. وإذا وجدت هذه الأوتار الكونية، فإنها لابد وأن تكون بقايا من وقت أكثر قدماً في الزمن.

وليست الأوتار أكثر ضخامة من أي شيء يمكن أن نخلقه فحسب، ولكنها إذا وجدت، فإنها ستكون من مادة ذات شكل جديد تماماً. والصورة المألوفة للجسيم مثل البروتون، عبارة عن كتلة غير محددة المعالم. إننا ندرك - بطريقة عقلانية - أن البروتون يمكن أن يعتبر أيضاً حزمة من الطاقة النقية ( $\text{الطاقة} = \text{الكتلة} \times \text{مربع سرعة الضوء}$ ) بيد أنه أمر بالغ الصعوبة، أن تخيل البروتون بهذا الشكل. وفي معظم

المواقف، لا يسبب ذلك التكافؤ بين الطاقة والكتلة، أية صعوبات. ومع هذا، فإنه بالنسبة للوتر الكوني، علينا أن نواجهه على مستوى جوهري، وذلك أمر ليس سهلاً على الإطلاق.

## تكوين الأوتار الكونية

لكى نتفهم طبيعة الأوتار الكونية، علينا أن نعود إلى زمن موغل في القدم، عندما كان عمر الكون  $10^{-30}$  ثوانٍ، بعد الانفجار الكبير، عندما تجمدت القوة الشديدة، وتضخم الكون، وقتئذ يمكن أن نعتبر الأوتار كمنج ثانوى، لعملية التجميد ذاتها. وعندما يتجمد الماء، فإنه يتحول من حالة التماثل العالية إلى تماثل أقل. وما أعنيه هو ما يلى: لنفترض أنك في وسط بلورة ثلوجية، ويمكنك أن تدير هذه البلورة ستين درجة وأن البيئات المحيطة بك متطابقة من حيث المظاهر، مع ما بدأت به. وهذا ما نعنيه، عندما نقول بأن الكسفة الثلوجية متماثلة. بيد أن ذلك نوع محدود من التماثل، فإذا أدرت البلورة عشر درجات أو أربعة وثلاثين درجة، سوف تلاحظ على الفور تغير البيئة المحيطة بك. ومن ناحية أخرى، إذا كنت طافياً في الماء، فإن هذا التحديد لن يكون موجوداً. بغض النظر عن الطريقة التي تستدير بها، سوف ترى نفس البيئات تماماً، دون أي تغيير. وبالتالي، فإنه بالنسبة للفيزيائى، تكون نقطة الماء، التي تبدو رقيقة ومتواقة، لها تماثل أعلى يفوق كسفة الثلج أو بلورة الجليد.


إننى أمعن التفكير فى تلك النقطة تحديداً، لأن أسلوب الفيزيائى فى استخدام اصطلاح "التماثل" ليس ذلك المستخدم فى لغتنا الدارجة اليومية.

إن تجميد الماء يمكن التفكير فيه كانتقال من تماثل أعلى إلى تماثل أقل، وبالمثل، فإن تجميد نظرية التوحيد العظمى، يمكن أن نفكر فيها كانتقال من كون له تماثل أعلى (أى كون فيه قوتان فقط في الطبيعة) إلى كون له تماثل أقل (أى كون فيه ثلاثة قوى). وكما رأينا في الفصل الحادى عشر، فإن النظريات الحديثة للتماثل الفائق تعتمد

بوضوح على هذا النمط من التفكير، إذن يمكننا التعرف على شيء ما عن تجميد نظرية التوحيد العظمى، بمراقبة تجميد الماء، على سطح بحيرة مفتوحة.

إذ لا يتحول سطح البحيرة فجأة إلى لوح من الثلج، عندما تنخفض درجة الحرارة عن الصفر المئوى، وبدلًا من ذلك ينمو الثلج إلى الخارج، من عدة بقع متعددة على الشاطئ، حيث يبرد الماء في الأماكن الضحلة، بشكل أسرع، وداخل كل رقعة من الثلج، تصطف البلورات في نفس الاتجاه، بيد أن البلورات في إحدى الرقع، لا يلزم أن تكون في نفس اتجاه البلورات في رقعة أخرى. ولو حدث هذا، فسوف يكون الأمر لافتًا للنظر، لأن هذا يعني أن رقعة الثلج التي تنمو في أحد جوانب البحيرة، “تعرف” ما الذي تفعله رقعة على الجانب الآخر. وإلا، فكيف أنها تجعل بلوراتها تصطف بالطريقة الصحيحة؟

ومع استمرار انخفاض درجة الحرارة، تظل رقع الثلج في النمو إلى أن تلتزم معاً وتغطي البحيرة باكملها. وأنه لمن المتع أن نفكر فيما يحدث، عندما تتقابل رقعة ثلج مع أخرى. وإذا حدثنا اتجاهًا واحدًا من محاور التماثل للبلورات، في كل رقعة بعلامة سهم، كما هو واضح إلى اليسار في شكل (١٢-١) (صفحة ١٦٢)، وعندئذ، ففي الموقع الذي تلتقي فيه رقعتان، يكون هناك تغير غير مترابط، من اتجاه في التماثل الآخر. ويمثل غالباً رؤية تلك المواقف على سطح بحيرة ما، بقع يكون فيها الثلج أكثر سمكاً - إلى حد ما - وأكثر تكتلاً، عن أي مكان آخر. ويطلق على خط الالتحام “شائبة” في الثلج المتبلور.



الشكل 12.1

والامر الجدير باللحظة عن هذه الشوائب، أنها تتضمن طاقة، ولكن نتعرف على السبب في هذا، تخيل ما الذي قد يحدث لو أنك استطعت إحضار بلورة ثلج منفردة، إلى حافة رقعة ثلج واحدة، كما هو ممثل خط موجي في مركز الشكل (١٢-١) وسوف تقوم القوة التي تبذلها الذرات في رقعة الثلج، بتحريك البلورة، بحيث إنها تعيد ترتيب وضعها وتتنظم على طول نفس محور رقعة الثلج، وهذه هي الكيفية التي ينمو بها الثلج عادة، بالإضافة مادة جديدة تصطف مع رقعة الثلج الموجودة بالفعل.


والآن انظر إلى الموقف بطريقة أخرى: فالترتيب البنوي الذي يتضمن البلورة الجديدة المصطفة مع رقعة الثلج، يمثل أقل مستوى من الطاقة، يمكن للمنظومة أن تصل إليه. وإذا تركت هذه المنظومة حرفة دون أى تأثير، فإنها سوف تهبط إلى ذلك المستوى طبيعياً، مثل كرة تركت على جانب تل، فإنها ستدرج إلى أسفل حتى القاع، وللحفاظ بالبلورة في اصطدام مختلف، كما لو كانت موجودة في رقعة ثلج، على الجانب الآخر من الشائبة، ويجب وضع الطاقة في تلك المنظومة.

وبالتالي، عندما تتشكل الشائبة، ويكون هناك عدد كبير من البلورات في غير اصطدامها الطبيعي (كما هو موضح إلى اليمين في الشكل ١٢-١)، لابد أن هناك طاقة "محبوسة" في المنظومة. وإذا أمكن تغيير الاصطدام، في هذه الحالة، يمكن استخلاص الطاقة من المنظومة.

ربما تكون قد تابعت المجادلة حتى هذه النقطة، والآن يأتي الجزء الذي تتوقف فيه فجأة، وترفض المتابعة. ذلك أن بالشائبة طاقة مخزونة، ومن ثم فإن هذه الرقعة التنجية تزن أكثر من رقعة مجاورة لها. وهذا استنتاج منطقي لمعادلة: الطاقة = الكثافة × مربع سرعة الضوء. وهي نتيجة لا نفك فيها عادة، ولكنها - في الواقع الأمر - حقيقة على الرغم من ذلك. فالجسم الذي أضيفت إليه طاقة، تكون كتلته أكبر، ومن ثم يزن أكثر - مما كان عليه من قبل. إذ إن مصدية الفنار المجهزة تزن أكثر من مصدية فنار غير مجهزة. إننا لا نفك في مثل هذه الأشياء في حياتنا اليومية، إذ ليس ثمة ميزان يمكنه أن يقيس هذا التغير بالغ الصالحة، الذي يكون حتى أقل بكثير من كثافة أصغر جسيم

أولى، وأنه فقط عندما نتعامل مع الكتل الضخمة للغاية، والطاقة الهائلة، تحت الظروف المروعة التي كانت متوفرة في الكون المبكر، أنت تتذكر استدلالات تكافؤ الكتلة والطاقة.

وإذا أمعنا النظر في سطح لوح ثلجي مكون حديثاً، لرأينا شيئاً يشبه ما هو موضح في الشكل (١٢-٢) مع وجود خلية منتظمة إلى حد ما، تتوافق مع رقعة الثلج التي تنمو مستقلة عن بعضها، وسوف تكون هناك سلسلة من تشكيّلات تشبه العروق، ذات كتل أكبر قليلاً، أنتجتها الشوائب التي تكونت على طول التحامات الرقعة الثلجية.



الشكل 12.2

ويفترض أن نفس هذا الشيء قد حدث، عندما تجمد الكون في الوقت  $10^{-25}$  ثانية. ولم يتغير الكون إلى حالته الجديدة فجأة، وفي التو واللحظة. ومثل الثلج فوق سطح البحيرة، نمت الحالة الجديدة، من نقاط تكون نوى متباينة. وتشكلت الشوائب كالتحامات لرقعة الثلج، وبسبب تلك الطاقات المروعة التي توفرت في ذلك الوقت، اكتسبت كتل هائلة. والأوتار الكونية هي أحد أنواع الشوائب، التي يمكن أن تتشكل أثناء تجمد الكون.

والكثير - وليس الكل - من نظريات التوحيد العظمى والتماثل الفائق، تنبأت بتشكيل الأوتار الكونية في التجميد الذي حدث في الوقت  $10^{-35}$  ثوانٍ.

وعلى الرغم من أن نظريات متباينة لم تتبناً بأوتار كونية متطابقة تماماً، فقد تنبأت بالتأكيد، بأوتار لها نفس الخواص العامة.

وأحد الأمور الجديرة باللحظة - كما سبق أن ذكرنا - أن الأوتار ذات كتل بالغة الصخامة، كما أنها أيضاً رفيعة للغاية، فعلى سبيل المثال، فإن المسافة عبر الوتر، أقل بكثير من المسافة عبر البروتون<sup>(١)</sup>. ولا تحمل الأوتار أية شحنة كهربائية، ومن ثم، فإنها لا تتفاعل مع الإشعاع، كما تفعل الجسيمات العادي، وتكون الأوتار بأشكال متعددة - خيوط طويلة متموجة، وأنشوطات مهتزة، وحلزونيات ثلاثية الأبعاد، وهلم جرا. وبكل وضوح، فإن الأوتار مرشحات مثالية لتكون مادة مظلمة، إذ إنها تبذل شدًّا تجاذبياً، ولم يمكن تدميرها بواسطة ضغط الإشعاع في الكون المبكر.

## الأوتار وال مجرات

ما أن تتشكل الأوتار الثابتة، حتى تستقر لمدة طويلة، كما سوف نرى. ومنذ الوقت الذي تشكلت فيه عند  $10^{-35}$  ثوانٍ، كونت تكتلاً هائلاً يدعى الخلفية التي تطورت فيه الجسيمات والنوى والذرات، وحققت أهدافها في الكون.


وما دامت الأوتار لم تتأثر بضغط الإشعاع مثل البلازما، إذن يمكنها أن تعمل كنواة متكافئة - بنوراً - لتشكيل المجرات، والعقائد المجرية، والعقائد المجرية الفائقة، شريطة أنه يمكنها البقاء فترة طويلة كافية لتحقيق ذلك. كان المتحدث الرئيسي لفكرة الأوتار الكونية، هو (نبيل توروك) الفيزيائي النظري الشاب، الذي يعمل أصلًا في كلية إمبريال في لندن. وقد قضى توروك زمناً طويلاً في الولايات المتحدة الأمريكية، ويسعدني القول، إن جولاتة شملت قسمى القديم في جامعة فيرجينيا. لقد جعل عمل حياته (بقدر ما يمكن أن ينطبق هذا القول على رجل لم يصل إلى الثلاثين بعد) إمامطة اللثام عن سلوك الأوتار الكونية، وتفسير معادلات النظرية المعقدة للمجال الكمي، التي تصفها. وأسلوب توروك مثير للإعجاب لشموليته ودقته التي بلغت أوجهها: ويدلاً من اتباع المسار العادي في البحث، بأن تعيط اللثام عن سلوك الأوتار الكونية ثم تترك

---

(١) إن السمك المقرر للوتر هو  $10^{-30}$  سنتيمتراً، مقارنة بـ  $10^{-12}$  للبروتون. (المترجم)

للآخرين إيجاد تأثير الأوتار، على مشكلة المجرات وكيفية تشكيلها، قرر (تورووك) ومن معه من العلماء الشباب أن يتعلموا علم الكون. وليس من المعتمد أن الباحثين، وهم في قمة حماسهم لاكتشاف فرع جديد من المعرفة، أن يتوقفوا عن أبحاثهم ليتعلموا أنفسهم بهذه الطريقة. والأكثر غرابة من هذا،حقيقة أن أكثر النقاد قسوة على الأوتار الكونية - ويدعى (ب.ج.أ. بيبلس) من جامعة بريستون - كان هو المعلم الخاص لهم. والرأي عندي، أن هذا التعاون الوثيق بينهم، هو تعبير عن أرقى النماذج المثالبة للمجتمعات العلمية.

ويبدو أن الصورة التي تتبع من عمل (تورووك)، تحمل في طياتها الحل لكثير من المشاكل التي وضعت في هذا الكتاب الذي بين أيديكم. كما أنه من السهل تكوين صورة ذهنية لها. ووفق محاكاة<sup>(١)</sup> الحاسوب - خلال عملية تجميد نظريات التوحيد العظمى - كونت الشوائب سلسلة طويلة ومتصلة، مثل تلك الموضحة في أ بالشكل (١٢-٣) عندئذ كانت الأجزاء المختلفة من الأوتار تندفع خفاقة حولها عبر الفضاء، وهي تتحرك تقريباً بسرعة الضوء. وعندما تتقاطع الأوتار الأولية - كما هو موضح في نفس الشكل - فإن أبحاث تورووك تبين أن الأنشطة الظاهرة تنفصل وتحطم.



الشكل 12.3

---

(١) وضع برنامج على الحاسوب يجعله يحاكي مسلك منظومة ما لدراستها. (المترجم)

حيثند، وبعد فترة قصيرة، امتلاً الكون بائناً ع متباعدة من الأوتار الكونية مختلفة الحجوم والأشكال. فالبعض منها كان مثل الخيوط الأفعوانية والطليفة والخفاقة. ويمكن لمثل هذه الأوتار أن تجذب المادة المحيطة إلى مستوى معين، بينما هي تخفق رائحة غادية.. والشكل المألوف للوتر كان مثل أنشوطه مغلقة، مشابه لذاك النوع الموضح في بـ. وتلك الأنشوطات هي التي كانت تجول في ذهني، عندما ذكرت "الشعبان الذي يلتهم ذيله". وحول هذه الأنشوطات، أخذت المادة تتجذب إليها، وتتجمع في شكل عنقود كروي أو على شكل سيجار. والأمر المثير للاهتمام عن هذه الأشكال - على الرغم من ذلك - ليس نظامها الهندسي في المقام الأول، بل أيضاً مراحل تطورها. فعلى سبيل المثال، لو حدث، أنه خلال مرحلة تبذبات الأوتار الكونية في الفضاء، لابد أن أنشوطه، قد اتخذت شكل "ثمانية" باللغة الإنجليزية 8، وعندما يتقطع خط من الوتر مع آخر، فإن هذه "الثمانية"، سوف تتشطر إلى أنشوطتين منفصلتين، كل واحدة منها، جزء من "الثمانية" الأصلية، كما هو موضح في ج بالشكل (١٢-٣) وأنطلق (توريوك) على هذه العملية "انسلاخ الأنشوطات". وهكذا، فما أن تتشكل الأوتار الكونية، فإنها لن تبقى كبيانات ساكنة في الفضاء. بل سوف يتتابها التغير بينما تتحرك هنا وهناك، مع الأنشوطات الضخمة التي ستتصبح أصغر حجماً مع مرور الزمن. وعلى الرغم من أن هذا الأمر يجعل من نظرية الأوتار أكثر تعقيداً، فإنها تعطينا أيضاً فرصة لاختبار مدى صحتها مع الأرصاد واللاحظات الفعلية. وبعد اكتفاء أثر تطور الأوتار عبر مرور الزمن، يمكننا أن نسأل أنفسنا عن كيفية انتظام المادة التي انجذبت إليها. ولو أخبرتنا النظرية بأن الأوتار جميعها تتشكل كأجزاء من أجرام فضائية في حجم المجرات (أو أصغر)، قبل فك اقتران الإشعاع، إذن، فإن نظرية الأوتار تتطلب تكون تبعثر فيه المجرات - إلى حد ما - بطريقة عشوائية عبر كل الفراغ. ومن جهة أخرى، إذا حدث وظللت الأوتار في حجم العناقيد الفائقة المجرية، فإننا تتوقع كونها تكون فيه كل المجرات، تتنظم في سلسلة، على طول خطوط في الفضاء، موسومة بالأوتار. وبالطبع، فإن الكون


الفعلي يقع في مكان ما بين هذين الرأيين المتطرفين، على الرغم من أنه يكون أشد قرباً، من الأخير أكثر من الأسبق.

واحد من أعظم إنجازات أبحاث تورووك وزملائه، تحقق أثناء حسابهم لدى قوة الترابط المتوقعة للمجرات، لو أن الأوتار موجودة بالفعل. إن قوة الترابط - كما تذكر - هي احتمالية وجود مجرة عند موقع معين في الفضاء، فلابد من وجود مجرة أخرى عبر مسافة معينة من المجرة الأولى. وفي كون عشوائي بالكامل، فإليك تتوقع أن تجد مجرات تفصل بينها مسافات متباعدة، ولن يكون أى فصل مشابه لغيره. ومن جهة أخرى، فإن أي تنظيم دقيق للكون، حيث توجد بين المجرات كلها، نفس الفواصل الزمنية تماماً، حيث تكون قوة الترابط تساوى صفرًا في كل مكان، إلا عند ذلك الفاصل المختار.

وباستخدام ميكانيكا الأوتار الكونية<sup>(١)</sup>، يمكننا أن نتوصل إلى كيفية تكتل المادة - في معظم الأحيان - حول أنشوطات ذات أحجام متباعدة وكذلك المستويات، ومن هذه النقطة يمكننا أن نتتبأ بعدد المرات التي تتوقع فيها إمكانية المجرات أن تقع في مجموعات ب مختلف الأحجام، وهذا يعني أنه عندما تم حساب الأحجام المتوقعة للأوتار الكونية، فإن الفواصل المحتملة بين المجرات، يمكن حسابها أيضاً. ويوضح الشكل (٤-١٢)، ما أعتقد أنه أقوى برهان متاح عن حقيقة الأوتار الكونية.

---

(١) علم خاص بدراسة حركة الأجرام الفضائية، في مجالات الجاذبية المتبادلة بينها. (المترجم)



الشكل 12.4

على المحور الرأسي نخطط بيانيًّا عن طريق الإحداثيات قوة الترابط، أما في الخط الأفقي، فإننا نخطط لمسافات الانفصال بين المجرات، ويمثل الخط الثابت، التنبؤ بالاحتمالية التي يمكن استنباطها من نظرية الأوتار، بينما تمثل النقاط تلك البيانات التي تم الحصول عليها من الأرصاد واللاحظات. (توضح الخطوط الرئيسية المرفقة بال نقاط، اللا محققيات<sup>(١)</sup> التي يشعر الفلكيون بها كامنة في قياساتهم)، والتوافق ما بين التنبؤ والأرصاد واللاحظات، لافت للنظر.

---

(١) قاعدة وضعها العالم الفيزيائي (فيرنر هيزنبرج) مؤداها أنه لا يمكن تعين كل من مكان جسيم ما، وكيفية حركته بالدقة نفسها. فإذا زادت الدقة في تعين المكان زاد عدم اليقين في تعين السرعة. (المترجم)

ولو قبلنا هذا الدليل، فإن صورتنا الذهنية عن الكون المبكر، لاتزال أخاذة أكثر. وبعد فترة وجيزة، من تجميد نظرية التوحيد العظمى، كان الكون مثل هوة مروعة، بطن في كل مكان منه، كل من الأوتار الكونية الحرة وتلك التي في الأنشوطات، حيث تتصادم بعضها وتطرح الأنشوطات، وتشارك في التمدد الكوني. ومع مرور الزمن، مرت المادة العادية ب مجالات التجميد المتباينة إجمالاً في الفصل الثالث، ويقيت الأوتار في الخلفية، حيث تطورت وفقاً لقوانينها الذاتية. وطوال تلك الفترة، قامت أيضاً ببذل شد تجاذبى، على المادة الأخرى الموجودة، مما جعلها تجتمع في شكل كتل، أصبحت مجرات في نهاية الأمر. وهذه التجمعات من المادة حول الأوتار تتكون من كل من المادة المظلمة والمادة العادية، إذ إن كليهما متاثران بالقوة التجاذبية. ومن خلال وجهة النظر هذه، تتخذ المجرات شكلاًها مع مكوناتها من المادة المضيئة والمظلمة، الموجودة بالفعل داخلها. والمجادلات المعقدة عن التحيز، والتي تحتاج إليها نظريات المادة المظلمة الباردة، ليست لها ضرورة هنا.

وفضلاً عن ذلك، فليس ثمة صعوبة في شرح البنى الكونية مثل العنقود المجرى الفائق المروع (الفرس الأعظم - الجبار) ومن الطبيعي أن يجذب الوتر الكوني الطويل المادة إليه، وهذه المادة سوف تكون المجرات طبيعياً، وستبدو هذه المجرات مثل خرزات في عقد. وسوف تكون الأشكال الأخرى من الأوتار، أنواعاً أخرى من العناقيد المجرية. ولعل الرفض الثابت والحاzman، أن الكون يظهر تجانساً - عندما ننظر إلى أضخم المستويات فيه - يعكس، ببساطة، الحقيقة بأن الكون ليس متجانساً. وهذه الخاصية هي إرث للحقيقة الأولى، عند تجميد نظريات التوحيد العظمى، مما أدى إلى تشكيل الأوتار، بنفس الطريقة التي كون فيها الثلج بنى على سطح البحيرة المتجمدة.

## أين توجد الأوتار الكونية؟

تعطينا الأوتار الكونية رأياً معيناً جديراً بالاهتمام عن الكون، فعلى سبيل المثال يبدو أنه في مركز كل مجرة يربض وتراً كونياً ملتفاً على نفسه، مثل "الشعبان الذي

يلتهم ذيله الأسطوري. ونتساءل: هل كان مبتدعوا الخرافات القدماء - بالفعل - قد اقتربوا إلى هذا الحد من الحقيقة؟ أيمكن للمرء أن يسير على حبل مشدود كالبهلوان (مبدينًا على أية حال) على طول امتداد العنقود المجرى الفائق (الفرس الأعظم - حامل رأس الغول) الذي يبلغ بليون سنة ضوئية؟ وبمعنى آخر، هل ما زالت الأوتار الكونية تحيط بنا من كل جانب؟

ولسوء الحظ، تخبرنا النظريات المعاصرة أن هذا الأمر - إلى حد ما - يمثل رأيًّا شاعريةً عن الكون، وأنه ليس من المرجح أن يكون حقيقيًّا. ويرجع السبب إلى أمر بسيط: أن الأوتار الكونية لا تعيش إلى الأبد، بل إنها تفنى ببطء. وتعيش الأوتار الأضخم أطول، أما أصغرها فإنها سرعان ما تفنى. وفقط تظل الأوتار البالغة الصخامة باقية إلى الوقت الحاضر.

والعملية التي تختفي بها الأوتار الكونية، يمكن فهمها بمساعدة تشابه مألف. إذا جذبت وترًا في جيتار، فإنه يهتز وتتصاعد موجات منه إلى الهواء، وترتحل هذه الموجات من الوتر إلى أذنك، حيث يمكن إدراكها كصوت، إن الموجات تتكون من جزئيات هواء متحركة، وهذه الحركة للجزئيات تستمد طاقتها من الوتر. ومع استمرار الاهتزازات، فإن الإمداد بالطاقة الأولية، يأخذ في البطء، ثم يتضاعف بتصاعد الموجات الصوتية. وفي نهاية الأمر، تستنفذ الطاقة، وتتوقف التذبذبات. وهذا هو نفس ما حدث للأوتار الكونية. ففي مرحلة الهوة المروعة للكون - التي كانت تتميز بالفوضى وعدم الانتظام - كانت كل الأوتار في حركة عنيفة، وفي حقيقة الأمر كأنما "جذبت" كأوتار الجيتار المشدودة. وتخبرنا النظرية النسبية العامة لأينشتين، بأنه إذا تم تعجيل<sup>(١)</sup> شيء في مثل صخامة الوتر الكوني، سوف تبعثر عنه موجات. كما أنه لن يبعث بضوءً أيضًا، أو أي نوع من الإشعاع الكهرومغناطيسي، ذلك أن الوتر الكوني لا يحمل أي شحنة كهربائية. وما يصدر عنه هو شيء يطلق عليه "الموجات التجاذبية". وكما أن

(١) التعجيل: ازدياد سرعة الجسيمات المشحونة. (المترجم)

الموجات الصوتية تتحرك في نقطة تجعل الهواء يتحرك بدوره، كذلك، فإن الموجات الكهرومغناطيسية تجعل شحنة كهربائية تتحرك، وأيضاً فالموجات التجاذبية المتحركة في اتجاه ما، تدفع المادة إلى التحرك، وعما إذا كانت الموجات التجاذبية قد تم اكتشافها وتتبعها بالفعل في المختبر، يظل موضوعاً للمجادلة بين الفيزيائيين التجاريين، ولكن لأهدافنا في هذا الكتاب، فإننا في حاجة فقط للاحظة أن الموجات التجاذبية، تم الأوتار الكونية بوسيلة لكي تشع، بتحويل طاقتها إلى موجات.

ولكن ثمة اختلاف بين الجيتار والوتر الكوني. ذلك أنه في الجيتار، تكون الطاقة المتاحة للتحويل إلى صوت، هي تلك الطاقة التي تتباعد من التذبذب فقط. وعندما تستنفد، فإن الوتر يتوقف عن التذبذب، ويبقى خاملاً. وليس ثمة تقنية للتطبيق الآلي (ما عدا وضع الوتر الكوني في مركز مفاعل نووي!)، يمكن بواسطتها تحويل طاقة وكلة الوتر إلى صوت أيضاً.

ومن جهة أخرى، فإن الوتر الكوني مفعم بالطاقة كما هو معروف. وما إن يبدأ في إطلاق الموجات التجاذبية، فإن هذه العملية تستمر، على أن يفني نفسه ويختفي عن الوجود، بسبب ما أطلقه من إشعاعات. وعندما تستنفد طاقته، فلن يتبقى منه شيء. ومن ثم، فمن الممكن استخدام معدلات فقدان الطاقة - التي تنبأت بها النظرية النسبية العامة - لحساب المدة التي تبقى فيها الطاقة "مخزونة" في أي وتر كوني.

وفي الحقيقة، لقد كانت هناك فترة عصيبة في ربيع وصيف العام ١٩٨٦، عندما تبين أن الأوتار الكونية، حياتها قصيرة للغاية، لكي تؤدي دورها في تشكيل المجرات، وأنها سوف تطرح الأنشطة وتظل تشع نفسها حتى تفني وتحتفى من الوجود، قبل فك اقتران المادة والإشعاع العادي. وفيما يبدو أن الحسابات المعاصرة، تظهر أن الأنشطة بمقدورها أن تشكل "بنور" المجرات، وأنها سوف تستمر لفترة كافية لتقوم بهذه المهمة، يجد أنها لن تبقى منذ الزمن المولغ في القدم، إلى الوقت الحاضر. وبمعنى آخر، فليس ثمة "ثعبان ملتهم لذيله" في مركز مجرة الطريق اللبناني، على الرغم من أن الأوتار الكونية التي تساهم في تشكيل العناقيد المجرية والعناقيد المجرية الفائقة، مازالت رابضة هناك.

وطبقاً للرواية المعاصرة النظرية، فإن مجرة الطريق اللبناني - في الأصل - قد تكاثفت حول وتر كوني، بكتلة تبلغ نحو جزء من مائة من كتلة مجرة الحالية، وطولها كان حوالي مائة سنة ضوئية. وبمعنى آخر، فإن "البذرة" المجرية بلغ ثقلها مثل كتلة مائة مليون نجم - كشمسنا - تقريباً، وبطول يمكن مقارنته بثلاثين من الانفصالات بين النجوم العادلة، في المجرة الحالية. وبعد أن جمعت مجرة الطريق اللبناني، كلاً من المادة المضيئة والمادة المظلمة، قامت بإشعاع نفسها وتلاشت عن الوجود، وربما تكون قد اختفت في عصبة من "الدخان"، مكونة أنواع من الجسيمات الغريبة، التي تمت مناقشتها في الفصل الحادى عشر. وتراثها الوحيد: مجرة الطريق اللبناني ذاتها.

## البحث عن الأوتار الكونية

ربما تجد هذا السيناريو سطحياً ومراوغًا بعض الشيء، ويفاده أن المشكلة المحيرة لتشكيل المجرات يمكن التوصل لها، بتركيب نظرى مثل الأوتار الكونية، وأن تلك الأوتار قد اخترت عنوة، ومن ثم فلا يمكن اكتشافها وتتبعها في الوقت الحاضر. وربما كان شيئاً بالغ الروعة بحيث يصعب تصديقه. وأن لها بлагة الإعلان التلفازى وبعض ثقة علماء الكون (سرًا على الأقل) يطلقون على الأوتار الكونية "الخداع"، مشيرين بذلك إلى "نواء" الماضي الذى كان يروجه البائعون، وهو عبارة عن زجاجات تحتوى على "إكسير" يشفى من كل الأمراض! وفي الجلسات غير الرسمية التى كانت تعقد في وقت متاخر من الليل، حيث يتم شرب الجعة، سمعت أيضًا أسطورة "جيزة الأسنان"<sup>(١)</sup> في هذا السياق.

وفي هذا الصدد، ربما يتوقع شيئاً من الشكوكية، وأولئك الذين يبدون تعليقاتهم، لا تكون أقسى على نظريات الآخرين، منها على نظرياتهم ذاتها. بيد أن الأمور قد لا


---

(١) شخصية خيالية في قصص الأطفال. مفادها أنه عندما يفقد الطفل إحدى أسنانه، عليه أن يضعها تحت الوسادة، إذ إن "جيزة الأسنان" تزوره ليلاً أثناء نومه، وتستبدل بها أخرى جديدة. (المترجم)

تكون بهذا القدر من السوء، كما يصورها المتشككون، إذ إنه من الممكن البحث عن برهان مستقل على وجود الأوتار في الكون المعاصر.

وثمة وسائلتان لإيجاد مثل هذا البرهان. إحداهما هو ما يطلق عليه "عدسات الجاذبية"، والتي تعتمد على التأثيرات التي تحدثها الأوتار على الضوء القادم من المجرات النائية. أما الوسيلة الأخرى، فإنها غير مباشرة - إلى حد ما - وتتضمن بحثاً عن الموجات التجاذبية التي كانت تبعث بها الأوتار في الزمن المبكر من عمر الكون.

وتوضح عدسات الجاذبية في الشكل (١٢-٥)، الضوء من جرم فضائي ناء ومضيء يأتي إلى كوكب الأرض حيث يتعرض إلى تداخل وإعاقة من جرم آخر بالغ الصخامة مثل مجرة نائية أو وتر كوني.



الشكل 12.5

وربما تتذكر أنه وفقاً للنظرية النسبية العامة، فإن الضوء الذي ينبع من نجم بعيد ينحني عندما يمر بالقرب من الشمس أو جرم فضائي ضخم آخر. وفي الموقف المبين في الشكل، فإن الجرم المعترض سوف يحنى أشعة الضوء، كما هو موضح. ومن ثم سوف يرى شخص ما يقف فوق كوكب الأرض، صورتين لجسم الفضائي النائي،

إحداهما ينتجه الشعاع الذى فوق القمة، والأخرى يحدثها الشعاع المنحنى تحت القاع.

عدسة الجاذبية الأولى (وفيها توفر مجرة معتمة - ولكنها عادية - الكتلة المطلوبة لكي يحنى إشعاع الضوء)، تم اكتشافها في العام ١٩٧٨، واليوم هناك ما يقرب من نحو نصف دستة من عدسات الجاذبية المعروفة. وفي كل الحالات، فإن الأجرام الفضائية المعرضة طريق إشعاعات الضوء، تكون مضيئة، ويمكن تحديدها، على الرغم من أننا لستنا في حاجة إلى تحديد الجرم الفضائي الذي يحنى الضوء، لكي نجد عدسة جانبية إذ إن الوتر الضخم (غير المرئي) يمكنه إنتاج نفس الصورة المزدوجة في السماء. ومن ثم فإن عدسة الجاذبية - دون تحديد للجسم الفضائي المعرض - يمكنها أن تكون برهانًا على وجود الوتر الكوني. بل إن الوتر الكوني الطويل بمقابله أن ينبع سلسلة من الصور المزدوجة، وهذه إشارة واضحة على وجوده.

وفي ربيع ١٩٨٦، كانت هناك عصبة إثارة موجزة، عندما أعلن الفلكيون في جامعة (برينستون)، عن اكتشافهم لما اعتقدوا أنها صورة مزدوجة لكونية الكواكب في كوكبة ليو (الأسد)<sup>(١)</sup>. ولسوء الحظ، فإن الأبحاث اللاحقة أوضحت أن ما اكتشفوه ليست صورة مزدوجة، ولكنها بالفعل صورة واحدة لكوناريين مختلفين. لذلك، فحتى الآن ليس ثمة أرصاد تبرهن على وجود عدسات جاذبية أحذثتها الأوتار الكونية، بيد أن الأبحاث تجري على قدم وساق. والوقت مبكر جداً أن نقول أي شيء عما يمكن أن يوجد في نهاية الأمر. والمجال الثاني الذي يمكن أن يتتوفر فيه برهان على وجود الأوتار الكونية، هو "النجوم النابضة"<sup>(٢)</sup>. إن النجوم النابضة هي المنتج النهائي لموت النجوم الضخمة، وهي عبارة عن أجرام فضائية تدور بسرعة هائلة، ولا يزيد قطر الواحد منها على عدة أميال

(١) ألمع نجوم كوكبة الأسد هو نجم "المليك" ويبعد عنا ٥٧٧ سنة ضوئية. (المترجم)

(٢) Pulsars نجوم نيوترونية (أى مكونة من نيوترونات)، وهي تدور حول نفسها بسرعة رهيبة وتتصدر موجات راديوية وإشعاعات. (المترجم)

فقط. وتنطلق موجات راديوية من الواقع الساخنة فوق سطح النجم النابض، ويحمل نوران النجم هذه الموجات خلف كوكب الأرض، تماماً مثل الطريقة التي يرسل بها برج مnarة إرشاد السفن إشعاعه، وفي كل مرة يمر الشعاع، يمكننا رؤية نبضات الموجات الراديوية، التي تتكرر على فترات منتظمة. ويكون معدل التكرار مرتفعاً، في أي مكان، من بضع إلى عدة مئات في الثانية الواحدة. وبالتالي، يمكن النظر إلى النجوم النابضة باعتبارها "ساعات" بالغة الدقة، في السماء تدق بمعدل رتيب.

ولو أطلقت الأوتار الكونية قدرًا كبيراً من الإشعاع التجانبي في الزمن المبكر من عمر الكون، إذن، فإن معظم هذا الإشعاع لابد وأن يكون موجوداً في الوقت الحاضر. ومن ثم، ستتجدد النجوم النابضة نفسها في بحر من الإشعاع التجانبي، الذي تتدافع وتتصادم جسيماته ببعضها، بينما تنطلق الموجات الراديوية بعيداً. وهذا بدوره سوف يفرض عدم انتظام عشوائي بسيط، على توقيت النبضات، التي يتم رصدها من كوكب الأرض. وطبقاً للإحصائيات التي تجري في الوقت الحاضر، فإنه يجب أن يكون بمقدورنا أن نصل إلى برهان لوجود الموجات التجانبية، عندما يمكننا تحديد فترة نوران النجوم النابضة السريعة، بأنها تبلغ عشر مرات أكثر دقة، عنها في الوقت الحاضر. ويشعر الراصدون الفلكيون بأن مثل هذا النوع من التحسين يمكن تحقيقه، في خلال السنوات القليلة القادمة.

وهكذا، فإنه على الرغم من اختفاء الأوتار الكونية عبر الإشعاع التجانبي، فإن هذا ربما يبدو خداعاً، فإن هناك وسائل لاختبار النظرية عن طريق الرصد. إن الأوتار الكونية ليست خداعاً، كما يلوح من أول نظرة، ولو أننا بعد الأبحاث الدقيقة والكافلة لنوع الأوتار الكونية المحددة آنفًا، لم نتوصل إلى البرهان الراسنخ على وجود وتر كوني واحد، ربما كان علينا في هذه الحالة، إعادة التفكير في هذه الإفادة. ومع هذا، ففي الوقت الحاضر - حتى الآن - يتصور عدد كبير من العلماء أن الأوتار الكونية تمدنا بأفضل فرصة لحل مشكلة البنية المروعة للكون.

## الفصل الثالث عشر

### أبحاث بُحريّية للمادة المظلمة

(سماع الألحان شيء رائع، ولكن تلك الأنفاس غير المسروعة أكثر روعة).

(جون كيتس)

قصيدة غنائية مكتوبة فوق جرة إغريقية.

يبدو واضحًا أن التساؤل عن طبيعة المادة المظلمة سيبطل معلقاً، حتى يتمكن - بالفعل - شخص ما من الإمساك بكمية منها وتحليلها في المختبر. ولا شك أنه شيء رائع للغاية أن تصاغ النظريات ويقوم العلماء بتوضيح أن المادة المظلمة يجب أن تسلك بهذه الطريقة أو تلك، ولكن حتى نتمكن من أن نعزل بعضًا من المادة المظلمة ونتأكد برصدها أنها تتصرف فعلاً كما هو مفروض لها، سوف يكون عدد كبير من الناس (وأنا من بينهم) غير قانعين. وحتى بالنسبة للمادة المظلمة غير المرئية، فإنه لا تقبل الحقيقة الواقعية إلا بالرؤيا الفعلية.

ويمكنا الارتحال في طريقين خلال سعيينا لإيجاد برهان تجريبي، لوجود الجسيمات، التي من المفروض أنها تكون أكثر من تسعمائة من كثافة الكون. أحد هذين الطريقين هو محاولة إنتاج هذه الجسيمات في مختبرات المعجلات، أما الطريق الآخر، فيتضمن معدات يمكنها اكتشاف وتتبع المادة المظلمة، بينما تنجرف بواسطة

كوكب الأرض. وكل من الوسائلتين تتم دراستهما في الوقت الحاضر بدقة وحماس. وما يستتبع ذلك، من وصف لبعض التجارب النموذجية، التي إما أنها استكملت أو مخططة لها أن تتم في العقد القادم. وثمة مبادرتان للجدل، تتماشى مع تاريخ فيزياء الجسيمات في الزمن المعاصر. إن الكثير من الجسيمات الأولية، التي تعتبر وجودها من الأمور المسلم بها، انبثق أو لا في إدراكنا، في التفاعلات التي استهلتها الإشعاعات الكونية، وهي جسيمات تتدفق إلى كوكب الأرض - كأمطار فضائية - من السوبرنوفات (المستعرات العظمى) في مجرة الطريق البني. وفي الوقت نفسه، جاءت الكثير من الاكتشافات البالغة الأهمية، نتيجة (لتخطيط بمهارة أو بالمصادفة) لتجارب أجريت في داخل المعجلات الرئيسية<sup>(١)</sup>.

### تجارب في المعجلات

المعجل جهاز ينتج حزمة من الجسيمات - إما بروتونات أو إلكترونات - وهى تطلق بسرعات تقترب من سرعة الضوء. وتوجه هذه الجسيمات إلى هدف، ويمكن لأى مجموعة من الذرات أن تقوم بهذه المهمة. وفي بعض التصادمات بين الجسيمات، يتحول جزء من طاقتها إلى كتلة من الجسيمات الجديدة، تبعاً للمعادلة ( $E = h \times \nu$ ). وليس ثمة أهمية في الاعتقاد بأنه من غير المحتمل أن ينبع جسيم معين من تلك التفاعلات، إذ لو توفرت لنا طاقة كافية في حزمة الجسيمات وانتظرنا لفترة طويلة كافية، فإنه عاجلاً أو آجلاً، سوف نرى ما نتوقعه. والأمل الذي نتشبث به في التجارب الحالية، أن هذا سيكون حقيقياً في البحث عن المادة المظلمة، كما كان في البحث عن الجسيمات الأخرى في الماضي.

و قبل أن نمعن النظر في تجارب بعينها، يجب أن نأخذ بعض النقاط في الاعتبار، أولها، أن الطاقة التي تنتقل إلى أي حزمة من الجسيمات، بواسطة أي معجل، تكون


(١) في كتابي "من الذرات إلى الكواركات" From Atoms to Quarks تم مناقشة تاريخ تطور فيزياء الجسيمات بالإضافة إلى تصميم واستخدام المعجلات. (المؤلف)

بالضرورة محدودة. وبمعنى آخر، ثمة حد أعلى - لأى آلة - لكمية الطاقة المترسبة  
لتتحول إلى كتلة. ويعنى ذلك، أن أى نتيجة سلبية في بحث ما، لا يمكن أن تؤخذ دليلا  
حاسماً ومقنعاً، بوجود نوع معين من المادة المظلمة، بل يعد فقط كإفادة، بأن الجسيم  
الذى خضع للبحث، له كتلة، أكبر من أقصى كتلة يمكن أن تنتجها طاقة هذه الآلة  
تحديداً. وهناك دائماً إمكانية أن آلة الطاقة التي سيتم تشبيدها في المستقبل القريب،  
سوف تنتج بوفرة جسيماً جديداً لا يمكن اكتشافه بالتقنولوجيا المعاصرة.

أما النقطة الثانية، فهى أن كثيراً من المرشحات الغريبة للمادة المظلمة، والتي تمت  
مناقشتها في الفصل الحادى عشر، لا يمكن إنتاجها بانفراد، ولكن يجب أن تنتج فى  
أزواج. وتخبرنا النظريات - على سبيل المثال - أنه لا يمكننا إنتاج فوتينو مفرد  
ومنعزل، فى أى تفاعل بين الجسيمات، يبدأ بارتطام إلكترون أو بروتون، بالمادة العادية،  
ليس بمقدورنا أن ننتج سلكرونانا منفرداً، بل يجب إنتاج سلكترونين، سلكترون  
وسلكترون مضاد. وفي الواقع، فإن هذه الأزواجية، تقسم الطاقة إلى نصفين، وهى  
المتوفرة للتتحول إلى كتلة فى أى معجل، إذن إن الطاقة يجب أن تقسم بين كل من  
طرفى النزج.

وأفضل تصميم لآلة يمكنها أن تبحث عن الجسيمات الجديدة، تتطلب ما يطلق عليه  
الفيزيائيون "جهاز تصاص حزم الأشعة". ويوضح الرسم التقريري في الشكل (١٢-١)،  
نموذجًا رمزياً لهذه الآلة؛ حيث ينتج أحد المعجلات حزم من الجسيمات التي تحقق  $\alpha$  في  
حلقات ضخمة، وفيها تؤدى مغناطيسات قوية، إلى أن تظل الجسيمات تدور. وتتحرك  
الجسيمات ذات الشحنة الكهربية الموجبة (كالبروتونات) في اتجاه واحد، حول الحلقة.  
بينما تدور الجسيمات ذات الشحنة الكهربية السالبة (مثل البروتونات المضادة)، في  
الاتجاه الآخر. وقد صممت الحلقة، بحيث إنه في أماكن معينة، مثل تلك التي وضعت  
عليها علامات  $\times$  في الشكل، تصطدم حزمتا الجسيمات - ببعضها - بالواجهة. في تلك  
اللحظات، تكون كل الطاقة المقتسمة بين الجسيمات المعجلة، متوفرة للتتحول إلى كتلة،


وليس ثمة منظومة ممكناً، أكثر كفاءة. وبالتالي، أنه بالات من هذا النوع، أجريت الأبحاث الرئيسية عن المادة المظلمة.



الشكل 13.1

وأحد البحوث التي تم تنفيذها في هذا المجال، استخدمت فيه عدد من الآلات التي يمكنها إطلاق حزم عالية الطاقة، من الإلكترونات والبوزيترونات<sup>(١)</sup>. وال فكرة هي أنه عندما تصطدم هذه الجسيمات ببعضها، يمكننا أن نحصل على تفاعلات مثل تلك الموضحة في الشكل (١٢-٢) إذ يتصادم إلكترون وبوزيترون، المتجانس من المجل، مما يؤدي - على سبيل المثال - إلى إنتاج جسيمات نقية لهما، في عالم فائق التمايز، أي سلكترون وسلكترون مضاد. وفي الفصل الحادي عشر، علمتنا أن الجسيمات فائق التمايز، تعطي دائمًا طاقة، إلى أن تصبح أخف جسيمات ممكناً. ويعنى الوصول إلى هذه الحالة أن السلكترون والسلكترون المضاد، سوف يتحولان - في نهاية الأمر - إلى فوتونات وجسيمات عادية، كما هو مبين في الشكل (١٢-٢).

(١) البوزيترون هو الجسيم المضاد للإلكترون. وكل من هذين الجسيمين له نفس الكثافة، ولكن شحنتيهما مختلفتان. وإذا اصطدمتا بعضهما، تحول كليتاًها إلى طاقة، ويفنى الجسيمان تماماً. (المؤلف)




وكما أوضحت من قبل، أنه من المستحيل الكشف عن الفوتينوات مباشرة، ذلك أن تفاعلاها مع المادة العادية، ضعيف للغاية، ومع هذا، يمكننا الكشف عن الإلكترون والبوزيترون اللذين ينتجان عن اضمحلال السلكترون والسلكترون المضاد. وثمة خصائص معينة، لزوج الإلكترون - بوزيترون الناتج عن عملية فيزيائية أخرى تشتمل على المادة العادية.

ومن ثم، فإنه من الممكن القول بأن الفوتينو قد أنتج، حتى لو لم نتمكن من الكشف عنه بشكل مباشر.

والآبحاث التي تدور حول التفاعلات مثل ذلك الموضع في الشكل (١٢-٢)، قد أجريت في معاهد الآبحاث الجامعتين الأميركيتين (كورنيل) و(ستانفورد) وفي (هامبورج) الألمانيا. وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى أي دليل في أحد التفاعلات، عن إنتاج فوتينو. من هذا، يمكن استخلاص نتيجة، مفادها أنه إذا كان الفوتينو موجوداً، سوف تكون كتلته - على أقل تقدير - أكبر بثلاث وعشرين مرة، عن كتلة البروتون. وربما لم يجد الباحثون في تجاربهم، ذلك الجسم الذي كانوا يبحثون عنه، بيد أن النتائج التي توصلوا إليها، يمكن استخدامها، لوضع حدود لخصائص ذلك الجسم الذي ربما يجدونه في نهاية الأمر.

ويمكن إجراء بحث مشابه للجسيمات الفائقة التماثل، بواسطة الآلات التي يمكنها إنتاج حزم متصادمة من البروتونات والبروتونات المضادة، مثل ذلك المعجل الضخم الذي يوجد في (المركز الأوروبي للبحوث النووية) - والمعروف اختصاراً بالحروف CERN - والذي يقع في جنيف بسويسرا. وفي هذه الآلة الجبارية، يمكن أن يحدث تفاعلاً مثلك الموضح في الشكل (١٢-٢) والذي يمكن أن ينشأ - في الأساس - من تصدامات بالواجهة بين البروتونات والبروتونات المضادة.


وكما كان عليه الحال في التجارب التي أجرتها آلات الإلكترون، فإن الفوتينوات الناتجة - في ذلك النوع المختلف من التفاعلات - لم يمكن الكشف عنها مباشرة. وما يمكننا أن نكتشفه، تلك الطاقة المفقودة، التي انتزعت بالتأكيد من هذين الجسيمين. ويمكننا أن نتوصل إلى فكرة ما عن هذه العملية، إذا أمكنك تخيل أنك ترتحل على طول سكوارك، على الفرع العلوي للتفاعل، كما هو موضح في الشكل (١٢-٣) وعندما يضمحل السكوارك، إلى فوتينو ورذاذ من المادة العادية، سوف تواجه بموقف كالملوّح إلى اليسار في الشكل (١٢-٤) وسوف تأتي المادة العادية في هيئة انبثاق نفاث ينطلق إلى اتجاه واحد، بحيث تعادل الفوتينوات التي سوف تتدفق إلى الاتجاه الآخر.



الشكل 13.3

ولو أححيط السكوارك بكاشف، كما هو موضح في الشكل (١٢-٤)، فإن انتباث جسيمات المادة العادي، يمكن الكشف عنه، ولكن ليس الفوتينوات. في هذه الحالة سوف يجابهنا وضع مختل التوازن، وفيه تنطلق الجسيمات إلى اليمين حيث لا تضادها - بقوة متساوية - أي جسيمات مندفعة إلى اليسار. ولو تخيلت تحريك الكاشف من مستوى كروي إلى آخر مسطح، فسوف تحصل على قراءة مثل تلك الموضحة إلى اليمين، نتوء وحيد (يطابق الانبعاث النفاث) على خلفية منخفضة.

### *Experimental Searches for Dark Matter*



الشكل 13.4

ويؤكد (كارلو روبيا) - الحائز على جائزة نوبل، والذي يعمل في منطقة الكاشف CERN في UA-1<sup>(١)</sup> - بأنه قد شاهد بعض الأحداث من ذلك النوع الموضح في الشكل، وهناك مخطط المخرجات الكاشف، إلى اليمين في الشكل (١٢-٤)، يتوافق مع بعض أفكاره التي أدلّى بها. ومنذ ربيع العام ١٩٨٨، لم يفسر الفيزيائيون، هذه النتائج كبرهان لوجود الجسيمات فائقة التماثيل؛ إذ إنه من المحتمل الحصول على إشارات

(١) يعني (Underground area1) أو (المنطقة ١ تحت الأرضية). والحرروف CERN ترمز إلى European Center for Nuclear Research (المركز الأوروبي للبحوث النووية، وهو المختبر Organisation Européenne pour la Recherche Nucleaire) (المترجم).

- مثل تلك الموضحة في الشكل - لتفاعلات التي تتضمن المادة العادي فحسب. وعلى سبيل المثال، فإن الجسيم الذي لم يكتشف بعد، يمكن أن يكون نيوتروينو أو أي جسيم آخر، لم يسجل من قبل في سجل آلة المختبر، والسؤال الجوهرى هو عما إذا كانت الأحداث التي شوهدت في CERN، قد وقعت بشكل أكثر مما كان متوقعاً منها، على أساس الفرض، بأنها جرت بواسطة تفاعلات المادة العادي فقط، ولا يبدو أن هذه هي الحالة قيد الدراسة. ومع ذلك، فإن الأبحاث التي جرت في CERN، قد أظهرت إحدى الطرق لمحاولة الكشف عن المادة المظلمة، التي تشكل معظم الكون.

### الأشعة الكونية للمادة المظلمة

أجرى (بلاس كابيريرا) وزملاؤه في جامعة ستانفورد، تجاربهم على نوع جديد من الكواشف، يمكن أن يزودنا بطريقة الكشف عن المادة المظلمة مباشرة، دون الحاجة إلى تخليقها في أحد المعجلات. ولفهم ما تتضمنه هذه التجارب الفريدة، عليك أن تعرف على حقيقتين، تشمل إحداهما على بنية الكون، أما الأخرى فتتضمن التكنولوجيا المتقدمة الحديثة.

والحقيقة الأولى هي، كما رأينا في الفصل السادس، أن المادة المضيئة في مجرة الطريق اللبناني مطمورة في المادة المظلمة الكروية الشكل. ولا تكون المادة المظلمة بنفس معدل سرعة المجرة، ومن ثم يمكن النظر إلى كوكب الأرض، وكأنه يتحرك خلال "رياح" من المادة المظلمة.

وبنفس الطريقة عندما تقود سيارتك في يوم هادئ، سوف تشعر بالرياح التي تنشأ نتيجة حركة سيارتك خلال الهواء. ولو توفر لنا مقاييس حساس بدرجة كافية، فيجب أن يكون بمقدورنا أن نكشف عن رياح تلك المادة المظلمة. وعلى الأقل، فإن هذا هوأمل الباحثين الذين يعملون في ذلك المشروع. والحقيقة الثانية، أنه بفضل نمو صناعة الإلكترونيات الدقيقة، على مر العقود القليلة الماضية، فقد أصبح بالإمكان تنمية

بلورات ضخمة من السيليكون النقي بشكل لا يصدق، وفي الواقع، فإن الرقاقة الإلكترونية الدقيقة، التي تعمل في حاسوبك الشخصي أو حاسوبك، ربما بدأت حياتها كجزء من بلورة أسطوانية من السيليكون عرضها نحو ست بوصات وطولها حوالي أربعة أقدام. وتتوفر مثل هذه البلورات النقاء والضخمة، هي التي تعطى الباحثين التجربيين الأمل، بأنه يمكنهم الكشف عن المادة المظلمة، التي يتحرك كوكب الأرض من خالها.

و فكرة الكاشف المشيد من بلورة سيليكون بسيطة للغاية. تخيل الذرات داخل البلورة مقيدة ببعضها بواسطة تنظيم معقد ومتناهٍ من التوابض المتباعدة. وإذا حدث وتصادمت ذرة في هذه البلورة مع جسيم برياح المادة المظلمة، فإن بعضًا من التوابض التي حول الذرة، سوف تتمدد. وبعد الاصطدام، سوف تهتز الذرة المتصادمة، وسينتقل ذلك التذبذب من ذرة إلى أخرى، بواسطة شبكة التوابض. وفي نهاية الأمر، سوف يشق ذلك الأضطراب طريقه من داخل البلورة إلى سطحها، ولو توفرت لنا كاشفات حساسة بدرجة كافية، سيكون بمقدورنا القول بأن ثمة تفاعلاً قد حدث، وبقياس وقت الوصول إلى السطوح المتباعدة، يمكننا أن نحسب في أي مكان من البلورة قد وقع.

ولا ريب أنه من السهل وصف هذه العملية نظرياً، ولكن أن نطبقها عملياً في موقع أحد المختبرات، فهذا أمر آخر، إذ إن أي شائبة في داخل بلورة السيليكون، سوف تغير من الطريقة التي تترتب بها "التوابض"، وفي الواقع، فإن تلك الشائبة أيضاً سوف تشتبأ الإشارة، بينما ترتحل إلى سطح المكعب. وذلك هو السبب في أن هذا النوع من الكواشف، قد تم تطويره في الوقت الحاضر، بعد أن تلقى العلماء الصناعيون درساً، في كيفية تربية بلورات تتسم بالضخامة والكمال.

وخطط (كابريرا) وفريقه لابتکار سلسلة من قوالب يزن كل منها كيلو جرام واحد من السيليكون مع شبكة قضبان متصلبة من الكواشف مثبتة في كل جانب، ثم قاموا بتبريد المنظومة برمتها، إلى بعض درجات حرارية فوق الصفر المطلق<sup>(١)</sup>. ولا يخوض

---

(١) درجة حرارة الصفر المطلق نحو ٢٧٣ درجة مئوية تحت الصفر. (المترجم)

التبريد فقط من الحركات العشوائية داخل السيليكون، مما يجعل الإشارات عند السطح أكثر نقاء، بل إنه مكن أيضًا الباحثين التجربيين من استخدام كاشفات بالغة الحساسية وفائقة التوصيل<sup>(١)</sup>، لقياس تلك الإشارات بدقة متناهية. وتمثل خطتهم في تكثيس آلاف من تلك المكعبات، ومراقبة ما يحدث. وهذه الممارسة في التكنولوجيا المتطورة، ليست أمراً جللاً، إذ إن طناً من أجهزة القياس الدقيقة السيليكونية، يمكن أن يوضع بشكل مريح، تحت منضدة مطبخ متوسطة الحجم.

وتحتها نقاط مثيرة عديدة، يمكن مناقشتها حول هذه التجربة. فهذا النوع من التذبذبات التي أحديتها الاصطدامات في السيليكون، مشابهة تماماً، لتلك التذبذبات التي تميز الموجات الصوتية في الهواء. ومن ثم، فإن التطبيق الفنى لعملية الكشف، تتشابه مع إيجادك لكرة تنس، بمجرد سماعك صوت ارتدادها من جدار، بعد اصطدامها به. ويمكنك القول بأن (كاپريرا) خطط أن "ينصت" لصوت المادة لظلمة.

ولأنه من المتوقع أن تكون التفاعلات مع المادة المظلمة نادرة للغاية، فلن يكون من الممكن تشغيل الكاشف، وننتظر فقط حدوث تفاعل، إذ إن هناك جسيمات أخرى في الجوar سوف تبعث بإشارات، تاهيك عن مدى الحماية المتوفرة لهذه المنظومة. وبالطبع، فإن أول مهمة لكاشف، سوف تكون الكشف عن النيوترونات الشمسية. والكشف عن المادة المظلمة، يجب أن يتصرف الباحثون التجربيون بالمهارة. أما عن خطتهم، فسوف تكون كالتالي:

نحن نعلم أن كوكب الأرض يدور حول الشمس، مرة كل عام. ويعني ذلك، أنه لمدة نصف عام يجب أن يكون كوكب الأرض متخللاً رياح المادة المظلمة. أما في نصف العام الآخر، فلابد أنه ترك هذه الرياح خلف ظهره. وبالتالي، سوف تتدفق مادة مظلمة أكثر، عبر الجهاز لمدة نصف العام الأول من العام، عنه في النصف الآخر. وتلك هي

---

(١) مواد تسمع بمرور الكهرباء خلالها دون أي مقاومة تقريباً، وذلك في درجات حرارة منخفضة للغاية تقترب من الصفر المطلق. (المترجم)

الإشارة السنوية، التي لها الأولوية عن أي شيء آخر، والتي يأمل الباحثون التجربيون في التوصل إليها.

أن يتذكر (كابيريرا) في إجراء بحث عن رياح المادة المظلمة في هذه الأيام، لأمر مثير للاهتمام، لأنه منذ قرن مضى، قام باحثان أمريكيان آخران، بإجراء بحث - أصبح شهيراً في الوقت الحاضر - عن نوع آخر من "الرياح". وكان الباحثان يعملان في كاليفورنيا، التي أصبحت الآن تسمى (جامعة كيس وسترن ريسيرف). وقد قام هذان الباحثان، (أليبرت ميتشلسون) و(إبوارد مورلى) بإجراء تجربة مشابهة في تحطيمها، لكشف المادة المظلمة، الذي وصفناه توأماً. في ذلك الوقت، كان العلماء يعتقدون أن الكون تتخلله مادة تعرف باسم "الأثير"، وأن هذه المادة توفر نوعاً من الإطار للكون بأسره. وعرفت مادة الأثير بأنها "عين الإله"، وتعدد مناطق الإسناد<sup>(١)</sup>، الذي تضمنته الفيزياء النيوتونية، والتي رفضها أينشتاين صراحة. وافتراض أن حركة كوكب الأرض خلال الأثير كانت تنتج "رياحاً أثيراً، وأن هذه الرياح يجب أن تظهر، حتى تغير الاتجاه في جزء من العام إلى الجزء الآخر، بسبب عملية مشابهة لتلك التي أشرنا إليها بایجاز أنفًا، عن رياح المادة المظلمة.

وعندما أوضح (ميتشلسون) و(مورلى)، أن مثل رياح الأثير، ليس لها وجود، فإنهم بهذا قد أزاحا أحد المعوقات المفاهيمية، التي كانت تقف كحجر عثرة في الطريق إلى التطور النهائي للنظرية النسبية.

وشرع (ميتشلسون) و(مورلى) في البحث عن تأثير ولكن عيناً ما حاولا، إذ انتهى بهما الأمر، إلى عدم التوصل إلى أي شيء، وعلى جانب آخر، فإن (كابيريرا)، قد بدأ تجاربه على أمل أنه لن يرى أي تغير في "رياح" المادة المظلمة، عندما يتحرك كوكب الأرض في مداره. وقال في هذا الصدد: "على أية حال، حتى لو وجدنا شيئاً ما، فلن تكون لدينا أي فكرة عنه!".

---

(١) مجموعة من المحاور للإحداثيات يمكن عن طريقها تحديد موقع وحركة ما. (المترجم)



## الفصل الرابع عشر

### مصير الكون

(غداً وغداً وغداً...).

ويليام شكسبير  
مسرحية ماكبث، الفصل الخامس، المشهد الخامس

### موجز

إن الحقيقة الأكثر عجباً، حول الطريقة التي تتطور بها المفاهيم في علم الكون الحديث، هي أن القضايا الثانوية غير المنجزة، يبدو أنها تختلف معاً. ومن المعترض أن المرء يمكنه أن يعرض فكرة غريبة للغاية، ويتأكد أن هناك جهلاً كافياً عن الكون، حتى يمنع أي تعارض من بك، بين فكرته والمعلومات المتوفرة في نفس المجال. تماماً مثل الخرائط العتيقة، فإن موقع عديدة في الكون عليها علامة "إنها غامضة لا تقتربوا منها". لم يعد هذا حقيقياً. فعلى سبيل المثال، إننا لا نستطيع أن نضع فروضاً حرة وسهلة عن طبيعة المادة المظلمة. إن لدينا معلومات كافية عن الطريقة التي تشكلت بها نوى النرات، بعد ثلاث دقائق من الانفجار الأعظم، لنضع محددات صارمة على كمية المادة، التي يمكن أن تكون في شكل (باريونات)<sup>(١)</sup>. كما أننا نعرف بمقدار كاف عن

---

(١) تعنى "الثقلة" وهي تتبع إلى عائلة الجسيمات المركبة التي تحتوي على ثلاثة كواركات. (المترجم)

البنية ذات الحجم المروع، ومن ثم، فلم يعد كافياً إظهار أن افتراضًا معيناً عن المادة المظلمة، سوف يحل مشكلة تكوين المجرات، إذ يجب علينا أيضاً أن نوضح أن هذا الافتراض، يفسر كذلك نشأة الفراغات. وفي الحقيقة، فإننا قد وصلنا إلى النقطة التي يبدو فيها خلق الكون وتطوره وبينيته الحالية، بمثابة مشكلة مفردة دون أية آثار. ولم يعد ممكناً أن نتعامل مع مجرد قطعة من هذه الأحجية، بل يجب علينا أن نحل المشكلة كلّ، مرة واحدة. ويجب على الفيزيائيين النظريين، أن يوضّحوا هذا الأمر، وأنهم عند التعامل ومعالجة مسألة البنية، لا يعيشون بالاتفاق بين النظرية والرصد والملاحظة الفعلية، التي تم الحصول عليها في المراحل الأولى بعد الانفجار الأعظم. ومفادها أنهم لن يعتقدوا بوجود المجرات، نتيجة لقصاء الفراغات في الكون.

وثمة واقعة شهدتها ضمن فعاليات مؤتمر دولي عقد مؤخراً، سوف توضح هذه النقطة. استوى عالم كونيات دائم الصيت واقفاً، بعد مجادلة بين أعضاء المؤتمر واقتراح آلية ربما تسمح لكل المادة المظلمة أن تكون في شكل باريونات، ومع هذا تظل تنتج - تقريباً - نفس الوفرة من غاز الهيليوم الذي نرصده في النجوم (انظر المجادلة عن العلاقة بين هاتين الاثنين في الفصل التاسع). وما أن جلس عالم الكونيات هذا، حتى نهض عالم نظري شاب في آخر القاعة، وأوضح أنه إذا فرض وطبقت هذه الآلية، فإن وفرة الهيليوم ربما تكون صحيحة أما تقدير فيض "الليثيوم"<sup>(١)</sup> فسوف يكون خطأ. ومن ثم، فقد سحب العالم الشهير ملاحظته، والقصد من هذه الواقعة الطريفة أنه منذ عشر سنوات مضت، لم تكن لتحدث. وقتنَّذ كذا. تحتاج إلى أرصاد وملحوظات عميقـة، عن هذه الظواهر مثل وفرة الليثيوم في الكون وحساباتها وإحصائياتها لم تكن قد تطورت إلى الحد أنه يامكاننا أن نتوصل إلى تنبؤات قطعية لا بس فيها، حول ما يجب أن تكون عليه هذه الوفرة، وبالتالي، فإن خيالنا يمكن أن يتقلص ويضيق بالكامل، ولا يمكن للمرء أن يضع قيوداً محددة عليها.

---

(١) عنصر كيميائي فلز، وهو معدني لين لونه أبيض لامع، يتأكسد ويتفاعل بسرعة في الهواء والماء. (المترجم)

ونحن في بداية الطريق لنتوصل إلى معرفة كافية عن الكون، لنضيق مدى اختياراتنا العديدة. ومن بين كل الأكون التي يمكننا تشييدها في أذهاننا، فائق القليل منها، يمكن أن يبقى راسخاً بعد إجراء الاختبارات المزدوجة للملاحظة والارصاد الفعلية، والحسابات والإحصائيات النظرية. وسوف يأتي الوقت، عندما يطرح سؤال في علم الكون: «كيف وصل الكون إلى ما هو عليه الآن؟»، وهل سيكون مرتبطاً من كل جوانبه بالحقيقة الراستة والوطيدة، وأننا ربما تصادقنا صعوبة حتى لإيجاد أى حل، لا يسبب أى تباينات في أى موقع بالكون. ولن تتناقضني الدهشة على الإطلاق، إذا حدث في خلال عدة سنوات قادمة أن الصعوبات التي يواجهها العلماء النظريون حول إيجاد حل لمشكلة تطور الكون وبينته، سوف تهيئ الفرصة لظهور حركة فلسفية جديدة، سوف تدعى أن الأسلوب العقلاني المتضائل للعلم الغربي، قد وصل إلى نهاية طريقه، ومن ثم يجب تجربة اتجاه جديد (من المفضل أن يكون صوفيا خفيا) يمكن أن يؤدي دوره في مجال الأبحاث، حدث هذا في السبعينيات من القرن العشرين، عندما وصلت فيزياء الجسيمات إلى طريق مسدود مؤقت، ومن ثم، يمكن أن يحدث نفس الشيء من جديد في علم الكون. ولكن كما أدى تطور نظريات المجال الموحد<sup>(١)</sup> إلى التغلب على مأزق فيزياء الجسيمات في السبعينيات من القرن العشرين فإبني أتوقع، أنه إذا ظهر هذا النوع من المشاكل في علم الكون، فإن وسائل العلم النظري – التي ثبتت صحتها وفاعليتها بالتجربة – كفيلة بأن تؤدي في نهاية الأمر، إلى التعامل معها.

ذلك أذك كلما تأملت عن كثب، خريطة الكون الجديدة التي صممت في الوقت الحاضر، فإذك سوف تتحقق أكثر، من أنها تكشف عن كون يشكل آلة مفردة ومدهشة، فكل تروسها ومحركاتها تتاغم معاً بطريقة رائعة، لتشكل وحدة متماسكة، كل شيء مرتبط ببعضه، وإدراكنا لهذه الحقيقة، ربما يكون بحق أكثر فطنة وأهمية، من التي يمكننا استخلاصها من علم الكون الجديد.

---

(١) نظرية لم تتحقق بعد، ومدفأها توحيد القوى الأربع للكون أي الجاذبية والكهرومغناطيسية والقوة الضعيفة والقوة الشديدة. (المترجم)

## بعض الآراء الغريبة غير التقليدية

بعد أن أوضحنا فيما سبق أن هناك العديد من التقييدات الجديدة، على نماذجنا للكون، وأسالرع لإضافة بأنه على الرغم من ذلك، فما زالت هناك مساحة واسعة لإعمال الخيال، ولبيان ذلك بمثال توضيحي، دعني أذكر بعض أساليب البحث، التي - حتى الوقت الحاضر - لم يثبت خطأها.

إن الأوتار الكونية التي تمت مناقشتها في الفصل الثاني عشر، تشكلت بتاثير الطريقة التي انفصلت بها القوة الشديدة عن القوى الأخرى، عندما كان عمر الكون ١٠-٣٥ ثوانٍ. وبمعنى آخر، أنها تكونت من نظريات التوحيد العظمى. ومؤخراً، أوضح (إد وايتن) وجيروم أوسترايكير) من جامعة برمنغهام، بأن الأوتار الكونية يمكن أن تنشأ أيضاً في نظريات التمايل الفائق، حيث إن قوة الجاذبية توحد تماماً مع القوى الكونية الأخرى. وفي بعض الحالات، فإن تلك الأوتار فائقة التمايل، تمتلك - على الأقل - خصائص غير عادية.

وأكثر هذه الخصائص غرابة، أنه عندما يقترب جسيم عادي، من أحد الأوتار الكونية، فإنه يمكن أن يسقط فيه، مطلقاً طاقته أثناء ذلك.

وما أن يصبح هذا الجسيم داخل الوتر، يكون قد وقع في الشرك، ويظل كامناً في الداخل، حتى تأتى وسيلة ما خارجية لتضيف طاقة للوتر، مما يؤدي إلى إطلاق سراح الجسيم. وهذه الجسيمات المحبوسة يمكنها أن تتحرك، وإذا كانت مثل الإلكترونات العادي، فإن هذه الحركة تنشئ تياراً كهربائياً. وتظهر الحسابات والإحصائيات أن هذه الجسيمات المحبوسة، بعديورها إنتاج تيارات كهربائية مروعة دون أن تفقد شيئاً من طاقتها، وتبلغ قوة هذه التيارات كدريليون<sup>(١)</sup> مرة أكثر مما يطلقه أكبر خطوط القوى الكهربائية. لو كان هناك مجال مغناطيسي في الكون المبكر، عندئذ، فإن حركة

---

(١) يساوى في النظام الأمريكي ١٠١٥ أي واحد وأمامه خمسة عشر صفراء. (المترجم)

الأوتار عبر ذلك المجال، سوف تدفع بهذه التيارات إلى مستويات عالية، إلى أن تصل إلى نقطة، ينفجر عندها الوتر الكوني، مطلقاً كل جسيماته في انفجار رهيب. وثمة افتراض بأن هذه الانفجارات الهايئة للأوتار فائقة التمايل، التي حدثت في وقت مبكر من عمر الكون، هي التي كونت الفراغات التي نرصدها في الوقت الحاضر.

ويعاب على هذه النظرية البارعة من الشواشب الناتجة عن كل نظريات الانفجار (انظر الفصل السادس)، وبإضافة إلى هذا، فإنها لا تجيب عن بعض الأسئلة، ولعل أكثرها إثارة: من أين أتى المجال المغنتيسي الأصلي الذي ولد التيار الكهربائي؟ وحتى يتم التصديق لهذه الأسئلة، سوف يكون من الصعب اعتبار هذه الرؤية للأوتار الكونية، إلا مجرد فرض مثير للاهتمام.

وثمة تأمل آخر، يحتمل أن يصيب قدرًا من النجاح، كشف عنه وتابعه (نيل توروك) و(دافيد شرام) من جامعة شيكاغو ومختبر معجل فيرمي القومي. أخذين في اعتبارهم أن كل نوع من المادة المظلمة بذاته. تواجهه صعوبات في تفسير كل الظروف الأخرى التي تم تأكيدها من قبل عن الكون، وتتبين هذه النظريات موقف كل ما سبق<sup>(١)</sup>. وعلى سبيل المثال، ذكرنا في الفصل العاشر، أن المادة المظلمة الساخنة التي في هيئة نيوتروينات ثقيلة، ليس بمقدورها تفسير كيفية تشكيل المجرات، ولكن ماذا لو كان هناك نوعان من المادة المظلمة في الكون، على شكل نيوتروينات وكذلك على هيئة أوتار كونية؟ ويمكن للأوتار الكونية أن تفسر - بطريقة مقنعة للغاية - مسألة تشكيل المجرات، أما النيوتروينات فيمكنها تفسير البنى الكونية المروعة بنفس القدر من الإقناع. فلماذا لا نأخذ النظريتين معاً، وتحقيق من أن قوة أحدهما لا تنفي ضعف الأخرى؟

بيد أن الوقت لا يزال مبكراً للغاية، للقول بأن هذا الاقتراح سوف يؤتي ثماره، ولكن ثمة سبب أكيد للاعتقاد بأن ذلك سيحدث قريباً. ولو تم هذا الأمر، فربما عندئذ لن تكون هناك ضرورة لأنواع المرشحات الغريبة للمادة المظلمة، التي ناقشناها في الفصل

---

(١) أي كل النظريات السابقة عن الكون. (المترجم)

الحادي عشر. وسيكون من المتع أن نتمكن من المضى قدماً - وليس بمنأى - في دراسة الجسيمات، التي نحن على بنية منها منذ زمن طويل.

### ماذا سيكون مذاقها؟

إن واحدة من أروع المتع التي يشعر بها، من يقوم بالتدريس لطلاب الكليات، أنه بين حين وآخر، يسأل أحدهم عن شيء ما، يفتح على مصراعيه أفاقاً، لم يفكر فيها الأستاذ قط، بينما وبين نفسه، حدث في العام الماضي، أن سنتمت قراءة نفس أبحاث الفصل الدراسي القديمة، أثناء تدريسي لقرر الفيزياء التمهيدى للطلبة. ومن ثم، فكرت فى القيام بتجربة ما. أبلغت الطلبة أن يقرأوا ويعدوا تقريراً، عن خمسة مقالات من اختيارهم، نشرت بالمجلات العلمية التى تعنى بنشر الموضوعات العلمية البسطة لغير المتخصصين، وكان هدفى من هذا، أن أجعلهم يعتابون على فكرة الحصول بأنفسهم على المعلومات عن العلم، خارج قاعات محاضرات الجامعة.

وقرأ أحد الطلاب مقالاً رائعاً عن المادة المظلمة، كتبه (لورنس كروس) في مجلة "العالم الأمريكي"<sup>(١)</sup>. وبعد صياغة التقرير المعتاد، قام الطالب بالتعليق بما يلى: "إن كل هذا شيء حسن للغاية، ولكن إن ما تفعله المادة المظلمة للكون، لن يكون له تأثير كبير على حياتى. إن ما أود معرفته شيئاً شخصياً أكثر. ما مذاق المادة المظلمة؟ هل ملمسها لزج؟ أيمكننى أن أسبح داخلها؟"

وأدلى هذا التعليق إلى أن أتوقف وأفكر. ومثل معظم الفيزيائيين، تقبلت دون نقاش، أن المادة المظلمة تتعلق بال مجرات والعناقيد المجرية الفائقة، وليس بتجربة الحياة اليومية، ومع هذا، فإذا كانت موجودة بالفعل، فإنه من الممكن أن تجمع معًا بكميات كافية، وفي هذه الحالة نستطيع تذوقها أو القفز فيها، فما الذى ستكون عليه مثل تلك التجربة الفريدة؟

---

.Scientific American Magazine (١)

للإجابة عن هذا السؤال، عليك أن تفك في ما يعنيه تذوق أو الإحساس بشيء ما. إن عملية التذوق تتضمن تفاعلاً كيميائياً يتم فيه اندماج جزيئات مادة ما، مع جزيئات حليمات التذوق<sup>(١)</sup>، حيث تنتج إشارات كهربائية، تذهب إلى المخ. ويشتمل الإحساس على إثارة، بالضغط على مستقبلات متخصصة في الجلد. ومن ثم، فإذا أردنا "تذوق" المادة المظلمة، فيجب أن يكون بمقورها أن تشكل نفسها على هيئة ذرات وجزيئات. وإذا رغبنا أن نتحسسها، يجب أن تكون متصلة بدرجة كافية، حتى تتمكن من بذل ضغط عليها.

وباجراء هذا الاختبار، يمكننا في التو أن نقيم مرشحات المادة المظلمة مثل النيوتريونات والأكسيونات، عن طريق التذوق. إنها لا تكون ذرات، وتتفاعلاتها مع المادة العادية ضئيلة للغاية، إلى الحد أنها لن تحدث تأثيراً أيّاً كان، على حليمات التذوق. وفي الواقع، فإننا جميعاً "تذوق" النيوتريونات طوال حياتنا، بمعنى أنها تمر خلال أفواهنا، بمعدل يصل إلى الملايين في الثانية الواحدة، في رحلتها بعيداً عن الشمس. إنها لا تثير أيّاً من التفاعلات الكيميائية الضرورية، إنشاء ارتحالها. ونفس المثل ينطبق على الأكسيونات (إذا كانت موجودة). إننا "تسبع" أيضاً في لجة النيوتريونات طوال حياتنا، بيد أنها لم يعد بمقورها بذل ضغط، أكثر من مجرد "ندفعة" حليمات التذوق. كما لا يستطيع المرء أن "يتذوق" المادة الظل، لسبب بسيط هو أنها - على سبيل الفرض - لا تتفاعل كيميائياً مع المادة العادية. وربما يتبرأ إلى ذهنه، أنه ما دامت المادة الظل يمكن أن تتكامل معها، إلى مواد صلبة وسائلة، إذن يمكن الإحساس بها، بيد أن هذا ليس صحيحاً. ذلك أن المادة الظل تتفاعل معنا، فقط من خلال قوة الجاذبية، وإذا قام شخص ما بوضع كتلة غير منتظمة من المادة الظل في راحة يده، سوف تسقط على الفور إلى أسفل، غير مسببة - تقريباً - أي اضطراب للأنسجة. ويرجع هذا، إلى أنه عندما تمسك بشيء ما في يده، فإن القوى الكهربية بين الذرات التي تكون يده، وذرات الشيء، هي

---

(١) خلايا مستديرة وبียวضائية توجد على اللسان وتشكل أعضاء حاسة التذوق. (المترجم)

التي تغلب على قوة الجاذبية وتمنع الشيء من السقوط. ولا يمكن لهذه القوة أن توجد بين المادة الظل ويدك، ومن ثم، فإن المادة الظل لن تجد شيئاً يمنعها من السقوط.

وربما يحدث الشيء نفسه، إذا حاولت أن تنتزع جزءاً من وتر كوني، ولكن لسبب مختلف. ربما تفترض أن الوتر كثيف المادة للغاية، إلى الحد أدنى إذا حاولت أن تمسك بأشبوطة منه في يدك، فإنها سوف تسقط على الفور مخترقه يدك، تاركة خلفها ثقباً يشير إلى الممر الذي سارت فيه، وكانتها آلة حادة استخدمت في قطع كعكة كونية. وفي الحقيقة، فإنه حتى الكثلة الهائلة للوتر الكوني، لا تستطيع أن تغلب على الضعف المتصل في القوة التجاذبية. وبينما يسقط الوتر الكوني خلال يدك، فإن القوة التي سوف يبذلها على أية ذرة ستكون أقل بكثير من القوى الكهربائية العادية التي تبذلها الذرات المجاورة لها، وهي القوى التي تمسك بأشبوطة يدك معاً. وسوف يسقط الوتر الكوني - دون شك - خلال يدك، بيد أن تأثيره على الذرات التي يصطدم بها، ضئيل للغاية إلى الحد أنه لا يمكن من إزاحتها من مكانها. أما أنت فلن تشعر بأي شيء.

وهكذا، فإن بحثنا عن المادة المظلمة "حلوة المذاق"، يذهب بنا إلى شركاء فائقى التماثل. والجسيم الأكثر "شيوعاً" هو الفوتينو، الذى لا يشكل ذرات، على الرغم من أنه ربما يكون قادراً على بذل ضغط أقل - إلى حد ما - من الضوء العادى. ولا تتمكن الفوتونات ولا الفيتتونات في كثافاتها العادية، من أن تمارس ضغطاً كافياً علينا، حتى نشعر بها. وربما يحدث الشيء نفسه للشذرات، التي تتكون بكمالها من الجسيمات فائقة التماثل.

ومع هذا، فإذا كان السلكترون مستقرًا، فيمكن أن يوجد فرضياً يناقض الفكر السائد في الوقت الحاضر، وثمة احتمالية أن يكون شيئاً مثيراً للاهتمام. وقد ظهرت هذه الاحتمالية، لأن سلكتروناً مستقرًا، الذى له شحنة كهربائية سالبة، يمكنه أن يحل محل إلكترون أو أكثر في داخل ذرة عادية. ويسبب الكثلة الضخمة للسلكترون، يصبح مداره مختلفاً.

عن مدار الإلكترون، الذي حل محله، وبالتالي، فإن كل مدارات الإلكترونات الأخرى في الذرة، سوف يصيبها التشوش وعدم الانتظام، وكذلك سوف تتغير كل الخصائص الكيميائية للمادة التي تحتوي على هذه الإلكترونات. ومن ثم، فإن مثل هذه "الذرة - الفانقة"، سوف يجري بها مجموعة جديدة تماماً، من التفاعلات الكيميائية. إن الأطعمة التي تتناولها إذا كانت تشتمل على "كريبن فانق"<sup>(١)</sup>، فلن يكون مذاقها مثل أى أطعمة عرفناها من قبل.

ولو كانت المادة الفانقة موجودة، فربما تفتح المجال لآفاق جديدة من الطهو. ومن يدرى، لعل بمقاديرنا تطوير شيء ما، مذاقه كالمثوجات (الآيس كريم) ولكن ليس به أية سعرات حرارية!

## مصير الكون

ماذا سيكون تأثير المادة المظلمة على المصير النهائي للكون؟ أمور عديدة يمكن أن تقال حول هذا السؤال. في المقام الأول - كما سوف نرى بعد قليل - أن المادة المظلمة يكاد لا يكون لها أثر على المستقبل، من وجهة نظر راصد فوق كوكب الأرض. بيد أنه إذا كان الكون يمتلك حقاً، الكمية الحرجة من المادة، فعندئذ يكون لوجود المادة المظلمة - بالتأكيد - تأثير على مدى المستقبل البعيد. وقد أصبح من المعتاد في المجادلات التي من هذا النوع، أن تشتمل على تأمل لفكرة مفادها أن الكون يمر بفترات نورية، أي إن الانفجار الأعظم سوف يتبعه تقلص وانهيار (الانكماس الأعظم) ثم انفجار مروع آخر (الارتداد الأعظم). ولو كانت أفكارنا الحالية صحيحة، فإن هذا لن يحدث؛ إذ إن الكون خلق بانفجار أعظم واحد، تبعه تمدد أخذ يبطئ خلال زمن غير محدود.

---

(١) نوع جديد من الكربون يطلق عليه "كارباين" Carbyne يمكن أقوى وأرق من أي مادة أخرى. (المترجم)

ويمكنا أن نتفق أثر تطور الكون، افتراض أن قوانين الطبيعة التي نرصدها في الوقت الحاضر، سوف تظل دائمةً حقيقة في المستقبل. ومن وجهة نظر مراقب فوق سطح كوكب الأرض، فإن البنية المروعة للكون تظهر اختلافاً بالغ الصالحة لمظهر السماء ليلاً، ما دامت المجرات النائية تكون - في الغالب - خفية للعين المجردة. وسوف تستمر النجوم في مجريتنا الطريق اللبناني - بما فيها الشمس - في التأرجح حتى تستنفذ مخزونها من وقود الهيدروجين والهيليوم. وبالنسبة للشمس فإن وقودها سوف يستهلك بعد نحو أربعة بلايين سنة، ومن ثم ستتحول إلى عملاق أحمر. أي نجم متتفق يمتد مداره إلى ما بعد مدار كوكب الزهرة. وبالنسبة لراصد فوق سطح كوكب الأرض، سوف تظهر الشمس ملء نصف السماء. وقائمة، سوف تغلي المحيطات وتتغنى كل الكائنات الحية، وإذا لم يكن لدى الجنس البشري، الإدراك الوعي باستعمار كواكب تدور حول نجوم أخرى ستكون هذه هي نهاية.

ويتبع مرحلة العملاق الأحمر، انهيار الشمس لتصبح قزمًا أبيض. والقزم الأبيض نجم في حجم الأرض تقريباً، يأخذ في التبريد ببطء، كأنه فحم كوني فقد مصدر نيرانه. ستختبو النجوم في السماء، الواحدة تلو الأخرى، إما بانفجار مشهدى أو بصوت خافت كأنه الأنين، مثل الشمس. وإذا حدث وكان هناك راصد فوق كوكبنا، عندما يكون عمر الكون "كواذرليون" سنة (أكبر من عمرها الحالى بألف مرة). سوف تكون السماء - بالتأكيد - حالة السوداد؛ إذ إن كل النجوم تقريباً، التي نراها في الوقت الحاضر، سوف تكون معتمة للغاية بحيث تكون غير مرئية أو تبدو كنقاط خافتة في محيط من الظلام.. ولم تكن المجرات النائية قط، جزءاً من المشهد الكوني الرائع الذي يتجلى في الوقت ما بين غروب الشمس وشروقها، فيجب أيضاً انتقادها. وسوف يستمر التبريد البطيء للرماد الكوني، لزمن طويل، ويكون المصير الوحيد، هو سقوط النجوم والغاز في الثقب الأسود، الذي نعتقد أنه يربض في مركز مجرة الطريق اللبناني، ومن وقت لآخر، يتصادم جسم وضده فيقني كلاماً الآخر، مما يضيف إلى محيط الإشعاع المتعدد. وسوف يستمر تمدد الكون، بيد أن معدله سيبطئ بشكل محسوس، مع مرور السنين.

وسوف يكون هناك معلمان فقط للإشارة إلى التغيرات التي تحدث مع تقدم الزمن، وعندما يكون عمر الكون حوالي ١٠٣٦ عاماً - أى بعد مرور زمن طويل، على توقف كل النجوم عن التالق - سوف تض محل البروتونات في المادة العادية، وكل شيء سوف يتخلل في الجوار، سواء كان رماداً نجمياً أو كتل من الصخر، سيختفي في عصفة من الشعاع، بعد أن انهارت ودمرت ذراتها. كما ستزول الأرض تحت أقدامنا. وبعد هذا، عندما يقترب عمر الكون من ١٠٦٠ عاماً، فإن الثقوب السوداء التي كانت حتى هذا الوقت - تجمع المادة في داخلها، سوف تبدأ في إشعاع كتلتها إلى الخارج، في شكل طاقة عادية. ثم سرعان ما تفني. وبعد حدوث هذا، لن يتبقى أى شيء في الكون، مشكلاً عن المادة العادية، بل مجرد محيط بارد متمدد من الإشعاع، تتبعثر فيه جسيمات قليلة غريبة. أفلتت من الفناء بطريقة ما، وهي الآن تنتشر على نحو رقيق للغاية للتلقى بجسيمات رقيقة من جديد.

وعلى الرغم من أن أى فيزيائى - على حد علمى - لم يفكر فيما قد يحدث للمادة المظلمة، بينما تتم هذه القصة فصولها،أتوقع أن المادة المظلمة سوف تمر بنوع مماثل من التطور. ودبما على مر العصور، سوف تتقلص الهالات المجرية إلى أقراص، ولكن ست تكون هذه الأقراص من الفوتينوات، ولن تتمكن من تشكيل نجوم فائقة أو أى نوع من البنى المثيرة للاهتمام. وفي نهاية الأمر، سوف تضطر الفتنيات إلى السقوط، في روى الثقوب السوداء الخاصة بها، التي سوف تشع كلتها بعيداً.

وهكذا، ناهيك عن المادة التي تشكل الكون، فإن النهاية سوف تكون واحدة، محيط بارد متمدد من الإشعاع، اختفت فيه كل مظاهر الحياة، منذ زمن طويل.

## خاتمة

يفقد كل من العلماء والشعراء قدرتهم على إيجاد الكلمات المناسبة، عندما يواجهون بمثل هذا النوع من السيناريوهات عن نهاية الكون. وبعد (ستيفن فينبرج) الحائز على جائزة نوبل، أحد المسؤولين - مثل أى عالم آخر - عن فهمنا الحالى عن الطبيعة، وقد أنهى كتابه الرائع "الثلاث دقائق الأولى"<sup>(١)</sup> بعبارة كثيبة متشائمة تلخص بما أن الكون يمكن إدراكه أكثر، ظهر أيضًا أنه مرتع لا معنى له. ومنذ حوالي قرن مضى، عبر الشاعر الفيكتورى (الجرنون سوينبىن)<sup>(٢)</sup> عن فكرة مشابهة في قصidته "حقيقة بروسبرين"<sup>(٣)</sup>:

من الإغراق فى حب الحياة

من أمل وخوف ينطلقان فى حرية من أسرهما،

إنتا نشكر فى عيد شكر وجيز

أيا من الأرباب الموجوبين هناك

إنه لن يعيش إلى الأبد أى إنسان،

ولأن يقام الموتى من قبورهم أبدًا،

---

(١) The first three Minutes . (المترجم)

(٢) الجرنون تشارلس سوينبىن (١٨٣٧ - ١٩٠٩). (المترجم)

(٣) بروسبرين، إلهة الإخلاص فى الأساطير اليونانية. (المترجم)

وأنه حتى في النهر السريع الجريان،

سوف تصل الرياح العاتية سالمة إلى البحر.

وكان يتعامل فقط مع القانون الثاني للديناميكا الحرارية<sup>(١)</sup>، وليس التمدد الكوني

لهابل!

ليس ثمة شك على الإطلاق، أن التأمل في كيفية نهاية الكون، يبيّن أنه يظهر الجانب الأكثر تشفاماً وكابة لكل من العلماء والشعراء، وتذكرني الاحتمالات المطروحة، بقصة من الخيال العلمي، كان لها تأثير قوى على عندما كنت يافعاً، كانت قصة تتضمن السفر عبر الزمن، حيث تتفاعل شخصيات - من حقب تاريخية مختلفة - مع بعضهم، وكان شخص ما من بينهم يظهر دائمًا في الخلفية، شخص غامض يرتدي عباءة راهب، لم يتكلم قط حتى بلغت أحداث القصة ذروتها. وعندما أعلن مؤكداً "إنتي آخر البشر.." ثم استطرد بصوت منغم "... مهما فعلتم وحققت من منجزات، ومدى الشدة التي واجهتم، سوف تنتهي كل الأمور بشخصي".

ومن الصعب تخيل أي شيء أكثر تأثيراً في تأجيج خيال المراهق. وحتى في هذه الأيام، مع تعاقب السنين وتطوير الحكم، كما أتمنى. عندما أعلم أن القصة لا تهتم بالبيولوجيا ولا بالفيزياء، أشعر بقوة الصورة الذهنية الأدبية.

ليس كل شيء تعلمناه عن بنية الكون، ونظريات المجال الموحد والمادة المظلمة، مجرد وسيلة لدعم مثل هذا الاعتقاد القديري عن المستقبل؟ ولو أنه بعد بلايين السنين في المستقبل، لن يكون ثمة حياة، ولا ذكاء، ولا ذكريات عن كفاح الإنسانية. عندئذ نتسائل: ما قيمة وجود الوجود؟

---

(١) العلم الذي يدرس خواص انتقال الشكل الحراري للطاقة مثل تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية كما في محرك الاحتراق الداخلي. (المترجم)

وباعتبارى عالماً وإنساناً، فإنه يجب علىَّ أن أجيب عن هذا التساؤل مهما كلفنى هذا من مشقة. وثمة احتمال أن تحليلى له، ربما سوف يساعدك عندما تواجهه بنفسك. وبعد مدة طويلة من التردد، أدركت فى آخر الأمر، أن القضية برمتها، يمكن أن تصاغ كمشكلة بسيطة كيف سوف أتصرف فى الغد؟ إذا أخذت فى الحسبان ما الذى أعرفه عن مستقبل الكون، كيف سيمكنتى التعامل مع قرارات كل يوم، التى تشكل حياتي؟

وما توصلت إليه فى النهاية، هو الآتى: ربما يكون صحيحاً أنه بعد كواينيليون عاماً، سوف يصبح الكون محاطاً من الإشعاع البارد المتعدد. ولكن ربما لن يكون هناك شخص ما لديه معلومات عن كيفية سلوكى فى الغد، ولا أحد يتذكر ما الذى فعله كل واحد منا. بيد أن هذا لا يمت للموضوعصلة.

ولكن الأمر الجدير بالاهتمام، أننى سوف أعرف غداً، ما الذى فعلته، سوف أعلم إذا كنت أفضل شخص، أمكننى الوصول إليه.

وفي النهاية - يا أصدقائى - هذا كل ما يهم فى أمر المادة!

## **قائمة المصطلحات العلمية**

### **إعداد المترجم**

#### **A**

Andromeda	أندروميدا ( المرأة المسلسلة )
Antiproton	بروتون مضاد
Atom	ذرة
Axion	أكسيون

#### **B**

Baryon	باريون
Big Bag	الانفجار الأعظم
Big Bounce	الارتداء الأعظم
Big Crunch	الانسحاق الأعظم
Blak Hole	ثقب أسود
Bootes Constellation	كوكبة العواء
Boson	بوزون

#### **C**

Cosmic Strings	الأوتار الكونية
Cosmology	علم الكون
Coma Cluster	العنقود المجري ( النؤابة )

Cepheid Variable	المتغير القيفاویة
Compactification	الإدماج
Correlation Function	وظيفة العلاقة السببية
Cosmic Rays	الأشعة الكونية
Critical Density	الكثافة الحرية
Closed Universe	الكون المغلق
Coupling	ارتباط

## D

Dark Matter	مادة مظلمة
Dark Energy	طاقة مظلمة
Decoupling	فك الارتباط
Deuterium	الديوتريوم
Doppler Effect	أثر دوبلر
Dark Matter Wind	ريح المادة المظلمة

## E

European Center For Nuclear Research (CERN)	المركز الأوروبي للأبحاث النووية
Electron Volt (ev)	إلكترون فولت

## F

Flat Universe	الكون المسطح
---------------	--------------

## G

Galaxy	مجرة
Gravitational lens	عدسات تجاذبية
Gravitational Radiation	الإشعاع التجاذبي

<b>Galactic Rotation Curve</b>	منحنى الدوران المجري
<b>Gravitational Wave</b>	موجة تجاذبية
	i
<b>Iso thermal Model</b>	النموذج المتحاور ( متساوی الحرارة )
<b>In Flationary Universe</b>	الكون المتضخم
	L
<b>Light Year</b>	سنة ضوئية
<b>Lepton</b>	ليبتون
<b>Lithium</b>	ليثيوم
<b>Loops</b>	أنشوطة
	M
<b>Milky Way</b>	مجرة الطريق الابني
<b>Mass Concentration</b>	تركيز الكتلة
<b>Missing Mass</b>	الكتلة المفقودة
<b>Molecule</b>	جزء
	N
<b>NASA</b>	وكالة الفضاء الأمريكية
<b>Nebulae</b>	سديم
<b>Neutrino</b>	نيوترينو
<b>Neutron</b>	نيوترون
<b>Nucleosynthesis</b>	تخليق النوى
<b>Nucleus</b>	نواة

	O	
Oscillations		تذبذبات
	P	
Particules		جسيمات
Photino		فوتيينو
Plasma		بلازما
Positron		بوزيترون
Protogalaxy		المجرة الأولية
Pulsar		نجم نابض
Parallax		تغير ظاهري في الموضع الشيء المرصود
	Q	
Quasar		كوازر ( شبه نجم )
Quantum Mechanics		ميكانيكا الكم
Quark		كوارك
	R	
Red Giant		عملق أحمر
Red Shift		الانحصار نحو الأحمر
	S	
Super Galaxy		مجرة قائمة
Super Galaxies Cluster		عنقود مجرات قائمة
Super Strings		الأوتار الفائقة
Spiral Galaxies		المجرات الحلزونية ( الولبية )
Solar Oscillations		التذبذبات الشمسية

<b>Supersymmetry</b>	التماثل الفائق
<b>Solar Seismology</b>	الزلزال الشمسي
<b>Space - time</b>	الزمان
<b>Supernovae</b>	السوبر نوفا ( المستعمر الأعظم )
<b>Shadow Universe</b>	الكون الظل
<b>T</b>	
<b>Theory of Everything (TOE)</b>	نظيرية لكل شيء
<b>U</b>	
<b>Universe</b>	كون
<b>Unified Field theory</b>	نظيرية المجال الموحد
<b>V</b>	
<b>Void</b>	فراغ
<b>W</b>	
<b>WIMP</b>	الجسيمات الكثيبة ضعيفة التفاعل
<b>White Dwarf</b>	قزم أبيض

## المؤلف في سطور :

### جيمس تريفيل

- بروفسور في الفيزياء - جامعة (جورج ماسون) - الولايات المتحدة .
- ولد في شيكاغو - الولايات المتحدة، وتتعلم في مدارسها، وحصل على شهادة بكالوريوس الفيزياء في جامعة إلينوي، ثم التحق بجامعة أكسفورد، وحصل فيها على درجة الماجستير في الفيزياء وفلسفة العلم، وبعدها حصل على درجة دكتراه تخصص الفيزياء النظرية في جامعة ستانفورد .
- كتب العديد من الكتب والمقالات العلمية عن الكون والفيزياء، وبلغ عدد الكتب التي قام بتأليفها أكثر من ثلاثين كتاباً وعشرين المقالات في كبرى المجالات العلمية العالمية، كذلك ألف العديد من المحاضرات العلمية عن الكون والفيزياء، كما أنه عضو ومستشار في الكثير من المنظمات العلمية العالمية مثل: الجمعية الفيزيائية الأمريكية والجمعية الأمريكية لتقدير العلوم .
- حصل على العديد من الجوائز من منظمات علمية عالمية مثل المعهد الأمريكي للفيزياء، وذلك لنشاطه في تقديم الإعلام العلمي بأحدث المقالات في الكون والفيزياء ولأسلوبه المتفرد في تبسيط العلوم خاصة في علم الجسيمات دون الذرية وعلم الكون وعلوم الأرض والفيزياء الطبية (أبحاث عن السرطان) .
- من مؤلفاته التي لاقت شهرة واسعة، (قاموس الثقافة العلمية) و(هل أنت فريد في الكون) و(تأملات عند غروب الشمس) و(لحظة الخلق) و(هل نحن وحدنا في الكون) و(من الذرات إلى الكواركات) و(الحياة في الفضاء) و(ما العلم؟)، وفي مقابلة تلفازية حديثة، يعترف بأن أفكاره تتشكل بتاثير قراءة الخيال العلمي الجاد، خاصة الذي يكتب الكاتب الشهير (إسحاق أزيموف) وتحديداً كتابه (الأساس) وقصصه القصيرة عن الروبوتات .

## **المترجم في سطور :**

### **رؤوف وصفى صبحى**

- ولد في القاهرة.
- درس في جامعات مصر والعراق والكويت.
- حصل على جائزة تبسيط العلوم - أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا . وجائزة الثقافة العلمية - أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .
- عضو اتحاد الكتاب.
- ترجم العديد من الكتب العلمية ، وفي مجال الخيال العلمي منها: «الروبوت» و«الحاسب الآلي» و«كوكب الأرض» و«مذنب هالى» ( مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ) ومسرحيات من الخيال العلمي (وزارة الإعلام - الكويت). وقام بترجمة «ثلاث رؤى للمستقبل » و «حرب العوالم» و«الرجل الخفى» و«بشر كالأرباب» والقصص القصيدة الكاملة (هـ. ج. ويلز) والقصص الكاملة (رأى برادبورى) (الجزء الأول). للمركز القومى للترجمة، وكذلك ترجمة مقالات علمية فى مجلة الثقافة العالمية.
- شارك فى العديد من الندوات منها «ندوة الخيال العلمي» وقام بإعداد البرنامج التليفزيونى «سؤال وجواب» وتقديمه فى تليفزيون الكويت و «الخيال العلمي» (إذاعة الكويت).
- نشرت مقالاته وقصصه فى عدد كبير من الصحف والمجلات العربية، منها جريدة الأهرام وجريدة الأخبار ومجلة العلم (مصر)، ومجلة العربي الكويتية ومجلة «التقدم العلمي» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومجلة «دبي الثقافية» الإمارات.

- أحد رواد أدب الخيال العلمي والثقافية العلمية في الوطن العربي.
- المنسق العام لرابطة كتاب الخيال العلمي العرب.
- حاصل على شهادة وميدالية من نقابة المعلمين.
- صدر له عن مؤسسة دار المعارف عدد من الكتب منها: المدن الكوكبية - الأقمار الصناعية - الروبوتات - كابتن القضاء - توب كابي - متحف اللوفر.
- صدر له في سلسلة مكتبة الأسرة: "ثلاث رؤى للمستقبل" و "طاقة المستقبل".

التصحيح اللغوي: محمود مبروك  
الإشراف الفني : حسن كامل

